

附表 水泻停口服液治疗组与对照组疗效比较

组 别	例数	止泻时间(天)	总病程(天)
治疗组	25	1.48±0.21*	4.09±0.27*
对照组	25	5.64±1.18	7.37±1.87

* 与对照组比较 $P < 0.01$

均优于对照组,无任何不良反应,表明其对轮状病毒肠炎是安全、有效的理想药物。

婴幼儿脾常不足,脾虚则湿盛,湿留于肠内则作泄泻。轮状病毒肠炎患儿发热或不发热,大便如水样……烦躁口渴,小便短赤,实为祖国医学脾虚湿盛的泄泻证。病初多为湿热型,水湿壅盛则水道不通,小便不利。凡治泻须利小便。水泻停口服液实脾燥湿并微清热,脾虚复常则小便自通,大便自实。

我们用水泻停口服液连续数年治疗轮状病毒肠炎疗效一致,表明该药对多族 HRV 均有效;治疗组有 10 例患儿采集了双份粪便标本,经 12~72 小时的观察,HRV 抗原转阴 9 例,1 例未转阴者为药后 36 小时采集的标本。抗原阴转较速,说明水泻停口服液是一种主动性治疗轮状病毒肠炎的藥物,可能对 HRV 有较强的抑制或直接灭活作用,有待进一步研究。

本研究蒙山西妇幼保健院张佩英、山西医学院罗鹏飞指导,病毒学检验承运城地区防疫站中检科王士权、栾凤池等同志支持,特此一并致谢!

参 考 文 献

- (1)云南省小儿腹泻防治协作组. 马蹄香治疗轮状病毒肠炎研究. 中华儿科杂志 1985; (23) 3:129.
- (2)钱大龙,等. 小儿慢性腹泻. 国外医学儿科分册. 1984; 3:117.

半 侧 舞 蹈 症 治 验 二 则

河北省肃宁县医院 张振东

例一,尹××,女,84岁,1990年3月5日诊。右侧上下肢不自主、无规律舞动21天。平素身体健康,无类似发病史,只因与邻里口角,突然出现半侧肢体的舞动,睡眠时停止。心烦易怒,头晕而胀。诊见患者神志清楚,语言蹇涩,语义明白;右侧上下肢不停顿、不自主、无规律地舞动。右侧腱反射迟钝,肌张力降低。因舞动而不能诊脉,旁人用力按住方可诊其脉。血压22.66/13.33KPa,舌淡红、苔薄黄,脉弦硬。诊为半侧舞蹈症。乃阴虚阳亢,肝风扰动,治以滋阴潜阳熄风。方用镇肝熄风汤加减。处方:天麻10克,代赭石30克,牛膝30克,生龙骨30克,生牡蛎30克,龟板15克,白芍10克,僵蚕10克,全蝎10克,蜈蚣10条,甘草10克。水煎服,每日一剂,三剂后症状明显减轻,又进5剂而愈。

按:半侧舞蹈症常是由脑血管病引起,以偏身的不规则、不自主地运动为特征,符合“诸风掉眩,皆属于肝”之论。本病有阴虚阳亢之症,故以镇肝熄风汤滋阴潜阳,加蜈蚣、全蝎、僵蚕熄风止动,方合证候,故而显效。

例二,李××,女,65岁,1988年8月21日诊。

两天前右侧上下肢不自主地抖动,今日加重而来诊。平素体弱乏力,饮食乏味而纳少,气短懒言,两天前因到五里外步行赶集,自觉劳累,右侧肢体不自主地颤动加重而来诊。诊见患者体态丰满,面色胱白,语言低微,语义清楚,右侧上下肢不停地扭动呈舞蹈状,无规律,不能自止。血压16.00/10.66KPa,舌淡红、苔白腻,脉濡细。诊为半侧舞蹈症。乃脾虚湿盛,湿阻脉道,邪气攻冲而致,治以健脾利湿,化痰熄风。方宗《金匱要略》当归芍药散加味。处方:当归10克,赤芍10克,茯苓10克,白术10克,泽泻10克,川芎10克,僵蚕10克,蜈蚣10条,全蝎10克,甘草10克。水煎二次分服,每日1剂,12剂后舞动停止。再服人参健脾丸、补中益气丸以善其后。

按:张仲景之当归芍药散原为治疗妇人怀孕,腹中疝痛方,有养血化痰、健脾利湿的功效。本例病人是脾虚湿盛的体质,故以当归芍药散治其本,加僵蚕、蜈蚣、全蝎熄风止痉治其标,标本兼顾而获效。日本福冈大学藤原道弘教授研究证实,当归芍药散对治疗引发老年性痴呆症的早老性痴呆有效,并有助于预防脑供血不足而发生的障碍。