DOI:10.13288/j.11-2166/r.1991.09.038

脉论厥的条文有15条，9种不同的脉象。(1) 寒厥或藏厥见微脉，见317条、338条、343条、389条。(2) 寒厥之较轻者可见弱脉，见377条。(3) 亡血之厥出现虚脉，见349条。以上均须用四逆汤类方治疗。(4) 阳气虚而不通之厥见促脉，宜用灸法，见349条。(5) 脉滑而厥为热厥，须大剂白虎汤治疗，见350条。(6) 脉细而厥为血虚寒厥，可用当归四逆汤治疗，见351条。(7) 脉乍紧而厥为痰厥，可用瓜蒂散，见355条。(8) 痰热之厥可见沉迟脉，治宜麻黄升麻汤，见357条。(9) 厥逆无脉都属危重症，见298条、315条、362条、368条，或为阳亡阴竭或为阴盛格阳，治疗宜用四逆汤类方或灸法。

三、证歧脉同辨异法

不同的证候却出现相同的脉象，或证虽变而脉尚未变，这就不可拘泥于脉，而是从证以识脉。这在《伤寒论》中并不少见。如122条中三种数脉，其证各不相同：一为中消证有内热，所以消谷引食；二为汗多伤阳，胃中虚冷；三为外邪化热，阻滞中焦，虽见数脉不能消谷。在257条与258条中，还有三种证候也出现数脉：一为表证未罢，里实已成，虽见浮数脉，仍可攻下；二为攻下后六七日不大便，可考虑瘀血；三为攻下后下利不止而脉数，可能为热利。

四、危重证候关键脉象提示法

危重病证变化迅速，临床表现复杂，寒热虚实往往在疑似之间。这时脉诊是辨证的关键。这也是《伤寒论》平脉辨证的一个重要组成部分。例如61条汗下之后，表证已罢，发热不高，白天烦躁，夜间转为安静。这可能是邪去正虚，或是邪热内郁，或是突然亡阳，条文指出脉沉微，则提示为亡阳，急用干姜附子汤大量顿服救治。132条病属结胸，一般宜用下法，结胸常见脉象是沉紧，现在见浮大脉，提示热盛于外，正虚于里，切忌攻下。

上海中医学院　柯雪帆

名医验方实验录

贵刊曾在1989年第6期"名医验方"专栏介绍了徐景藩教授自拟经验方——白药藕粉糊，治疗食道炎、贲门炎。经临床使用验证，收到显著疗效。

白药藕粉糊，将藕粉、云南白药混匀，利用藕粉的粘性而附着于食管粘膜壁上，使云南白药的消炎消肿、止血愈伤、祛腐生肌功效直接作用于患部，故而疗效显著。服药时，使患者采取仰卧位、左侧卧位、右侧卧位、俯卧位等几种不同的姿式来吞服药物，使吞咽的药物通过不同的体位，均匀地附着在食道管壁上，充分地作用于患处。

由于新疆地处西北边陲，方中藕粉常有不备，因此笔者常用山药代替，亦取得同样效果。曾治丁×，男，20岁，1990年8月7日入院，住院号：20499。患者一周前因食干馕后而出现胸骨后烧灼感，食物通过时疼痛较甚，曾服中药数剂收效不显。胃镜检查：食道有锁条状糜烂、充血。诊断：食道炎。经对症予以白药山药糊剂，按要求服用。四天后，患者自诉症状消失而出院。

少数胃炎患者，常于胃镜检查后，自诉舌根部、咽部、食道部位疼痛不适，甚则出现烧灼感。对于此类患者，笔者常予以白药藕粉糊（或白药山药糊）治疗，亦收到满意的疗效。如曾治罗×，女，37岁，1990年8月5日入院，住院号：20495。胃镜检查诊断为慢性浅表性胃炎。由于患者体质较差，胃镜检查时操作不顺利，胃镜检查后三天，患者仍诉咽部、胸骨后有烧灼感，吞咽食物时上述部位隐隐作痛，考虑为食道粘膜损伤，予以云南白药4克，山药30克，制成白药山药糊，按要求服用。药后五天，患者自诉症状基本消失。

新疆吉木萨尔县人民医院　戴海安

美容佳药——芦荟

芦荟一药，一般多用于泻肝经实火、通热结、治虫疟、小儿疳积。外用于湿癣、疮疡。我们通过临床观察认为，芦荟除以上作用外还有面部美容的效果，特别是治疗面斑（主要是黄褐斑）收效颇佳，现介绍如下。

具体用法：芦荟300克，绿豆150克，共研为末备用。用时将药粉调成糊状，薄薄覆盖于面部或患部，保留30分钟。早、晚各一次。敷上药糊后，可配合手法按摩以助药力吸收。夏季药粉以西瓜汁调敷，其他季节均用鸡蛋清调敷。一个月为一疗程。一般一个疗程可达到面部肤质改变，2～3个疗程可使病灶明显好转或消失。

现代医学认为，黄褐斑为色素沉着于面部，与内分泌、曝晒等因素有关。中医称黄褐斑为肝斑，妇人多见，认为多由肝气郁结，郁火循经上炎于面部而成。芦荟苦寒，入肝、胃经，李时珍论该品"厥阴经药，专于杀虫清热。"本品外用通过玄府，泻肝经实火，清解郁热。又因该药为叶茎流出液体，其质胶粘，可以清洁局部皮肤，增加玄府开合功能，祛除热毒之邪，起到面部清洁美容的治疗作用。

湖北大学校医院　王维宁

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net