

退热者分别为31例、17例；三天内不退热者分别为5例、19例。观察组疗效优于对照组。

2. 新生儿破伤风：龙氏^[32]用玉真散加味(白附子、羌活、白芷、防风、天麻、南星)，抽搐太甚加钩藤、蝉衣、蜈蚣，发热加银花、连翘，痰多加川贝、杏仁，治疗新生儿破伤风4例，均获痊愈。

3. 外感高热：金氏等^[33]用解表退热液(石膏、连翘、荆芥、薄荷、芦根、赤芍)治疗小儿外感高热20例，疗效满意，一般90~180分钟汗多热退。

六、在腹部手术后的应用

姚氏等^[34]对腹部手术后的128例用10%番泻叶浸剂灌肠，临床观察，证实番泻叶浸剂灌肠对早期恢复消化道功能，控制术后症候群及防治术后并发症具有明显效果。

综上所述，中药保留灌肠治疗内、外、妇、儿等多种急、慢性重症及疑难杂病，疗效颇佳，尤以大黄为主的复方是目前有效的常用方法。本文所引34份资料中用大黄者18份，尤其是有关肾衰的11份资料中，全部应用大黄。大黄具有泻下解毒、荡涤肠胃、推陈致新及活血化瘀等功效，而且能“除邪气而不伤正气”，是中药灌肠方中的一味重要药物。

参 考 文 献

- (1) 马贵同，等. 中医杂志 1985; 26(7):33.
- (2) 李祝勤，等. 新中医 1986; 18(10):37.

- (3) 孟保，等. 新中医 1989; 21(8):22.
- (4) 叶光华，等. 中医杂志 1989; 30(9):34.
- (5) 王立基. 浙江中医杂志 1988; 23(3):101.
- (6) 吴洪文. 新中医 1989; 21(9):36.
- (7) 韦淑贞. 新中医 1989; 21(7):36.
- (8) 侯传夫. 山东中医杂志 1989; 8(3):53.
- (9) 许桂英，等. 上海中医药杂志 1989; (9):18.
- (10) 杨侃. 浙江中医杂志 1989; 24(3):114.
- (11) 倪平佛. 中医杂志 1985; 26(3):74.
- (12) 黄其新. 新中医 1988; 20(7):30.
- (13) 查龙华. 浙江中医杂志 1987; 22(2):55.
- (14) 夏更德. 浙江中医杂志 1987; 22(11):514.
- (15) 郑东平. 上海中医药杂志 1985; (8):46.
- (16) 崔淑珍，等. 中医杂志 1988; 29(6):32.
- (17) 叶传惠. 中医杂志 1986; 27(11):25.
- (18) 李荣亨，等. 中医杂志 1988; 29(3):9.
- (19) 罗桂桃. 新中医 1989; 21(7):35.
- (20) 于德岁，等. 山东中医杂志 1988; 7(4):21.
- (21) 方淑媛. 上海中医药杂志 1987; (3):19.
- (22) 严仲庆. 浙江中医杂志 1989; 24(8):346.
- (23) 徐德先，等. 中医杂志 1986; 27(10):32.
- (24) 陈波，等. 中医杂志 1987; 28(3):34.
- (25) 李传中. 山东中医杂志 1987; 6(1):19.
- (26) 郭龙清. 新中医 1987; 19(2):25.
- (27) 万庆林，等. 上海中医药杂志 1988; (5):27.
- (28) 杜杏女. 浙江中医杂志 1987; 22(7):302.
- (29) 陈影萍. 浙江中医杂志 1985; 20(10):451.
- (30) 叶文贞，等. 上海中医药杂志 1987; (3):7.
- (31) 石呈峰，等. 中医杂志 1989; 30(6):19.
- (32) 龙锦煌. 浙江中医杂志 1987; 22(6):253.
- (33) 金福厚，等. 新中医 1985; 17(7):13.
- (34) 姚开炳，等. 中医杂志 1988; 29(7):55.

暴 聋 治 验 一 例

广西中医学院 荣远明

李××，女，37岁，1989年11月3日就诊。右耳突发耳鸣，以致耳聋已月余。缘患者平素健康无恙，月余前丈夫外出未归，某夜酣睡之时，突为惊叫、巨响所惊醒，以为是盗匪行凶打劫，当时惊恐万状，脑鸣隆隆，如雷贯耳，随即右耳蝉鸣，听力减退，以致耳聋。曾经多间医院诊治，均诊为神经性耳聋。服用维生素类和血管扩张剂以及中药等治疗，并配合理疗、针灸，仍无效果。察其神态如常、身体壮实、舌质黯红、舌苔薄白、脉弦。拟诊：暴聋。乃气滞血瘀，阻塞耳窍所致。治以行气活血，祛瘀通窍。方用血府逐瘀汤加石菖蒲、灵磁石。处方：桃仁12克，红花9克，当归9克，生地9克，川芎5克，赤芍6克，柴胡3克，枳壳6克，甘草3克，桔梗5克，牛膝9克，石菖蒲10克，灵磁石20克（打碎先煎）。

每日一剂，水煎服。服药一周后脑鸣声渐敛，四周后脑鸣消失，听力渐复。随访半年未见反复。

按：暴聋（突发性耳聋）属难治疾患之一。患者因惊恐而得，肾开窍于耳，十二经脉均上络于耳，心肾气机逆乱，气血不畅，经脉瘀阻，堵塞耳窍则耳鸣耳聋。正如《医林改错》云：“耳孔内小管通脑，管外有瘀血，靠挤管闭，故耳聋。”患者脉弦、舌黯，多方治疗无效，亦应考虑气滞血瘀。其神态如常，形体壮实，并无虚象，故治疗不宜补肾，宜行气活血、祛瘀通窍。方选血府逐瘀汤加味。此方有桃红四物汤合四逆散之义，前者活血祛瘀，后者疏肝理气，加之桔梗、牛膝一升一降，调理气机。另入石菖蒲、灵磁石通窍安神，明目聪耳，乃治耳鸣耳聋之要药。诸药合用，共奏理气化瘀，通窍聪耳之功。药症相符，故收全功。