DOI:10.13288/j.11-2166/r.2003.07.011

防风善治过敏性鼻炎

河北医科大学中西医结合学院(050091)
常风云 常 庚

防风辛、甘,微温。《本草经疏》言其"治风通用,升发而能散,故主大风"。我们在临床以防风为主,治疗过敏性鼻炎,疗效较佳,现举例介绍如下。

李某,女,24 岁,2001 年 3 月 16 日初诊。鼻流清涕,喷嚏,鼻孔作痒 1 年余,反复不愈,每着风冷则加重。曾在某医院诊为"过敏性鼻炎",服抗过敏西药后症状消失,停药则复作,舌淡苔薄白,脉弦细。药用:防风 15g,白术 9g,黄芪 12g,辛夷 10g,炒苍耳子 12g,乌梅 10g,玄参 9g,白芷 9g,甘草 6g。每日 1 剂,水煎分 2 次服。9 剂后症状消失,改为散剂,每次服 5g,日服 2 次,以巩固疗效,防止复发。

过敏性鼻炎常缠绵不愈,多属肺脾气虚,卫外不固,风邪反复乘袭,窍道不利所致。防风祛风止痒,据现代药理研究证实,有较强的抗过敏作用。由于药证相投,故数剂而愈。

防风是治疗抗精子抗体阳性要药

浙江省缙云县中医院(321400)
丁 禹 占

笔者治疗抗精子抗体(AsAb)阳性不孕患者,喜用玉屏风散加味,疗效尚称满意。其处方为:当归 30g,白术 10g,黄芪 30g,熟地黄 30g,防风 10g。水煎服,每日 1 剂。一般服药 30~60 剂取效。

由于未作拆方试验,不知方中何药为主药。后遇一闭经不孕患者郑某,女,23 岁。B 超跟踪检查:无卵泡发育;基础体温(BBT)单相。于是用毓麟珠加味以补肾调经助孕。处方为:人参须 10g,党参 20g,茯苓 10g,白术 10g,甘草 50g,当归 20g,熟地黄 20g,酒白芍 10g,川芎 5g,鹿角胶 10g,菟丝子 30g,花椒 5g,杜仲 10g,黄芪 20g。水煎服,每日 1 剂。服药 80 剂后,月经已调,B 超跟踪检查已有成熟卵泡排出,BBT 双相。嘱每于月经净后续服 10 剂以巩固疗效,选择排卵日性交。然而 2 个月后仍不能怀孕。遂检查血 AsAb,发现为 AsAb 阳性。本例患者所用之方与玉屏风散比较,方中已含白术、黄芪,仅缺防风一味,服药已达 100 剂,而 AsAb 仍为阳性,乃悟知防风当为治疗 AsAb 阳性之要药。遂于原方中加入防风 10g,于月经净后连服 10 剂,冀以巩固排卵功能,兼治 AsAb 阳性;排卵后则服用玉屏风散加味 20 剂,专治 AsAb 阳性。共 30 剂后复查,AsAb 已转阴。此后未再服药,翌月即孕。

又有患者丁某,女,31 岁,婚后不孕 5 年,经 B 超、BBT、血清 AsAb 检测,诊为未破裂卵泡黄素化、抗精子抗体阳性。为进一步验证防风的作用,仅服排卵效灵汤(自拟方,即毓麟珠加党参、红花、桃仁、黄芪、皂角刺、炮穿山甲,见《中医杂志》2000 年第 9 期 569 页),方中含归、地、术、芪,但不加用防风,服药 40 剂后,已有正常排卵,但 AsAb 依然阳性。再于方中加入防风 10g,服药至排卵;排卵后则服玉屏风散加味,共 30 剂,当月怀孕。

此后对防风治疗 AsAb 阳性的效果深信不疑,每遇排卵功能障碍合并 AsAb 阳性而不孕者,悉于毓麟珠方中加黄芪、防风治之,有事半功倍之效。如治杜某,女,29 岁,取环后 1 年未孕,月经稀发,血检 AsAb 阳性,服毓麟珠加黄芪 30g,防风 10g,服 15 剂即怀孕。

防风治疗外阴瘙痒

福建省永泰县岭路医院(350722)
兰友明 鲍雪娇 兰义明

防风一药既可内服又可外用。我们以防风为主自拟防风蝉蜕汤内服及外洗治疗外阴瘙痒常获显效。现简介如下。

药物组成及用法:防风 30g,蝉蜕 10g,生甘草 2.5g,泽泻 10g。水煎 20 分钟,煎汁 250ml。50ml 口服,200ml 熏洗外阴。每日 1 剂,15 天为 1 个疗程。

如治李某某,女,46 岁,干部,1992 年 8 月 10 日就诊。患外阴瘙痒 2 年,经某医院妇科多次检查,无霉菌及滴虫生长。服用中西药,疗效均不明显,邀余诊治。予防风蝉蜕汤内服外用,2 周而愈,随访 1 年未复发。

防风治疗白癜风

甘肃省灵台县人民医院中医科(744400)
冯 云 天

笔者从事皮肤病的中医治疗多年,用防风冲服治疗白癜风取得了较好的疗效,现举例如下。

患者田某某,男,15 岁,于 2000 年 1 月 5 日初诊。主诉:颈部椭圆形白斑 1 年余。患者于 1 年前,无明显诱因在左侧颈部出现一点状色素脱失斑,无不适感,后白斑逐渐扩大。现患者左侧颈部有一 4cm×5cm 大小白斑,诊断:白癜风。药用:防风末 10g,另以蒲黄 10g,五灵脂 10g,土鳖虫 3g,丹参 10g,桃仁 10g,红花 10g,赤芍 10g,白芍 10g,蝉蜕 5g,柴胡 5g,浓煎送服防风末,每日 1 剂。经应用 10 天后,白斑缩小至 1cm×2cm 大小,效不更方,继续服药 20 天白斑消失,随访 1 年未复发。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net