

高等中医自学考试及中医晋升考试辅导

陕西省 1991 年上半年高等中医自学考试

《西医内科学基础》试题

(答案在下一期刊出)

一、填空题(每小题 1 分, 共 10 分)

1. 发热按病因可分为_____性发热及_____性发热。
2. 慌张步态见于_____病; 蹒跚步态见于_____病。
3. 双侧眼球突出常见于_____病; 单侧眼球突出常见于_____病。
4. 伤寒的传染源是_____及_____。
5. 心绞痛可分为_____性心绞痛及_____性心绞痛两类。
6. 叩诊时肝浊音界缩小可见于_____病及_____病。
7. 血友病时凝血时间_____; 血小板减少性紫癜时出血时间_____。
8. 常用于治疗有机磷中毒的解毒药有_____剂及_____剂两类。
9. 正常成人的脉压是_____至_____。
10. 高血压性心脏病时叩诊心浊音界向_____扩大, 听诊出现_____第二心音亢进。

二、单项选择题(在每小题的四个备选答案中, 选出一个正确的答案, 并将其号码写在题干的○内。每小题 1 分, 共 20 分)

1. 伴发病的有关病史应记录于○
① 现病史 ② 过去史 ③ 个人史 ④ 家族史
2. 脑脊液检查时其葡萄糖含量正常见于○
① 流行性脑脊髓膜炎 ② 肺炎球菌脑膜炎
③ 结核性脑膜炎 ④ 流行性乙型脑炎
3. 点头运动出现于○
① 二尖瓣狭窄 ② 主动脉瓣狭窄
③ 主动脉瓣关闭不全 ④ 二尖瓣关闭不全

4. 确诊细菌性痢疾可依靠粪便检查出现○
① 白细胞 ② 巨噬细胞 ③ 红细胞 ④ 脓细胞
5. 作网织红细胞计数的目的是○
① 协助诊断白血病 ② 了解体内是否存在感染灶
③ 了解骨髓造血小板的功能 ④ 了解骨髓造血红细胞功能
6. 肺部触诊语颤增强可见于○
① 急性支气管炎 ② 肺气肿
③ 肺内大空洞 ④ 胸膜肥厚
7. 毛发异常增多可见于○
① 粘液性水肿 ② 慢性脑垂体前叶功能减退
③ 慢性肾上腺皮质功能减退 ④ 肾上腺皮质增生
8. 器质性杂音可出现于○
① 风湿性心瓣膜病 ② 冠心病 ③ 肺原性心脏病
④ 心肌炎
9. 舟状腹可见于○
① 严重脱水 ② 腹腔大量积液 ③ 胃肠胀气
④ 气腹
10. 生理性蛋白尿可见于○
① 肾肿瘤 ② 慢性肾炎 ③ 肾结核 ④ 严重受寒
11. 二尖瓣关闭不全时叩诊心浊音界时出现○
① 向双侧扩大 ② 向左下扩大 ③ 向右侧扩大
④ 向左侧扩大
12. 慢性肺原性心脏病时必须出现○
① 肺亢进 ② 心脏杂音 ③ 心律失常 ④ 肝肿大
13. 诊断甲状腺功能亢进症时具有决定性价值的是○
① 甲状腺肿大 ② 心率增快 ③ 双手指震颤
④ 血中 T₃、T₄ 增高

14. 有机磷中毒时的首要抢救措施是○

- ① 应用特殊解毒剂 ② 吸氧 ③ 输液 ④ 洗胃

15. 确诊消化性溃疡应依靠○

- ① 典型病史 ② 上腹压痛 ③ 粪便匿血试验阳性 ④ 胃镜检查

16. 心杂音产生的正确解释是○

- ① 心瓣膜关闭不全均出现收缩期杂音 ② 出现心杂音均提示心瓣膜病变 ③ 连续性杂音可见于动脉导管未闭 ④ 心瓣膜狭窄均出现舒张期杂音

17. “苦笑”见于○

- ① 脑膜炎 ② 甲状腺功能亢进症 ③ 脱水 ④ 破伤风

18. 夜间阵发性呼吸困难最常见于○

- ① 急性右心功能不全 ② 全心功能不全 ③ 急性气胸 ④ 急性左心功能不全

19. 呼吸频率增快可见于○

- ① 吗啡中毒 ② 巴比妥类中毒 ③ 肺炎 ④ 颅内压增高

20. 胸骨体压痛可见于○

- ① 再生障碍性贫血 ② 血小板减少性紫癜 ③ 急性大出血 ④ 白血病

三、双项选择题(在每小题的五个备选答案中,选出二个正确答案,并将其号码分别写在题干的○○内,正确答案没有选全或有选错的,该题无分。每小题1分,共10分)

1. 化验时血液中性粒细胞减少见于○○

- ① 急性心肌梗塞 ② 再生障碍性贫血 ③ 妊娠末期 ④ 急性大出血 ⑤ 脾功能亢进

2. 第三心音的特点是○○

- ① 出现于收缩期 ② 出现于舒张期 ③ 酷似第二心音的回音 ④ 在心底部较清楚 ⑤ 多见于老年人

3. 诊断急性风湿热时的主要临床表现包括○○

- ① 血沉增快 ② 环形红斑 ③ P-R 间期延长 ④ 发热 ⑤ 心脏炎

4. 肝硬化时不应出现○○

- ① 蜘蛛痣 ② 腹部触诊有揉面感 ③ 振水音 ④ 波动感 ⑤ 脾大

5. 胸腔积液时不应出现○○

- ① 气管向病侧移位 ② 病侧叩诊呈浊音 ③ 病侧叩诊呈过清音 ④ 气管向健侧移位 ⑤ 病侧肺泡呼吸音减弱

6. 流行性脑脊髓膜炎时具有特效的药物是○○

- ① 磺胺嘧啶 ② 肾上腺皮质激素 ③ 乙胺丁醇 ④ 青霉素 ⑤ 新霉素

7. 慢性肺原性心脏病时常见的X线征象是○○

- ① 右室肥大 ② 左室肥大 ③ 左房肥大 ④ 肺动脉段膨隆 ⑤ 双肺散在片状阴影

8. 诊断糖尿病时具有重要意义的主要临床表现是○○

- ① 血糖升高 ② 消瘦 ③ 多尿、多饮、多食 ④ 疲乏 ⑤ 失眠

9. 仅见于高血压病三期的是○○

- ① 左心室肥大 ② 脑出血 ③ 蛋白尿 ④ 眼底出血 ⑤ 脑血栓形成

10. 左心功能不全时可出现○○

- ① 下肢水肿 ② 交替脉 ③ 肝大 ④ 舒张早期奔马律 ⑤ 颈静脉怒张

四、多项选择题(在每小题的五个备选答案中,选出三至五个正确答案,并将其号码分别写在题干的○○○○○内,正确答案没有选全或有选错的,该题无分。每小题1分,共10分)

1. 慢性肾炎可分为○○○○○

- ① 亚急性型 ② 隐匿型 ③ 肾病型 ④ 高血压型 ⑤ 普通型

2. 病毒性肝炎时的常规治疗药物是○○○○○

- ① 肾上腺皮质激素 ② 抗生素 ③ 维生素丙 ④ 维生素乙 ⑤ 肝泰乐

3. 常需与流行性脑脊髓膜炎作鉴别的疾病是○○○○○

- ① 脑囊虫病 ② 流行性乙型脑炎 ③ 脑出血 ④ 结核性脑膜炎 ⑤ 其他化脓性脑膜炎

4. 洋地黄制剂适用于○○○○○

- ① 窦性心动过速 ② 心功一级 ③ 急性左心功能不全 ④ 心功三级以上 ⑤ 心房颤动

5. 属于高血压病二期的临床表现是○○○○○

- ① 高血压性心脏病心功一级 ② 蛋白尿 ③ 高血压脑病 ④ 心功能不全 ⑤ 眼底动脉普遍变窄

6. 化验时血液酸性粒细胞增多可见于○○○○○

- ① 伤寒 ② 支气管哮喘 ③ 蛔虫病 ④ 严重烧伤 ⑤ 荨麻疹

7. 听诊心尖区第一心音减弱可见于○○○○○

- ① 主动脉瓣狭窄 ② 二尖瓣狭窄 ③ 主动

脉瓣关闭不全 ④ 二尖瓣关闭不全 ⑤ 高血压病

8. 慢性肺原性心脏病时可以出现 ○○○○○

① 心尖区第一心音亢进 ② 肺亢进 ③ 紫绀明显 ④ 颈静脉怒张 ⑤ 叩诊心浊音界向双侧扩大

9. 急性胰腺炎的治疗应包括 ○○○○○

① 应用杜冷丁 ② 应用抗生素 ③ 抗休克 ④ 应用阿托品 ⑤ 进流食

10. 急性左心功能不全伴有明显的肺充血时应采取 ○○○○○

① 平卧并将下肢抬高 ② 镇静剂 ③ 应用强心甙 ④ 吸氧 ⑤ 利尿剂

五、判断题 (认为正确的,在题后的○内打“√”,错误的打“×”,并说明理由,不说明理由,该题无分。每小题2分,共20分)

1. 心脏听诊出现早搏均属于病理征象。○

2. 体格检查出现 Babinski 征时均属于病理征象。○

3. 阻塞性黄疸时其凝血时间正常。○

4. 支气管哮喘急性发作时可出现“三凹征”。○

5. 肺部检查触诊出现语颤增强,听诊出现支气管呼吸音时均具有相同的病理基础。○

6. 病理性杂音均具有传导性。○

7. 粪便检查于培养时出现细菌均属于病理现象。○

8. 体检发现甲状腺肿大即可诊断为甲状腺功能亢进症。○

9. 超声波检查对胆石症的诊断具有重要价值。○

10. 中毒型痢疾多见于2~7岁小儿。○

六、简答题 (每小题5分,共15分)

1. 风湿性心瓣膜病有哪些常见的心瓣膜病变?

2. 请说明慢性肾炎的治疗原则。

3. 请说明白血病的分类及分型。

七、病案分析题(15分)

女性,56岁,退休干部。以右侧上下肢活动不灵伴失语1天之主诉入院。于发病前2天略感上下肢乏力、麻木,但未介意,夜间睡眠可以,1天前清晨醒后发现右上下肢活动不灵、麻木且渐重,说话亦不清,病后无呕吐、头痛、意识不清及抽搐,略感头昏,二便及饮食尚好,既往3年多来常感胸闷,有发作性左胸痛,持续数分钟,多于劳累及激动时发作,休息后自行缓解。家族史中母有“高血压病”。

查体: T 36.5℃, P 68次/分, R 18次/分, BP 16/10 KPa(120/75 mmHg); 发育正常,营养良好,体型肥胖,神志清,呼吸平,语言不清,右侧鼻唇沟变浅,口角偏向左侧,伸舌偏右,颈软,双肺呼吸音清晰,心界不大,心律齐,心率68次/分,主, > 肺, 主动脉瓣可闻及 II 级吹风性收缩期杂音,心尖区 I 音低钝,腹软,无压痛,右上下肢肌力 I 级,肌张力增强,腱反射亢进,右侧上下肢病理反射(+), Kernig 征(-)。

化验: 血: 白细胞 $9 \times 10^9/L$, 中性 0.75, 淋巴 0.25, 红细胞 $4.6 \times 10^{12}/L$, 血红蛋白 120 g/L, 胆固醇 12 mmol/L(460 mg/dl), 甘油三酯 2.5 mmol/L(230 mg/dl), 尿素氮 7.0 mmol/L(20 mg/dl)。

尿: 淡黄,透明,碱性,蛋白(-),糖(-),镜检白细胞 0~2/高倍,红细胞 0~1/高倍。

X线检查: 心肺膈未发现明显异常。

心电图检查: 窦性心律,电轴-15°,慢性冠脉供血不足。

眼底检查: 眼底动脉普遍变窄,动静脉有交叉征象。

1. 本病案的完整确切诊断。(5分)

2. 还可以作哪些检查? 主要应和哪些疾病作鉴别?(5分)

3. 治疗原则。(5分)

河北省1990年上半年高等中医自学考试

《方剂学》试题答案及评分标准

一、填空题(每小题1分,共10分)

1. 燥湿化痰、清热化痰、润燥化痰、温化寒痰、治风化痰

2. 黄连、吴茱萸 6:1

3. 黄芪 大补(脾肺)元气、气旺以促血行

4. 温胆汤 理气化痰、清胆和胃

5. 气郁化火

6. 黄芩、黄连、黄柏、生地黄、熟地黄、黄芪

滋阴泻火、固表止汗

7. 茯苓 痰饮流注 胃痛