DOI:10.13288/j.11-2166/r.1991.12.036

压痛。辨证：思虑伤脾，气化不利，水火不济，阴阳失调。治以通阳运脾，调理气机。穴取至阳，注射当归液2毫升。当夜即得安睡，共治六次而愈。

三、遗尿案 苏×，女，11岁。自幼遗尿，多年来无一日间断。用耳穴埋药治疗数次不见好转。追询病情得知，家长常于夜间呼唤捶打令其起床排尿，但终难唤醒。进一步检查发现至阳穴有明显压痛，遂停用耳穴疗法，改刺至阳穴，结果当夜即能唤醒，三次治疗后可自行起床排尿。

四、汗闭案 刘××，女，32岁。一年前外出郊游，于树荫下卧地小睡半小时许，醒后感觉身冷，无其他不适。半月后发现，天热时头面胸腹大汗淋漓，唯后背无汗。舌胖嫩、苔白滑，脉沉弦，脊柱及背部肋骨有多处压痛。辨证：寒中经脉，阳郁气闭，营卫失和，玄府不通。治以温阳通闭之法，穴取至阳，施以温针，十二次而愈。

五、心律失常案 何××，男，51岁。一年多来，反复发作"室上性心动过速"，每次发作均需急诊救治。1986年7月28日旧症复发，头晕、恶心、胸憋、气促，心电图示P波不清，ST段轻度下降，T波平坦，舌胖嫩、苔水滑，脉细数，心率为218次/分，血压90/60 mmHg。治以通阳复脉之法，穴取至阳，用合谷刺法，待气感传遍背胁胸腹，改为雀啄行气，6分钟后心率减为96次/分，心电图恢复正常，血压126/80 mmHg。

此外，至阳穴治疗烦躁、嗜睡、梦游、脾胃及肝胆疾患等均有疗效。

北京医科大学第三医院 张世雄

蝉蜕入药应去翅足

蝉蜕咸甘寒，散风热，宣肺解痉。主治痘疹、风疹失音目翳，小儿惊痫，破伤风等。关于蝉蜕有可能引起幼儿动风，临床罕见，偶遇二例报告如下：

例一：汪××，男，13个月。1976年8月5日初诊。患儿全身出现风疹块一日，状似云片，无寒热。当日上午家长取蝉蜕一捧(约20克)，鲜银花、薄荷各一抓(约10克)，水煎加白糖频服。药后3小时小孩面色苍白，时有烦躁哭闹，神志惊恐，双眼阵阵上翻，双手握拳轻度抽搐。查：体温正常，咽部阴性。苔薄白，脉数。处方：蝉蜕、钩藤各6克，朱砂2克，水煎加白糖适量。服药二剂，动风症状逐渐消失。随访一年，未有复作。

例二：贾×，男，11个月。1970年1月19日诊。上午发热，体温38.4℃，鼻塞流涕，咳嗽，伴有全身散发性风疹块。查：咽充血，扁桃腺不大。苔薄白，脉数。某医用蝉蜕15克，桑叶、菊花、荆芥、连翘、牛蒡子、杏仁各4.5克，薄荷、桔梗、炙甘草各3克，水煎加白糖适量频服。药后4小时热度退到38℃，但出现间歇哭闹，稍有烦躁，神志惊恐，有时双眼稍稍上翻，双手间歇地轻微抽搐。查药房蝉蜕均没剪除翅足，腹部脆薄碎掉，考虑蝉蜕上半截引起的反应。故用原方加钩藤，蝉蜕改蝉腹各6克，朱砂2克。服药二剂，体温37.5℃，动风症状消失。

二例患儿均为笔者在基层医院工作时遇到的病例。二例的动风症状相似，只有程度之轻重，这与小儿月数及用药剂量大小有关。孩母身体健康，无服烈性药物、及遗传病史。例一体温正常，仅发风疹块而已；例二发热伴有风疹块，热度下降反而出现动风现象，非壮热动风，根据服药时间及病程经过，可以认为蝉蜕上半截所致。历代医家十分重视蝉蜕部分的选用，魏直《博爱心鉴》记载："治疗小儿一百二十日夜啼，用蝉蜕四十九个，去前截，用后截为末分四服，钩藤汤调灌之。"《普济方》蝉花散曰："治小儿夜啼不止，状若鬼祟，用蝉蜕下半截为末一字，薄荷汤入酒少许调下；或者不信，将上半截为末煎汤调下，即复啼也。"幼儿纯阳之体，气血未充，神经系统尚未健全，对药物非常敏感，容易出现动风症状。根据患儿的临床表现，蝉蜕上半截与下半截有动风(兴奋)与熄风(抑制)之别：整体虽能中和，仍然稍偏于兴奋。如成人患风疹失音，用蝉蜕上半截250克煎服，个别患者夜间有兴奋现象，不易入眠。因此，幼儿夜啼、惊痫、破伤风症当用蝉腹，应引起医药人员的注意。

上海市纺织工业局第一医院 夏荷松

七叶一枝花外治儿童痄腮

方法：用七叶一枝花50克研末醋调，敷在一块5平方厘米消毒棉纱布上，将冰片末3克掺入药面，贴敷腮部患处。每日更换1次，连敷3日以上。

疗效：一般三天见效，五天至一周肿痛消失。

七叶一枝花，别名蚤休、重楼。本文介绍的七叶一枝花是四川、贵州、云南、西藏产地的药材。其性寒味苦，有小毒，入心、肝经。具有明显的清热解毒，消痈散结之功。现代药理研究，七叶一枝花根茎含蚤休甙、薯蓣皂甙等。对亚州甲型流感病毒有较强的抑菌作用。且具有良好的镇静、镇痛作用。将该药研末醋调，掺入冰片，能增强清散郁火、消肿止痛的作用。用此方法治疗痄腮，疗程短，无痛苦，患儿易接受。

重庆市南岸区第二人民医院 邓志雄

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net