

①用药分初治、减药、维持三个阶段 ②疗程为1年半左右,最短不应少于1年 ③用药后需待10日左右症状才开始好转 ④治疗开始的三个月中,查二次白细胞 ⑤已用抗甲状腺药物治疗二个疗程后又复发者,仍为该药的适应对象

3 名词解释题(每小题2分,共4分)

3.1 奔马律(包括按时间分几种)

3.2 扑翼震颤(包括临床意义)

4 填空题(每空0.5分,共18分)

4.1 黄疸是指血中_____高于正常而引起_____的现象。

4.2 上消化道出血的主要临床表现是_____,呕吐物的颜色取决于_____。

4.3 正常人心率为_____次/分,心动过速时心率为_____次/分。

4.4 门脉性肝硬变的门脉高压表现包括_____,_____和_____三方面。

4.5 麦氏点位于_____。

4.6 败血症病人白细胞数_____,再生障碍性贫血病人白细胞数_____。

4.7 柏油样便见于_____,鲜血便见于_____,米泔水样便见于_____。

4.8 心电图R-R间距平均为0.8S,心室率应为_____。

4.9 钩端螺旋体病的三症状是_____,_____。

4.10 慢性支气管炎临床上可分为_____和_____两型。

4.11 增强心肌收缩力的药物主要分为_____和_____两大类。

4.12 风湿性心脏炎包括_____、_____

_____和_____三方面炎症损害。

4.13 洋地黄中毒的表现主要有_____,_____及胃肠道症状。

4.14 糖尿病酮症酸中毒的处理原则,除补液、补碱外,还应_____和_____。

4.15 肝硬变的病因包括_____,_____,_____,以及循环障碍、寄生虫、化学药物等有关。

4.16 发现早期胃癌的最好检查方法是_____。

4.17 肝癌早期的常见症状是_____。

5 简答题(每小题5分,共20分)

5.1 试述干罗音的产生机理和临床意义。

5.2 试述风湿性心脏病单纯性二尖瓣狭窄的X线表现。

5.3 二尖瓣狭窄的主要体征有哪些?

5.4 何谓哮喘持续状态?其临床表现如何?如何进行紧急处理?

6 病例分析(8分)

某男,62岁,因头痛神志不清1小时,来院急诊。1小时前在工作中突感剧烈头痛,呕吐1次,左下肢活动不便,5分钟后神志不清,由同事送来急诊。既往有高血压史20余年,间断服药。体检:体温36.8℃,脉率60次/分,呼吸18次/分,血压230/120 mmHg(30.6/16 kPa)。神志不清,瞳孔针尖样,角膜对光反应迟钝,心浊音界向左下扩大,心率60次/分,律齐,心尖部听到二级收缩期吹风样杂音,肺部无罗音。腹软,肝脾未触及,下肢无水肿。神经系统检查:颈软,克氏征阴性,左侧鼻唇沟变浅,口角下垂,左侧肢体瘫痪,左下肢巴彬斯基(Barbinski)征阳性。

请根据病历回答:(1)完整诊断;(2)治疗原则

江西省1991年下半年高等中医自学考试

《西医内科学基础》答案及评分标准

1 单项选择题

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. ① | 2. ④ | 3. ③ | 4. ② | 5. ③ |
| 6. ② | 7. ③ | 8. ④ | 9. ⑤ | 10. ④ |
| 11. ② | 12. ① | 13. ④ | 14. ② | 15. ④ |
| 16. ② | 17. ④ | 18. ② | 19. ② | 20. ② |
| 21. ① | 22. ③ | 23. ④ | 24. ② | 25. ③ |
| 26. ③ | 27. ② | 28. ② | 29. ① | 30. ④ |
| 31. ④ | 32. ② | 33. ④ | 34. ① | 35. ① |

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 36. ④ | 37. ③ | 38. ① | 39. ① | 40. ④ |
| 41. ③ | 42. ① | 43. ③ | 44. ② | 45. ② |
| 46. ④ | 47. ③ | 48. ② | 49. ② | 50. ④ |

2 多项选择题

- | | | | |
|---------|---------|----------|-------|
| 1. ②③④⑤ | 2. ①③ | 3. ②④⑤ | 4. |
| ①③④⑤ | 5. ①②⑤ | 6. ④⑤ | 7. ②④ |
| 8. ①②③⑤ | 9. ①③④⑤ | 10. ②③⑤ | 11. |
| ①③④⑤ | 12. ①②③ | 13. ①②④⑤ | 14. |

- ①③⑤ 15. ①②④⑤ 16. ①②④ 17. ①
②③④⑤ 18. ①③⑤ 19. ①④⑤ 20. ①
④⑤ 21. ①③ 22. ①②③④ 23. ①②⑤
24. ①②③④ 25. ①②③

3 名词解释

3.1 奔马律：是心脏三音律的一种，额外附加音出现在第二心音之后，与原有第一、二心音共同组成的韵律，如马奔跑时的声音，故称奔马律。按附加音出现的时间，可分为舒张早期、晚期和中期（重叠型）奔马律

3.2 扑翼震颤：将病人两臂抬起，使其手和腕部悬空，如出现两手快落慢抬的震颤动作与飞鸟扑翼相似，称为扑翼震颤，见于肝昏迷尿毒症和肺性脑病。

（本题扑翼样震颤的特征得1分，临床意义得1分）

4 填空题

- 4.1 胆红素浓度，巩膜皮肤
4.2 呕血与黑便，出血量及在胃内停留的时间
4.3 60~100, >100
4.4 腹水，静脉侧支循环，脾肿大
4.5 右髂前上棘与脐部所引直线之中、外1/3交界处
4.6 增多、减少
4.7 上消化道出血，肠管下段出血、霍乱
4.8 75次/分
4.9 寒热、痠痛、一身软
4.10 单纯型、喘息型
4.11 强心甙类、非甙类正性肌力药物
4.12 心内膜炎、心肌炎、心包炎
4.13 神经症状、视觉症状、心脏征象
4.14 应用胰岛素、补钾
4.15 病毒性肝炎、营养障碍、酒精
4.16 胃镜检查
4.17 肝区疼痛

5. 问答题

5.1 答：干罗音是由于支气管粘膜炎症性肿胀，管腔内有粘稠分泌物或支气管平滑肌痉挛，使管腔狭窄，气流通过时发生震动所致。干罗音是支气管有病变的表现。全肺听到干罗音见于慢性支气管炎、支气管哮喘、心源性哮喘等。局部持续存在的干罗音，有时见于肺癌早期及支气管内膜结核。

本题产生机理得3分（答对支气管腔狭窄得1.5分，粘膜肿胀、粘稠分泌物，平滑肌痉挛各得0.5分）临床意义得2分，（支气管病变、支气管炎、支气管哮

喘、心源性哮喘各得0.5分）

5.2 答：心脏呈二尖瓣型，可轻度至显著增大，各房室有以下表现：（1）左心房增大，（2）左心室缩小，（3）右心室增大，（4）主动脉球小，（5）肺淤血，（6）肺含铁血黄素沉着，（7）间隔线出现，（8）肺内钙化结节。

答对二尖瓣型心得1分，答对左房大，右室大各得1分，其它：（2）（4）（5）合得1分，（6）（7）（8）合得1分

5.3 答：二尖瓣狭窄病人可出现：（1）二尖瓣面容，（2）心尖搏动左移，心尖部触及舒张期猫喘，（3）心浊音界呈梨形，（4）心尖部第一心音亢进， P_2 亢进，（5）心尖区隆隆样舒张期杂音，（6）二尖瓣开瓣音。

（2）（4）（5）（6）各得1分，（1）（3）各得0.5分

5.4 答：重度哮喘发作持续24h以上，经过一般治疗不能缓解者，称为哮喘持续状态。患者表现为呼吸困难、紫绀、大汗、四肢冷，脉细数，两肺满布哮鸣音。当缺氧严重时，可出现意识障碍和呼吸衰竭。

紧急处理包括应用（1）氨茶碱静注或静注（2）地塞米松静滴（3）维持水电解质平衡（4）纠正酸中毒（5）控制感染（6）吸氧及湿化支气管（7）必要时行气管插管或气管切开。

本题：答对定义得1分，答对表现得1分，答对紧急处理得3分，（1）~（6）各点得0.5分。

6 病例分析

6.1 诊断：① 脑出血② 高血压病三期③ 高血压性心脏病

6.2 治疗原则：① 一般治疗：安静休息，间歇吸氧；② 输液与营养；③ 降低颅压，控制脑水肿；④ 控制血压；⑤ 并发症处理；（本题每小点各得1分）

· 招聘启事 ·

河北省承德地区医药卫生书店主要经营医药卫生类图书、教材、音像品的批发、零售和邮购业务，隶属于地区文化局。现面向全国招聘图书代销员1000名，按代销金额10%发给工资。愿受聘者请将姓名、性别、年龄、工作单位、职务、详细通讯地址、邮政编码等项写清寄来，同时需寄一寸免冠照片两张。我店收到上述函件后即发给工作证和工作简章开展工作。联系人：王福 邮政编码：067000