

痰浊为主要临床见证,故分此二种证型论治。“治晕I号”方中生地、白芍养阴柔肝,石决明、钩藤、天麻、白蒺藜平肝潜阳,黄芩、丹皮、夏枯草清泄肝火,怀牛膝益肾降浊下行,共奏养阴平肝、潜阳清火之功。“治晕II号”方中我们用大剂量泽泻(20~30g)合半夏白术天麻汤,其中天麻平肝化痰治眩晕,二陈汤化痰和中,白术健脾化痰湿,牛膝降浊下行,车前、泽泻化痰行水。《本草纲目》有云,泽泻气平,味甘而淡,淡能渗泄,气味俱薄,所以利水而泄下。该药含大量钾盐,故利水而不伤阴,能促进内淋巴液排泄,消除迷路水肿有显著效果。临床有些患者发病时眩晕不能睁眼,剧烈呕吐,然服药后安睡一夜,次日晨即觉全身轻松,已能起立正常活动。风阳上亢时应看到阴虚的

一面。“诸风掉眩皆属于肝”,肝乃风木之长,体阴而用阳。《素问·至真要大论》云:“厥阴之胜,耳鸣头眩,愤愤欲吐。”肝阴不足则肝阳上亢;但肾水素亏,水不涵木亦会导致风阳上亢。故见肾阴不足者常在“治晕I号”方中加首乌、杞子、山萸肉等善后,冀其滋水涵木,壮水之主,以制阳光;若一味潜镇反伤正气。痰浊内阻应顾及脾气不足,故在使用“治晕II号”方时需注意健脾与化痰的关系。“脾主运化,乃生痰之源”,脾虚中气不足则生痰,浊阴上泛则发眩晕;另一方面,中气不足,清阳不升,上气虚衰亦会引起眩晕。故恢复阶段毋忘健脾益气,常合参芪之味。症状控制后针对气虚、阴虚兼证,从本图治,改用汤剂调理,多能收到预防复发之良好效果。

鸦胆子治愈尖锐湿疣五例报告

安顺市第一中医院西街门诊部(贵州561000) 黄 燕

尖锐湿疣的发病率近年来有所增加。笔者应用鸦胆子外用治疗5例,取得满意疗效,现报告如下。

临床资料:本组5例均为女性患者,年龄最小20岁,最大35岁。2例有结婚生育史,3例未婚有性生活史。病灶在外阴部4例,另一例外阴阴道同时发现病灶。赘疣最大者如葵花子仁大、最小者如米粒样大。病灶最少1个,最多者5个。临床症状为外阴不适、或瘙痒。白带增多,色黄而臭。或自己触及到异物而就诊。5例患者皆经病理检查,确诊为尖锐湿疣。

治疗方法:用鸦胆子去壳取仁(量酌情而定)碾碎,加少量米酒调成糊状,装瓶备用。用时以牙签取少许敷于赘疣上,并注意保护正常组织(可先用避孕套剪一块约2厘米见方大小覆盖周围组织,中间留一小洞刚好暴露出赘疣,然后再涂药。之后用棉花胶布固定。若在阴道中可用纱布填塞固定)。若用于外阴部会出现患处刺痛、或烧灼样痛。约2~3天赘疣自行脱落。之后用鸦胆子30克,黄柏、苦参、蒲公英各20克,浓煎为100ml左右,再加入冰片5克搅匀,作阴道冲洗。隔日一次,酌情用4~8次,以预防复发。

典型病例:某女,22岁,未婚,有性生活及人流史。就诊日期:1991年6月20日。门诊号:01238。患者诉半月前觉外阴不适,自己触及一赘生物,到某医

院西医外科诊为“尖锐湿疣,”遂用刀片刮除病变组织。5天前发现原患处又长出一赘生物,并伴白带量多异常、色黄而臭。妇检:外阴已婚未产型,在阴道口粘膜与皮肤交界处见一赘生物,呈锯齿状,如葵花子仁大,无触痛。阴道分泌物多,色黄而臭。冲洗阴道后在右侧阴道壁上1/3段处见米粒样大赘生物4粒,融合成片。取病变组织送检后,即用上述所制鸦胆子敷于阴道及外阴部赘疣上。

翌日诉外阴患处烧灼样痛,查见赘疣已充血肿胀。第3日告疼痛消失,赘疣脱落。第4日阴道赘疣也脱落。随后用上述诸药作阴道外阴冲洗8次。白带正常,诸症告愈。病理检查报告证实为尖锐湿疣。

体会:尖锐湿疣属于中医的赘疣之类,因湿热毒邪壅滞而发。而鸦胆子性苦寒,能清热解毒、腐蚀赘疣,为治疗本病的良药。药理研究也证明,鸦胆子油对赘疣细胞有毒性作用。能使细胞破坏,细胞核固缩。最后细胞坏死脱落。笔者体会,鸦胆子生用药性峻猛得酒配更助其药性,不仅使赘疣很快坏死脱落,且对正常皮肤也有损伤。故只能用在赘疣上。熟用则药力缓和,对正常组织无明显损伤。故能与黄柏、苦参、公英、冰片等清热药用于其他正常组织,以达到荡涤湿热毒邪、预防复发的作用。