

结节性坏死性皮炎验案

第一军医大学中医系 (广州510515) 臧堃堂

主题词 皮炎/中医药疗法 犀角地黄汤/治疗应用 △结节性皮炎

刘××,男,44岁。1985年5月9日诊。

1980年初全身皮肤遍发结节样疱疹,继则溃破,深入皮下,反复发作,致新疹与瘢痕并见,红肿与流脓同现。1980年8月起三次住广州某医院,又就诊于广州、北京多家医院,住院时作三次病检,报告为表皮坏死形成溃疡,局部呈结节状隆起,表面有红染物质蛋白液渗出,并有大量嗜酸性粒细胞、中性粒细胞和淋巴细胞渗出,血管周围有同样炎症细胞渗出,经会诊确诊为“结节性坏死性皮炎”。应用氢化考的松、红霉素、庆大霉素、氯喹、DDS等,并长期用强的松以控制症状,若其量减至20mg/d,皮损即行复作,苦不堪言。

刻诊:病发四载有余,现皮疹遍发,初发与收没并存,红疹及脓疱互见,疤痕累累,体无完肤,秽臭不堪,纳食尚可,二便通调,脉来濡数,苔腻、舌红。证系血热毒邪夹湿,瘀滞络道,聚而不解,先拟凉血清热、利湿解毒法,仿犀角地黄汤加减,佐扶正托毒之品,冀希血热毒邪与湿邪离散。处方:水牛角片(先煎)30克,大生地20克,赤芍10克,丹皮10克,土茯苓30克,当归尾10克,紫丹参15克,生黄芪20克,生甘草10克。水煎服,每日一剂。

二诊(1985年5月21日):疱疹渐痂化,红瘀得减,新疹未见多发,秽液仍泌泄,脉濡,苔腻渐化,舌红。前方加土茯苓为50克,增入生苡仁30克,防风10克,板蓝根15克,天花粉10克,陈皮6克。嘱递减强的松。

三诊(1985年5月30日):增水牛角至40

克,加黄柏、苍术各10克。

四诊(1985年6月23日):病情日趋好转,皮损平复,有色素沉着,未见新疹,脉弦细,苔薄、舌红。续撤激素。增入炮山甲(打)10克,以化瘀软坚,消解结节疤痕,隔日一剂。

六诊(1985年11月7日):前方加巴戟肉15克,仙灵脾15克,每周二剂。

七诊(1986年2月26日):药后皮损平复,局部有瘢痕及色素沉着。激素已撤净三月,中药停药二月。然春节应酬,饮食失节,兼感时邪,遍身皮疹散发,渐次增多,脉弦滑,舌红、苔薄腻微黄。证系血热毒邪死灰复燃,治宗前法。处方:水牛角片(先煎)90克,赤芍10克,生地50克,丹皮15克,土茯苓90克,元参10克,生石膏15克,归尾10克,炮山甲(打)10克,巴戟天10克,仙灵脾10克,板蓝根15克,绿升麻15克,苍术6克,生苡仁30克,甘草15克。每日一剂,病情控制后,改为每周二剂。

1988年4月10日随访:患者服上方20余剂,病情完全控制,未用激素,以后每周二剂,未见复发。然瘢痕结节,色素沉着未撤除,要求中药消解,综合上述诸方加减,制丸以调之。

1988年10月3日随访:皮损瘢痕、皮下结节均消退,色素沉着亦淡化,近察可见痕迹,药已停服。至此,本病症基本痊愈。

按:本例仿犀角地黄汤,重用水牛角,并以板蓝根助之;伍四妙加减,以土茯苓利湿泄毒、山甲消结化瘀,控制病情;病程长达数载,用黄芪以扶正托毒,后用巴戟天、仙灵脾壮阳益肾,促肾气之生发,使毒素尽撤,病变向愈。然停药早则难免复燃,故仍宜减量维持,始能全效。