

十二指肠壅积症治验举隅

江苏省泰兴县口岸医院 (江苏 225421) 田炳照

主题词 十二指肠梗阻/中医药疗法

① 十二指肠壅积症

十二指肠壅积症,是指由各种原因引起十二指肠远端或十二指肠空肠交界处的梗阻,以致十二指肠近端扩张,内容物壅积,从而产生的一组临床证候。祖国医学认为:“胃气以下行为顺”,外邪阻滞,气失和降,则如《临证指南》所云:“胃气上逆固病,即不上逆,但不通降亦病矣”。症见胃脘胀满,食入胀加,暖气或呕。笔者临证中,辨证结合辨病,取得较好疗效,兹举验案数则,供诸同道,祈请教正。

1. 脾胃气虚,升降失司

蔡××,男,34岁。胃脘胀满,二年有余,饥则稍缓,食入胀加,暖气略舒,大便溏薄,日2~3次,口淡粘腻,纳谷不香,近数月来,脘胀加剧,每餐2两,入暮仍胀,不能进食,甚则呕吐。钡剂透视为十二指肠壅积症。舌质淡红,苔薄白腻,脉细。此脾失健运,湿浊内蕴,胃失和降,治当化湿醒脾,和胃降逆。处方:

木香6克,砂仁3克(后入),姜半夏10克,陈皮10克,党参10克,白术10克,山药15克,扁豆20克,旋复花10克(包),代赭石30克(先煎)。

调治2月,诸症悉减,继以香砂六君丸善后调理1月,钡剂复查,十二指肠通钡顺利。

按:本案历经数年,胃气为邪所阻,通降之机失利,脾无所禀,无以行气于脏腑,气日以衰,脾胃气虚。乃予木香、砂仁、半夏、陈皮理气化湿;党参、白术、山药、扁豆益气健脾,使清气得升;旋复花、代赭石降逆和胃,使浊气得降,以恢复升降相协之机。

2. 胃阴亏虚,通降失职

李××,女,21岁。胃脘胀满,已有年余,纳入胀加,或饥而不欲食,口干灼热,溲黄便结。钡剂透视诊为十二指肠壅积症。他医投通腑之品,便虽通而诸症益甚,仅取效一时,舌红,苔少,脉细数。乃胃阴亏虚,通降失职,法当滋阴养胃,降逆通腑。处方:

北沙参15克,麦冬10克,石斛10克,玉竹10克,白芍10克,乌梅20克,甘草6克,佛手10克,柏子仁10克,麻仁10克,瓜蒌仁10克,旋复花10克(包),制大黄10克。

调治2月余,诸症减轻,钡剂透视检查:十二指肠通钡尚顺利,球部、降部未见扩张。

按:阴液不足,胃失濡养,气失和降,受纳无权,燥土之地,以雨露滋之,使以生万物,釜中有水方能为炊。宗《类证治裁》所云:“胃阴不足,不饥不食,口淡无味,当清润以养之”,取北沙参、石斛、麦冬、玉竹并白芍、乌梅、甘草之酸甘化阴,以滋养胃阴,润无寒凉之嫌,滋无腻满之弊。大肠失濡,增水行舟为法,攻之则“胃气益弱,反不能行其药力,而病所以反加也”(《医述》引《见闻录》),予麻仁、蒺藜、柏子仁、制大黄润肠通便;虽未见胃气上逆之症,仍结合辨病加降逆之旋复花伴制军以助胃气下行。

3. 湿邪蕴阻,通降失常

陈××,男,45岁。胃脘胀痛近一年,食入胀加,暖气方舒,觉有一气球攻窜于心下,口渴不欲饮水,纳谷乏味,溲下黄赤,大便或秘或溏,上消化道钡剂检查,见胃及十二指肠扩张,蠕动减弱,偶见逆蠕动,舌质淡红,苔厚浊腻满舌,脉濡。属湿浊内蕴,困遏中焦,枢纽失利,治应燥湿健脾,和胃降逆。处方:

苍术 10 克, 川朴 10 克, 白术 15 克, 茯苓 10 克, 陈皮 10 克, 姜半夏 10 克, 扁豆 20 克, 炒苡仁 30 克, 砂仁 5 克(后入), 旋复花 10 克(包), 生大黄 10 克(后入), 代赭石 30 克(先煎)。

缠绵 3 月余, 脘胀减轻, 纳谷增加, 舌苔转薄, 以党参 10 克、山药 15 克易砂仁、川朴, 又调半月, 诸症悉减, 上消化道钡透, 钡剂能顺利排至空肠。

按: 湿浊内蕴, 阻遏气机, 脾为阴土, 喜燥恶湿, 湿邪内侵, 常先困脾, 然“胃为燥土, 有时为水湿所伤, 则阳气不振”(《医经余论》), 故予苍术、川朴、白术、茯苓、陈皮、半夏、扁豆、苡仁、砂仁燥湿健脾, 理气和胃。胃失通降, 腑气不行, 有形之邪内结, 遵《临证指南·胃脘痛》所云: “若有形之滞, 堵塞其中, 容纳早已无权, 得助而为实实, 攻之逐之等剂, 又不可缓也”, 投生军攻涤肠腑, 旋复、代赭、川朴等降逆和胃, 下气宽中, 奏胃气降、浊气行、清气升之效。

4. 肝逆犯胃、气机失降

奚××, 女, 29 岁。近三年来, 胃脘胀满, 攻撑疼痛, 痛及两胁, 噯气频作, 噯之稍

舒, 大便干结, 曾在某地检查, 钡透诊为十二指肠壅积症, 肝功能正常范围。月经后期, 量中色黯、夹块, 腹痛, 块下痛缓, 经前胸胁、乳房、少腹胀痛, 舌红、苔薄白, 脉弦。系肝郁气滞, 横逆犯胃, 胃失和降, 治应疏肝理气, 和胃降逆。处方:

柴胡 6 克, 元胡 10 克, 香附 10 克, 枳壳 10 克, 白芍 10 克, 甘草 6 克, 旋复花 10 克(包), 生大黄 10 克(后入), 半夏 10 克, 当归 10 克。

本方调治 2 月, 纳谷增、胀痛减, 钡剂检查, 仍不能顺利排至空肠。

按: 精神抑郁, 肝气郁结, 木失疏泄, 横逆犯胃, 诚如张锡纯所云: “胃受肝胆冲气之排挤, 其势不能下行, 转随其排挤之力而上逆”, 宗“治肝可以安胃”之法, 予柴胡、元胡、香附、枳壳、旋复花疏肝理气, 通络止痛; 当归、白芍养血柔肝; 旋复、生大黄、半夏和胃降逆。于是则肝气条达, 胃不受侮, 胃气和降, 胀痛自止。病在肝郁, 伤在胃气, “理气还防伤阴”, 不可过用香燥之品, 以防耗伤胃阴。胃阴不足者, 宜佛手、朴花、绿萼梅等理气不伤阴之品。久病入络者, 辛柔和血, 也可酌加。

中药“速效烧伤散”治疗烧伤 102 例临床观察

山西省绛县震雷烧伤血管瘤研究所 (山西 043601) 孙先武 赵作伟 孙震宙
山西省运城地区科学技术委员会 王自育 柴砚中

渗出与感染是烧伤治疗过程中的棘手问题。由绛县震雷烧伤血管瘤研究所研制出的“速效烧伤散”, 满意地解决了这两个难题。

使用“速效烧伤散”治疗深浅 II° 烧伤, 5 小时可以控制渗出, 20 小时结痂, 一经结痂即可有效地防治感染。小面积烧伤不用其他消炎药, 敷“速效烧伤散”一次痂落即愈。同时此药还有极强的抗感染性能, 对已经感染的创面, 清洗干净敷药后 20 小时能够消除水肿, 清除脓液形成新痂皮。

药物组成: 狗骨 30%, 珍珠 1.8%, 轻粉 3.2%, 枯矾 30%, 椿白皮 15%, 黄柏 10%, 芒硝 10%。

配制方法: 狗骨用泥制烤炉或耐火砖制烤炉焙

黄, 入醋便碎; 珍珠用阳城锅密封文火炸或入豆腐中久蒸炸、研极细过箩; 其余药味、晒干粉碎过箩, 而后搅匀即可。

使用时先将烧起的水泡剪去, 进行常规清洗, 每 40~50 克药粉用一个鸡蛋清调和成稠糊状, 视创面大小, 剪白布略大于创面, 将药糊摊布上一毫米厚敷患处, 20 小时取掉敷料便结痂, 一般一次即可, 个别因用药前处理不当需再换一次, 而后痂皮自然脱落即愈。每 40 克调好的药粉可敷创面 1000 平方厘米左右。该药对水、气、火、电、化学等烧伤均使用。

疗效观察: 近年来治疗 300 例, 除 1 例严重烧伤转院外, 其余全部治愈, 治愈率达 99.7%。