

的治疗小儿疳症的秘方,由单味皂荚炮制而成。制作方法:取干燥、皮厚、质硬光滑、深褐色、无虫蛀之皂荚,刷净泥灰,切断,放入锅内,先武火、后文火煨存性,剥开荚口,以内无生心为度。煨后放在干净地上,除其火毒,防止炭化,碾细为末,过80目筛,瓶装备用。用量,1~2岁每日1克,3岁及3岁以上每日2克。用糖拌匀吞服。现分别介绍如下:

一、治疳积 皂荚味辛能行,善消乳积谷食所致之疳疾,既能升发胃气,又能通肺及大肠气,辅以食糖,甘以补中,使之健脾益气,二者合用醒脾开胃,升清降浊,缓中健运。如患儿吴××,女,5岁。因纳呆厌食5月,身体日渐消瘦,经多方治疗,终未见好转。证见面黄肌瘦,毛发稀疏,精神萎靡,困倦喜卧,纳呆厌食,脘腹胀满,手足心热,烦躁不宁,大便干结,小便黄油,舌质淡红、苔白腻,脉滑细。诊为小儿疳证,予以皂荚散,二剂后临床症状明显减轻,六剂后食欲正常,继以燕窝肥儿糖浆善其后。

二、疔虫证 《别录》载“牙皂消痰杀虫,治骨蒸,开胃。”曾治张××,男,4岁。证见面色萎黄,形体消瘦,脐腹疼痛,时发时止,烦躁不安,时常啼哭,鼻孔作痒,睡中齞齿,口流清涎,大便不调,唇内有小白点如粟粒状。诊为虫证,遂予皂荚散,药进二剂,疼痛明显减轻,四剂后下蛔虫三条而愈。一月后随访,患儿唇内小白斑点已消失。

三、止泄泻 皂荚炮制后,改变了原有药物性能,对小儿急、慢性泄泻,有一定的收敛止泻作用。曾治刘××,女,3岁。患儿因食不洁之物而致泄泻半月,证见大便如水样,内杂不消化食物,每于饭后作泻,腹胀不舒,不思饮食,神疲倦怠,舌淡、苔白,脉缓而弱。诊为脾虚泄泻,投以皂荚散,服三剂而病愈。据现代药理研究,皂荚对某些革兰氏阴性肠内致病菌有抑制作用,皂荚炮制后,又含活性炭,能增强其收敛吸附作用。

皂荚散制方之义,在于醒脾开胃,升清降浊,缓中健运,消积滞,积去则清灵之脏气得康复。通过二十余年的临床验证,本方无损胃气之虞,亦未见一例中毒及不良反应,且患儿易于接受。

湖北省仙桃市中医医院(湖北433000)汪貽魁

## 议中医烙法之改进

中医烙法用于治疗慢性扁桃体炎和扁桃体肥大症(中医称“乳蛾”),距今已有千余年的历史。至今仍被临床所应用,说明它具有一定的实用性和科学性。现笔者就烙法的不足之处,提出一些改进意见和方法。

鉴于目前烙法中使用的小烙铁,存在着诸如散热快、作用时间短;烙铁触及咽部时,容易出现干呕;疗程过长等不足。笔者认为,可以从以下几个方面加以改进:一、选用一些加热快、散热慢、作用时间长的金属材料作烙具,形状也可多种多样。二、采用电烙器烙治乳蛾,也不失为改进烙具提高疗效的捷径。不仅可减少烙治次数,还能缩短疗程,便于患者接受。只应在防止烙具与扁桃体组织粘连、防止组织热伤方面再作些改进。三、用西药辅助。可在施烙前向咽部喷射适量麻醉剂作表面麻醉,即可减少干呕,提高患者的耐受力,从而延长烙治时间,缩短疗程。四、减少烙治时的间隔时间。有人认为施烙间隔时间以一周为好,待白膜脱尽后再烙,也有人主张间隔2~3天为好。有人通过烙后扁桃体组织切片证明,每次烙后,由于纤维组织增生,并在其上有上皮增生而增加了组织厚度,因而得出了间隔4天以上再烙,几乎等于多加烙一次的结论。实际上,在烙后当时即产生烙痂,第二天形成白膜,为了阻止其增生,可在第二天再烙,减少间隔时间,缩短疗程。

中医烙法由于只是烙除部分组织,烙后残留的扁桃体组织中的淋巴组织仍属正常,故于免疫功能影响不大。再者,烙法的适应症较宽,还具有不出血、不粘连、术后不发热、不疼痛等特点,这些是手术切除所欠缺的。因此,要重视中医烙法的应用。

大连市中医院(辽宁163111)朱自强

## 临床报道经得起验证

小儿高热,临证治疗,颇为棘手,大剂应用石膏心有余悸。读了贵刊1989年第10期报道《大剂石膏治疗小儿高热40例临床观察》一文后,心里豁然开朗。笔者应用于临床,治疗30例小儿高热,屡试屡效。

如:蔡××,男,5岁。患儿二天前夜里受凉后发热,鼻塞流涕,头胀。前医用青霉素,银翘散加减(其中石膏20克)治疗未见好转,继而体温高达40.5℃,用柴胡注射液,复方安基比林,热仍未退,烦躁不安。于1990年4月23日邀我诊治,证见:高热,口渴,皮肤灼手,颜色鲜红,神怠,嗜睡,躁忧不宁,大便三日未解,纳差,舌红、苔干燥,脉数。血白细胞总数4500/mm<sup>3</sup>,嗜中性细胞50%,淋巴细胞40%。治宜清热通腑,生石膏120克,三叶青10克,炒知母10克,大黄5克(后下)。一剂后2小时开始解大便,随之热渐退。继服一剂高热退尽,诸症消失。

浙江省绍兴县柯桥人民医院(浙江312000)

钱海青