

③ 孕期食用海带 ④ 哺乳期食用海带

⑤ 心情舒畅

9. 皮肤病的常见病因是 ○○○○○

① 风邪 ② 湿邪 ③ 热邪 ④ 虫

⑤ 血虚风燥

10. 癣的传染途径可能有 ○○○○○

① 动物传染 ② 人传染

③ 衣物用具传染 ④ 自身传染

⑤ 空气传染

11. 瘾疹的病因除禀赋不耐外, 还有 ○○○○○

① 食物 ② 病灶 ③ 精神因素

④ 寒冷 ⑤ 药物

12. 外痔可分为 ○○○○○

① 结缔组织外痔 ② 静脉曲张外痔

③ 血栓性外痔 ④ 嵌顿痔 ⑤ 炎性痔

13. 肛肠病常见症状有 ○○○○○

① 便血 ② 肿疼 ③ 脱垂 ④ 便秘

⑤ 溃疡

14. 冻疮发生的常见病位为 ○○○○○

① 手 ② 足 ③ 鼻 ④ 耳 ⑤ 面部

15. 血栓性深静脉炎的病因常见为 ○○○○○

① 久卧 ② 久坐 ③ 产后伤气

④ 盆腔手术 ⑤ 外伤

五、判断题(认为正确的, 在题后的○内打“√”, 错误的打“×”, 并改正错误, 不改正错误, 该题无分。每小题2分, 共10分)

1. 半阴半阳证肿疡外用箍围药多以醋或蜂蜜调配。○

2. 乳头漏多见于已婚30—40岁妇女。○

3. 风热疮的病因病理为风热, 血热蕴于肌肤, 不

得疏泄而发病。○

4. 前列腺炎内治: 虚证以补益为主, 实证以散结为主。○

5. 肠痛的病因病理, 不外乎湿阻、气滞、瘀滞、热壅、湿热壅积、瘀滞不散、热盛肉腐成脓。

六、简答题(每小题5分, 共20分)

1. 何谓善恶顺逆?

2. 痢的概念、特点是什么?

3. 瘰的病因病理是什么?

4. 肛瘻的辨证要点是什么?

七、病案题(15分)

王×, 男, 64岁, 工人, 1982年6月5日初诊。

主诉: 背部红肿疼痛、高热、烦躁一周。

现病史: 一周前无明显原因诱发, 背部出现肿胀疼痛, 伴寒战高热, 头痛, 食欲不振; 给以抗生素治疗, 病情无好转, 继之疼痛加剧, 唇燥口干, 便秘尿赤, 烦躁不安而来求治。

查体: (主要阳性体征) T 39.5°C、P 110次/分、R 25次/分、BP 90/60 mmHg, 急性痛苦面容、烦躁不安、精神差、形体消瘦。背部可见约15×12 cm²的肿块, 疮形平坦, 边界不清, 色紫红, 有多个粟粒样的脓头, 舌红绛, 苔黄糙, 脉细数。

白细胞总数 15,000/mm³ 中性 90%

血糖 150 mg/dl

请写出:

1. 病名:

2. 证型:

3. 治则:

4. 方剂:

陕西省1991年上半年高等中医自学考试

《中医妇科学》试题参考答案与评分标准

一、填空题(每空0.5分, 共10分)

1. 宋 产科教授 2. 居经

3. 激经 4. 经水

5. 主胞胎 6. 调理气血 疏肝

7. 血热 8. 超过7天以上 淋漓半月

9. 青少年 10. 十八周岁 中断达

三个月以上

11. 清肝引经汤 12. 妊娠有关

13. 勿拘于产后, 亦勿 14. 湿热

忘于产后

15. 生化汤

二、单项选择题(每小题1分, 共10分)

1. ④ 2. ① 3. ③ 4. ② 5. ③

6. ④ 7. ① 8. ③ 9. ① 10. ①

三、双项选择题(每小题1分, 共10分)

1. ①④ 2. ④⑤ 3. ③④

4. ③④ 5. ①② 6. ①④

7. ④⑤ 8. ①③ 9. ①⑤ 10. ①③

四、多项选择题(每小题1分,共10分)

1. ①②④⑤ 2. ①③④⑤ 3. ②③⑤

4. ②④⑤ 5. ①③④⑤ 6. ①②③④

7. ①②③⑤ 8. ①②③④⑤ 9. ①②④⑤

10. ①②③④

五、判断题(每小题2分,共20分)

1. ×(子门即子宫之门,指子宫颈口) 2. √

3. ×(任脉与全身阴脉会于臍口穴) 4. √

5. ×(一是亡血伤津,二是瘀血内阻,三是外感六淫及饮食劳伤所伤) 6. √

7. √ 8. ×(脾胃虚弱、妊娠恶阻的治疗,首选方是香砂六君子汤)

9. ×(崩漏的发病机理主要是冲任损伤,不能制约经血)

10. √

六、简答题(每小题5分,共15分)

1. 赤芍、丹参、桃仁、三棱、莪术

(每药1分,共5分)

2. 滋肾补肾、疏肝养肝、健脾和胃、补益气血、活血化瘀、理气行滞、清热凉血、温经散寒、利湿除痰、解毒避秽(每项0.5分,共5分)

3. 经行吐衄有肝经郁火、肺肾阴虚。经间期出血有肾阴虚、湿热、血瘀。(每项1分,共5分)

4. 月经后期,月经量少,痛经,带下病,妊娠腹

痛,产后腹痛,阴疮(每项1分,对5项即给5分)

5. ① 适值经期或经期前后 ② 外感发热或寒热如疟 ③ 经水猝止或过多或淋漓难净 ④ 神昧不清 ⑤ 昼则明了夜则谵语(每项1分,共5分)

七、病案(15分)

诊断:1. 月经量多 2. 子宫下脱(2分,每病1分)

辨证分析:(6分,6个要点,每点1分,若仅答出要点只给3分发挥好的给6分)

① 证属气虚 ② 缘由产后过劳,失于调理,耗血损气以致气虚。③ 中气不足不能下载子宫,子宫位置下移,故小腹下坠。④ 气虚不能制约膀胱,故小便频数。⑤ 气虚已久,经行气随血泄,气虚益甚,气不摄血,故月经量多,用纸4~5卷。气阳不足不能温煦血海,故色淡,质清稀。⑥ 脾主中州,主四肢,气虚中阳不振。故面色不华,四肢无力,少气懒言,中气不足,脾胃虚弱,故食欲不振。舌苔脉象均为气虚所致。

治法:补气升提,摄血固冲(1分)

方名:补中益气汤加续断15g,金樱子10g,鳖头一个(方名1分,加药各0.5分)

药物:黄芪60g 白术12g 陈皮6g 炙升麻6g 柴胡9g 当归10g 党参12g(每药0.5分) 3付水煎服。

丹参治疗晚期血吸虫病腹水临床观察

湖北省蒲圻市血防医院(湖北 437300) 戴声扬

我院于1984年10月~1989年10月期间,运用传统活血化瘀药丹参治疗晚期血吸虫病腹水8例,现报告如下。

临床资料:8例晚期血吸虫腹水患者中,男3例,女5例。年龄40~69岁。病程3~28年。按临床主要体征分为巨脾型5例(1例后切脾),腹水型3例。合并慢性肾炎及风心病(二尖瓣狭窄)各1例,HBsAg阳性1例。

治疗方法:复方丹参注射液20~30毫升(浙江瑞安制药厂,批号:910518)加10%葡萄糖水300~500毫升静脉滴注,一日1次,20天为一疗程。一疗程完后,间歇3~5天,进行下一疗程。一般治疗观察2~

3个疗程。另外,肝泰乐、维丙胺、维生素及少量利尿剂可同时口服,但不用其他护肝药。

治疗结果:8例患者住院时间为47~92天,平均74天,治疗2个疗程者2例,3个疗程者6例。治疗后腹水消退7例,无变化1例,其他症状亦明显改善或消失。

体会:腹水为晚期血吸虫病主要临床表现之一,且缠绵难退,目前尚无较好的治疗方法。丹参为我国传统活血化瘀药物,具有扩张血管、降低门脉压力、抗肝纤维化、改善血液流变异常的作用,从而使肾脏的灌注得到改善。尿量增多,腹水消退。在治疗中,如能配合使用复方氨基酸、血浆白蛋白,效果更佳。