

4. ③④ 5. ①② 6. ①④
7. ④⑤ 8. ①③ 9. ①⑤ 10. ①③

四、多项选择题(每小题1分,共10分)

1. ①②④⑤ 2. ①③④⑤ 3. ②③⑤
4. ②④⑤ 5. ①③④⑤ 6. ①②③④
7. ①②③⑤ 8. ①②③④⑤ 9. ①②④⑤
10. ①②③④

五、判断题(每小题2分,共20分)

1. ×(子门即子宫之门,指子宫颈口) 2. √
3. ×(任脉与全身阴脉会于臍口穴) 4. √
5. ×(一是亡血伤津,二是瘀血内阻,三是外感六淫及饮食房劳所伤) 6. √
7. √ 8. ×(脾胃虚弱、妊娠恶阻的治疗,首选方是香砂六君子汤)
9. ×(崩漏的发病机理主要是冲任损伤,不能制约经血)
10. √

六、简答题(每小题5分,共15分)

1. 赤芍、丹参、桃仁、三棱、莪术
(每药1分,共5分)
2. 滋肾补肾、疏肝养肝、健脾和胃、补益气血、活血化瘀、理气行滞、清热凉血、温经散寒、利湿除痰、解毒避秽(每项0.5分,共5分)
3. 经行吐衄有肝经郁火、肺肾阴虚。经间期出血有肾阴虚、湿热、血瘀。(每项1分,共5分)
4. 月经后期,月经量少,痛经,带下病,妊娠腹

痛,产后腹痛,阴疮(每项1分,对5项即给5分)

5. ① 适值经期或经期前后 ② 外感发热或寒热如疟 ③ 经水猝止或过多或淋漓难净 ④ 神昧不清 ⑤ 昼则明了夜则谵语(每项1分,共5分)

七、病案(15分)

诊断:1. 月经量多 2. 子宫下脱(2分,每病1分)

辨证分析:(6分,6个要点,每点1分,若仅答出要点只给3分发挥好的给6分)

① 证属气虚 ② 缘由产后过劳,失于调理,耗血损气以致气虚。③ 中气不足不能下载子宫,子宫位置下移,故小腹下坠。④ 气虚不能制约膀胱,故小便频数。⑤ 气虚已久,经行气随血泄,气虚益甚,气不摄血,故月经量多,用纸4~5卷。气阳不足不能温煦血海,故色淡,质清稀。⑥ 脾主中州,主四肢,气虚中阳不振。故面色不华,四肢无力,少气懒言,中气不足,脾胃虚弱,故食欲不振。舌苔脉象均为气虚所致。

治法:补气升提,摄血固冲(1分)

方名:补中益气汤加续断15g,金樱子10g,鳖头一个(方名1分,加药各0.5分)

药物:黄芪60g 白术12g 陈皮6g 炙升麻6g 柴胡9g 当归10g 党参12g(每药0.5分)
3付水煎服。

丹参治疗晚期血吸虫病腹水临床观察

湖北省蒲圻市血防医院(湖北 437300) 戴声场

我院于1984年10月~1989年10月期间,运用传统活血化瘀药丹参治疗晚期血吸虫病腹水8例,现报告如下。

临床资料:8例晚期血吸虫病腹水患者中,男3例,女5例。年龄40~69岁。病程3~28年。按临床主要体征分为巨脾型5例(1例后切脾),腹水型3例。合并慢性肾炎及风心病(二尖瓣狭窄)各1例,HBsAg阳性1例。

治疗方法:复方丹参注射液20~30毫升(浙江瑞安制药厂,批号:910518)加10%葡萄糖水300~500毫升静脉滴注,一日1次,20天为一疗程。一疗程完后,间歇3~5天,进行下一疗程。一般治疗观察2~

3个疗程。另外,肝泰乐、维丙胺、维生素及少量利尿剂可同时口服,但不用其他护肝药。

治疗结果:8例患者住院时间为47~92天,平均74天,治疗2个疗程者2例,3个疗程者6例。治疗后腹水消退7例,无变化1例,其他症状亦明显改善或消失。

体会:腹水为晚期血吸虫病主要临床表现之一,且缠绵难退,目前尚无较好的治疗方法。丹参为我国传统活血化瘀药物,具有扩张血管、降低门脉压力、抗肝纤维化、改善血液流变异常的作用,从而使肾脏的灌注得到改善。尿量增多,腹水消退。在治疗中,如能配合使用复方氨基酸、血浆白蛋白,效果更佳。