

者在数年治疗上述肿瘤中体会到：按原方木鳖子用量是不能达到磨消肿瘤、散结解毒之效力。再则木鳖子炙法应该改进，既不能让有毒物质蓄积体内，又不能让有效成分挥发掉，所以笔者认为木鳖子去壳的生用量应该是150g。木鳖仁的炙法：把150g的生木鳖子仁用滑石粉500g，同放在锅内加热不停的翻动，达到一定温度后冒出黄烟刚尽时则把滑石粉筛出。此时木鳖子仁外边焦黄而内又酥脆便于加工粉碎。木鳖子苦微甘温，有毒，有消肿散结、祛毒治恶疮之功效。

《本草经疏》云：“木鳖子，为散血热，除痛毒之要药。”虽然用量较大，并长期服用，经观察无1例有副作用发生，无1例肝功能损害。因病在上焦，笔者采用醋、蜜、面粉为糊合药

为丸，让其药在胃内慢慢溶化，以利药物在“正邪交争”中在体内保持一定的药物浓度，为磨消肿瘤顽疾，达到日积月累攻破之目的。因麝香价格昂贵，虽每料药用3g，但也可达到引经达络之目的。

加味小金丹在服用中，则用海藻、甘草同用，比例为2:1。在此服药期间没有发生毒副作用。“盖以坚积之病，非平和之药所能取捷，必令反夺，以成其功也”。在治不同的肿瘤中加用全蝎、甲珠虫类药物，或加用红参、白芥子、独角莲等，这无疑加强了原方小金丹破积消岩之功效。加味小金丹有草乌头、木鳖子等温热药。虽然患者有舌质红、心肝郁热等现象，但大剂量口服此药没有发现燥热伤阴或郁热上冲之象。

乳癖消治疗乳腺增生114例疗效观察

龙家俊* 严崇华* 阎菊妹*

乳腺增生是女性乳房常见病，临床主要表现为乳房肿块，多伴有乳房刺痛或胀痛，属祖国医学乳癖范畴。我们研制了乳癖消煎剂，取得较好疗效，现将114例治疗情况报告如下。

1 临床资料

本组114例均为我院乳腺病专科门诊病例。年龄16~54岁，其中31~40岁者最多，有58人。未婚10例，已婚104例，已婚未生育6例，生一胎67例，一胎以上31例。药物避孕者17例，上节育环者56例，结扎输卵管者12例。病程1年以下50例，1~5年46例，5~10年15例，10年以上3例。双侧乳房肿块者74例，单侧肿块40例。辨证分型属肝郁夹痰型32例，肾阳虚型11例，肾虚肝郁型71例。

2 治疗方法

所有病例均用乳癖消煎剂治疗。方药：天冬30g，大贝母12g，生牡蛎(先煎)30g，白芥子10g，白僵蚕10g，露蜂房10g，昆布15g，海藻15g，荔枝核各12g，鹿角片(先煎)12g，三棱10g，莪术10g，生麦芽30g。每日1剂，2月为1疗程，月经期停药。

3 疗效标准及结果

按国家中医药管理局医政司1988年10月下发的“中医内外科病证诊断疗效标准(试行)”，乳腺增生病疗效评定标准：乳房疼痛及肿块消失为痊愈；乳房痛减、肿块缩小为好转；乳房疼痛未减轻、肿块未见缩小为无效。本组经28~240天治疗，痊愈71例(62.2%)，好转41例(36%)，无效2例(1.8%)，总有效率98.2%。在痊愈的71例中，服药不足1疗程者3例，1疗程者51例，2疗程者15例，3疗程者2例。

4 讨论

我们根据乳腺增生病的临床表现，发现病人或多或少都有肝郁气滞、肾虚、痰伏、瘀阻等因素，故以乳癖消煎剂方中荔枝核疏肝理气散结；三棱、莪术活血化瘀、理气止痛；鹿角片温补肾阳，且能活血消肿；大贝母、生牡蛎、昆布、海藻化痰软坚散结；白芥子消皮里膜外之痰；白僵蚕化痰散结。天冬配鹿角片阴阳两补。生麦芽可抑制催乳素分泌，而乳腺增生患者中催乳素水平明显高于正常人。诸药同用可疏肝理气，补肾化痰，软坚散结，消肿止痛，恢复卵巢功能，调节性激素间的相对平衡。

乳癖消煎剂治疗乳腺增生病虽有很好的疗效，但

为了方便服用，我们准备改制为冲剂使用。

* 南京市玄武医院，江苏省南京市杨将军巷21号

(210018)

收稿日期：1991-02-01