

应用加味小金丹治疗肿瘤的体会

刘玉林*

主题词 腮腺肿瘤/中医药疗法 舌肿瘤/中医药疗法
小金丹/治疗应用

古方小金丹历来是治疗外科疾病的一个有效方剂,近年来笔者应用加味小金丹治疗某些肿瘤,有消岩散结、化痰法毒之功。兹举2则如下。

1 上石疽(腮腺混合瘤)

张某,男,58岁。该患者于1989年2月发现左侧颌下有1肿物日渐增大,因当地医院不能确诊,而转至吉林省某医院住院治疗,确诊为“腮腺混合瘤”,病理切片检查为“淋巴乳头状囊腺瘤”,因拒绝手术回当地治疗。患者发育营养尚可。左侧颌下可见有约6.0cm×8.0cm长条状肿块,肿块表面中等硬度,呈结节状,但表面光滑,肿块推之不移,触痛不明显,有时肿块局部有痠胀感,肿块表面无热感。近日来症状加重,张口有时困难,有时口唇麻木颤动感。伴有胸闷气短,并时有头晕,饮食大减。舌体伸缩尚可,舌体胖大质淡,脉象细涩。长期忧思患怒,气郁血逆与痰火凝结少阳、阳明两经,积久聚而成形,发为石疽。拟温通活络、消岩解毒化痰之法。口服加味小金丹。处方:

炙木鳖子仁150g,甲珠150g,制草乌75g,五灵脂75g,地龙75g,乳香35g,没药35g,墨炭10g,海藻60g,甘草30g,麝香3g。配1料,每服6g,1日3次,温黄酒为引送服。另用独角莲25g,生桃仁25g,生杏仁25g,大麻子仁50g,生马钱子10g,黑豆50g,川乌25g等药用麻油熬膏外敷局部。经内服外敷治疗2个月后,局部肿块缩小至2.0cm×3.0cm大小,

张口伸舌无异常,饮食已增,头晕、胸闷症状大减。遂减至每日服2次加味小金丹,每次仍6g。服该药4个月后颌下肿块已消失。现形体康健,能参加一般农业劳动。随访2年来,未见异常。

2 舌岩(舌下腺腺样囊性癌手术后)

张某,女,35岁。患者于1987年5月发现左侧颌下有1约鸡蛋黄大小的肿物,局部无热痛感。转至省某医院切除肿物,病理报告为“良性混合瘤”。返回当地无特殊治疗。1988年2月在左侧颌下又发现1肿物,生长较快,疼痛剧烈。又去省某专科医院病理检查为“舌下腺囊性癌”,做舌下腺切除术。住院期间做化疗2个疗程。出院后一般状态较好。1年后在左侧颌下手术的部位又有1约1.0cm×0.6cm×0.6cm大小的肿物。X片检查左下颌骨无明显骨质破坏。遂邀中医会诊治疗。患者形体瘦弱,左侧颌下的手术瘢痕中有一肿块,触痛明显,局部无红肿热痛,张口伸舌时疼痛加剧。舌质淡、无苔,脉沉细。心脾两经蕴热,郁火上炎,日久毒热瘀结而成此疾。拟扶正散结、化痰解毒法。拟用前方加味小金丹,去海藻、甘草,加红参35g,独角莲50g,白芥子50g。每日口服3次,每次6g,用黄芪汤送服。服药2个月后,查颌下肿块缩小至0.4cm×0.2cm×0.2cm大小,下颌骨无疼痛,局部触痛不明显,左肩胛活动自如,饮食如常。效不更方,继续服用,加味小金丹口服改为1日2次。服药1年后局部肿块消失,现能操理一般家务。

3 体会

小金丹出自清代王维德《外科全生集》,取白胶香、草乌、五灵脂、地龙、木鳖子、乳香、没药、当归、麝香、墨炭,糯米粉打糊为丸如芡实大,每服1丸,陈酒送下,覆盖取汗。治一切阴疽、流注、痰核、瘰癧、乳岩等症。笔

* 吉林省扶余市第二医院中医科,吉林省扶余市三岔河(131203)

收稿日期:1991-12-17;修回日期:1992-01-27

者在数年治疗上述肿瘤中体会到：按原方木鳖子用量是不能达到磨消肿瘤、散结解毒之效力。再则木鳖子炙法应该改进，既不能让有毒物质蓄积体内，又不能让有效成分挥发掉，所以笔者认为木鳖子去壳的生用量应该是150g。木鳖仁的炙法：把150g的生木鳖子仁用滑石粉500g，同放在锅内加热不停的翻动，达到一定温度后冒出黄烟刚尽时则把滑石粉筛出。此时木鳖子仁外边焦黄而内又酥脆便于加工粉碎。木鳖子苦微甘温，有毒，有消肿散结、祛毒治恶疮之功效。

《本草经疏》云：“木鳖子，为散血热，除痛毒之要药。”虽然用量较大，并长期服用，经观察无1例有副作用发生，无1例肝功能损害。因病在上焦，笔者采用醋、蜜、面粉为糊合药

为丸，让其药在胃内慢慢溶化，以利药物在“正邪交争”中在体内保持一定的药物浓度，为磨消肿瘤顽疾，达到日积月累攻破之目的。因麝香价格昂贵，虽每料药用3g，但也可达到引经达络之目的。

加味小金丹在服用中，则用海藻、甘草同用，比例为2:1。在此服药期间没有发生毒副作用。“盖以坚积之病，非平和之药所能取捷，必令反夺，以成其功也”。在治不同的肿瘤中加用全蝎、甲珠虫类药物，或加用红参、白芥子、独角莲等，这无疑加强了原方小金丹破积消岩之功效。加味小金丹有草乌头、木鳖子等温热药。虽然患者有舌质红、心肝郁热等现象，但大剂量口服此药没有发现燥热伤阴或郁热上冲之象。

乳癖消治疗乳腺增生114例疗效观察

龙家俊* 严崇华* 阎菊妹*

乳腺增生是女性乳房常见病，临床主要表现为乳房肿块，多伴有乳房刺痛或胀痛，属祖国医学乳癖范畴。我们研制了乳癖消煎剂，取得较好疗效，现将114例治疗情况报告如下。

1 临床资料

本组114例均为我院乳腺病专科门诊病例。年龄16~54岁，其中31~40岁者最多，有58人。未婚10例，已婚104例，已婚未生育6例，生一胎67例，一胎以上31例。药物避孕者17例，上节育环者56例，结扎输卵管者12例。病程1年以下50例，1~5年46例，5~10年15例，10年以上3例。双侧乳房肿块者74例，单侧肿块40例。辨证分型属肝郁夹痰型32例，肾阳虚型11例，肾虚肝郁型71例。

2 治疗方法

所有病例均用乳癖消煎剂治疗。方药：天冬30g，大贝母12g，生牡蛎(先煎)30g，白芥子10g，白僵蚕10g，露蜂房10g，昆布15g，海藻15g，荔枝核各12g，鹿角片(先煎)12g，三棱10g，莪术10g，生麦芽30g。每日1剂，2月为1疗程，月经期停药。

3 疗效标准及结果

按国家中医药管理局医政司1988年10月下发的“中医内、外、妇、儿、科病证诊断疗效标准(试行)”，乳腺增生病疗效评定标准：乳房疼痛及肿块消失为痊愈；乳房疼痛减、肿块缩小为好转；乳房疼痛未减轻、肿块未见缩小为无效。本组经28~240天治疗，痊愈71例(62.2%)，好转41例(36%)，无效2例(1.8%)，总有效率98.2%。在痊愈的71例中，服药不足1疗程者3例，1疗程者51例，2疗程者15例，3疗程者2例。

4 讨论

我们根据乳腺增生病的临床表现，发现病人或多或少都有肝郁气滞、肾虚、痰伏、瘀阻等因素，故以乳癖消煎剂方中荔枝核疏肝理气散结；三棱、莪术活血化瘀、理气止痛；鹿角片温补肾阳，且能活血消肿；大贝母、生牡蛎、昆布、海藻化痰软坚散结；白芥子消皮里膜外之痰；白僵蚕化痰散结。天冬配鹿角片阴阳两补。生麦芽可抑制催乳素分泌，而乳腺增生患者中催乳素水平明显高于正常人。诸药同用可疏肝理气，补肾化痰，软坚散结，消肿止痛，恢复卵巢功能，调节性激素间的相对平衡。

乳癖消煎剂治疗乳腺增生病虽有很好的疗效，但

为了方便服用，我们准备改制为冲剂使用。

* 南京市玄武医院，江苏省南京市杨将军巷21号

(210018)

收稿日期：1991-02-01