

附表 各病型骨髓细胞HBV抗原检测结果

| 病 型  | 例数  | HBsAg | HBeAg | HBcAg | HBsAg | HBsAg | HBeAg | HBsAg |
|------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|      |     |       |       |       | HBeAg | HBeAg | HBeAg | HBcAg |
| 症瘕   | 18  | 3     | 3     | 3     | 1     | 2     |       | 2     |
| 鼓胀   | 46  | 6     | 2     | 2     | 2     | 1     |       | 5     |
| 气滞血瘀 | 13  | 2     | 1     | 1     | 1     | 2     | 1     | 2     |
| 肝肾阴虚 | 18  | 2     |       | 1     | 1     |       | 1     | 2     |
| 肝郁脾虚 | 10  | 2     |       | 1     |       |       |       |       |
| 湿热未尽 | 8   | 1     |       | 1     |       |       |       | 2     |
| 气阴两虚 | 5   |       |       |       |       |       |       |       |
| 合计   | 118 | 16    | 6     | 9     | 5     | 5     | 2     | 13    |

本组 118 例血清 HBV 均阳性, 骨髓细胞 HBV 抗原阳性有 56 例 (47.5%), 从中医各病症分型看, 以症瘕、气滞血瘀、湿热未尽三型阳性者居多。临床上气滞血瘀型肝炎者症状重, 阳性体征多, 治疗困难; 湿热未尽型肝炎者亦症状重, 且多有黄疸, 治疗亦困难。我们考虑这些情况是否与骨髓细胞受 HBV 感染轻重有关。另外, 我们检测骨髓 HBV-DNA 有 3/5 例阳性。说明骨髓是可以受到 HBV 感染的, 骨髓细胞可能是 HBV 复制的场所。

对 20 例血清 HBV 阴性的健康对照者进行检测, 结果表明骨髓细胞 HBV 抗原均阴性, 可以说明骨髓细胞受 HBV 感染仅限于血清 HBV 阳性的感染病例。

由于本组肝病各型病例还尚少, 对中医证候与血清及骨髓细胞 HBV 感染之间的关系研究也还不深, 今后有待积累病例作进一步研究。

## 5 参考文献

- 1 陈梅龄, 等. ABC 法研究 HBsAg 和 HBcAg 在肝组织中的分布. 中华内科杂志 1985; (增刊):30.
- 2 高宗娴, 等. 肝病患者骨髓细胞乙型肝炎病毒感染的研究. 中华内科杂志 1991; (1):24.
- 3 万漠彬. HBV 肝外复制的意义. 国外医学·流行病学传染病分册 1990; (6):270.
- 4 Romet Lemonne JL, et al. Hepatitis B virus infection in cultured human lymphoblastoid cells. Science 1983; 221:667.

## 按推压法治疗损伤性髌前滑囊炎 67 例

尚世志<sup>1</sup> 汪俊著<sup>2</sup>

损伤性髌前滑囊炎属临床常见症。作者自 1988 年以来, 采用按推压法治疗损伤性髌前滑囊炎 67 例, 获得满意疗效, 现报告如下。

1 临床资料: 本组 67 例, 男性 32 例, 女性 35 例; 年龄最小的 15 岁, 最大的 68 岁, 15~30 岁 8 例, 31~40 岁 5 例, 41~50 岁 22 例, 51~60 岁 29 例, 60 岁以上 3 例; 病程: 最短的 1 周, 最长的 6 个月。发病部位: 左侧 31 例, 右侧 36 例。临床表现: 髌前滑囊肿大, 呈半球状, 皮色不变, 伴有轻度疼痛, 囊内波动明显, 膝关节活动轻度受限, 局部胀而不适, 不能跪地, 跪则局部疼痛。

2 治疗方法: 患者取仰卧位, 患膝伸直, 术者站在患肢外侧或健肢内侧均可, 以一手之大鱼际与掌后部

重力按推压囊肿部, 根据用力习惯, 术者站在患肢外侧可向囊肿之内侧施以按推压, 直至滑囊壁破裂, 再用手掌按摩髌前滑囊部, 囊内液体完全消失后, 局部加压包扎固定, 固定时间 5~7 天。

3 治疗效果: 67 例均采用按推压法治疗, 按推压后囊肿胀痛消失, 1 个月无复发者系痊愈。结果 63 例均经 1 次治愈, 4 例经 2 次治愈。15 例随访 3 个月未复发, 无任何后遗症。

4 典型病例: 梁××, 男, 47 岁。1989 年 4 月 10 日来诊, 诉半年前于工作中不慎碰伤左膝髌前部, 10 余天后局部出现一囊肿, 逐渐增大, 胀痛不适, 屈膝跪地痛甚。先后穿刺抽液 7 次未愈。诊见左膝前部 6.0 cm×7.0 cm 大小半球状肿物, 皮色不变, 内有波动感, 轻度触痛, 膝关节屈曲不利。诊为: 左膝髌前滑囊炎, 施以按推压法, 囊肿马上消失, 后加压固定一周而愈, 随访 3 个月, 未复发。

1 大连市中医院(辽宁 116000)

2 大连大学医学专科学校

收稿日期: 1991-12-23