

高等中医自学考试及中医晋升考试辅导

江西省 1991 年下半年高等中医自学考试

《西医内科基础》试题

1 单项选择题 (每小题 0.5 分, 共 25 分。在每小题的四个备选答案中选出一个正确的答案, 并将正确答案的序号填入题干后面的括号内)

- 1.1 以下哪项关于腹痛的说法不正确 ()
①弥漫性腹膜炎痛在脐部 ②急性胃炎痛在上腹部
③早期阑尾炎痛在脐部 ④胆囊炎痛在右上腹部
- 1.2 以下哪项不是青年人咯血的常见病因 ()
①支气管扩张 ②肺结核 ③风心二尖瓣狭窄
④肺癌
- 1.3 抽搐不伴有意识障碍的疾病是 ()
①有机磷农药中毒 ②脑栓塞 ③瘧病 ④中毒性菌痢
- 1.4 间歇热常见于 ()
①大叶性肺炎 ②疟疾 ③伤寒 ④风湿热
- 1.5 以下哪一项体温属于正常 ()
①口测法 $36.5 \sim 37.5^{\circ}\text{C}$ ②腋测法 $36.2 \sim 37.2^{\circ}\text{C}$
③肛测法 $36.5 \sim 37.7^{\circ}\text{C}$ ④以上都不对
- 1.6 甲状腺肿大并听到血管杂音见于 ()
①单纯性甲状腺肿 ②甲状腺功能亢进症 ③甲状腺炎 ④甲状腺肿瘤
- 1.7 意识障碍按严重程度依次排列, 下列哪一组正确 ()
①昏迷>昏睡>嗜睡>意识模糊 ②昏迷>意识模糊>昏睡>嗜睡 ③昏迷>昏睡>意识模糊>嗜睡 ④昏迷>意识模糊>嗜睡>昏睡
- 1.8 人体正常叩诊音不应有 ()
①清音 ②鼓音 ③实音 ④过清音
- 1.9 二尖瓣关闭不全的杂音不应是 ()
①心尖部清楚 ②收缩期出现 ③呈隆隆样递增型 ④向左腋下传导
- 1.10 主动脉关闭不全时, 在主动脉瓣听诊的体征有 ()
①隆隆样舒张期杂音 ②喷射样收缩期杂音 ③

主动脉瓣区第二心音增强 ④主动脉瓣区第二心音减弱

- 1.11 下列哪项不属于深反射 ()
①肱二头肌反射 ②提睾反射 ③膝反射 ④踝反射
- 1.12 匙状甲可见于 ()
①缺铁性贫血 ②亚急性细菌性心内膜炎 ③支气管扩张 ④类风湿性关节炎
- 1.13 锥体束病变时, 哪项是错误的 ()
①戈登(Gordon)征阳性 ②一侧腹壁反射消失
③可有踝阵挛 ④膝腱反射消失
- 1.14 莫非(Murphy)征阳性见于 ()
①急性胰腺炎 ②急性胆囊炎 ③急性阑尾炎
④胃穿孔
- 1.15 凡登白反应呈直接迟缓反应(间接反应)见于 ()
①正常人 ②阻塞性黄疸 ③肝细胞性黄疸
④溶血性黄疸
- 1.16 暂时性糖尿见于 ()
①甲状腺功能亢进 ②强烈的精神刺激 ③肾上腺皮质功能亢进 ④胰腺疾病
- 1.17 红细胞及血红蛋白减少见于 ()
①新生儿 ②慢性肺源性心脏病 ③紫绀型先天性心脏病 ④缺铁或缺乏维生素 B_{12} 及叶酸
- 1.18 以下哪种疾病可引起尿量增多 ()
①休克 ②慢性肾炎伴浓缩功能不全 ③心功能不全 ④脱水
- 1.19 正常成人女性的红细胞数为 ()
① $4.0 \sim 5.5 \times 10^{12}/\text{L}$ ② $3.5 \sim 5.0 \times 10^{12}/\text{L}$
③ $6.0 \sim 7.0 \times 10^{12}/\text{L}$ ④ $1.5 \sim 3.0 \times 10^{12}/\text{L}$
- 1.20 膀胱结核的造影表现, 下列哪项正确 ()
①膀胱有充盈缺损 ②膀胱小而圆, 轮廓不规则
③膀胱有局限性隆起 ④膀胱边缘有破坏

- 1.21 原发综合征的肺部 X 线所见是 ()
 ①肺尖部浸润影 ②肺门淋巴结呈团块状影
 ③肺尖浸润病灶, 肺门团块影及两者间的索条阴影 ④肺中下野渗出病灶, 肺门淋巴结呈团块状及两者间有索条状阴影
- 1.22 正常心电图 R 波为主的导联中, T 波不应低于 R 波的 ()
 ①1/4 ②1/6
 ③1/10 ④1/12
- 1.23 正常心电图 V₁ 导联的 QRS 波群不应是 ()
 ①q^R 型 ②q^RS 型 ③R_s 型 ④rS 型
- 1.24 房性早搏的 P 波形态应是 ()
 ①与窦性 P 波相同 ②与窦性 P 波不同 ③绝对是逆行 P 波 ④绝对不是逆行 P 波
- 1.25 正常心率的成人心电图 P—R 间期应为 ()
 ①0.08~0.16 秒 ②0.10~0.20 秒 ③0.12~0.20 秒 ④0.12~0.24 秒
- 1.26 超声波诊断不适用于测定 ()
 ①肝、脾大小 ②脑肿瘤 ③肺癌 ④肝癌
- 1.27 吸¹³¹I 碘率增高见于 ()
 ①亚急性甲状腺炎 ②甲状腺功能亢进 ③甲状腺功能减退 ④垂体功能减退
- 1.28 应用氯霉素治疗伤寒或副伤寒时, 哪种做法不对 ()
 ①开始时剂量为 1.0~1.5 g/d, 分 4 次口服
 ②服药至体温正常后可立即停药
 ③服药至体温正常后 3 d, 将剂量减半, 再持续服 12~14 d
 ④服药至体温正常后 3 d, 停药 5~7 d, 再用半量 7~9 d
- 1.29 对于一般病毒性肝炎, 以选择哪一种措施为宜 ()
 ①一般治疗与对症治疗 ②肾上腺皮质激素治疗
 ③应用抗病毒药物 ④应用谷氨酸钠控制血氨
- 1.30 对于钩端螺旋体病的病原学检查, 以下哪一项不正确 ()
 ①可采血用镀银染色法或暗野显微镜找病原体
 ②采血培养或动物接种 ③取尿培养或动物接种
 ④取粪培养
- 1.31 中毒型菌痢的抗菌治疗, 采用哪种方法为宜 ()
 ①复方磺胺甲基异恶唑口服 ②痢特灵口服
 ③四环素或土霉素口服 ④氯霉素静脉滴注
- 1.32 关于流脑的病原学诊断, 以下哪一项不正确 ()
 ①皮肤瘀点采血涂片染色镜检可发现病原菌
 ②抽取静脉血涂片染色可发现病原菌 ③败血症期血培养阳性率较高 ④脑脊液高速离心后, 沉渣涂片染色镜检可发现病原菌
- 1.33 发作性呼气性呼吸困难伴哮鸣音, 咳嗽少许白色泡沫痰见于 ()
 ①心源性哮喘 ②支气管肺癌 ③慢性支气管炎喘息型 ④支气管哮喘
- 1.34 癌性胸膜炎胸腔积液的特点是 ()
 ①血性胸水 ②乳糜性胸水 ③胸水为漏出液
 ④胸水量多
- 1.35 右心室后负荷(压力负荷)加重见于 ()
 ①肺动脉瓣狭窄 ②肺动脉瓣关闭不全 ③三尖瓣狭窄 ④三尖瓣关闭不全
- 1.36 下列哪一项是风湿热的主要表现 ()
 ①血沉增快 ②抗“O”增高 ③中度发热 ④舞蹈病
- 1.37 慢性右心功能不全不会出现 ()
 ①肝脏肿大 ②尿量减少 ③脾脏肿大 ④下肢水肿
- 1.38 治疗肺心病心衰不恰当的是 ()
 ①首选洋地黄纠正心衰 ②给予利尿剂减轻心脏负荷 ③控制感染, 改善肺功能 ④慎用镇静剂, 制止躁动
- 1.39 风湿热最常损害的心瓣膜是 ()
 ①二尖瓣 ②三尖瓣 ③主动脉瓣 ④肺动脉瓣
- 1.40 下列成人血压值, 哪一项为高血压 ()
 ①140/90 mmHg ②20.3/12.4 Kpa ③155/94 mmHg ④18.6/12.8 Kpa
- 1.41 典型心绞痛的治疗首选药物是 ()
 ①安定 ②潘生丁 ③硝酸甘油 ④度冷丁
- 1.42 变异型心绞痛的特点是 ()
 ①发作时 S—T 段上抬 ②发作时 S—T 段下降
 ③发作时 Q 波出现 ④硝酸甘油无效
- 1.43 急性胰腺炎最常见的病因是 ()
 ①十二指肠病变 ②病毒感染 ③胆管疾病及暴饮暴食 ④腹部手术创伤
- 1.44 甲氧咪胍最适宜于治疗 ()
 ①胃溃疡 ②十二指肠溃疡 ③慢性胃炎 ④胃息肉

1.45 诊断原发性肝癌的筛选检查项目, 以哪一组最恰当 ()

- ①甲胎蛋白(A—FP)与选择性血管造影 ②甲胎蛋白与B型超声显象 ③CT与选择性血管造影 ④放射性核素肝扫描与B型超声显象

1.46 诊断消化性溃疡最可靠的依据是 ()

- ①节律性上腹痛 ②上腹部压痛 ③钡餐检查出现激惹征象 ④以上均不是

1.47 慢性肾炎类肾病型水肿的主要原因是 ()

- ①全身毛细血管通透性增高 ②肾脏瘀血、肾小球滤过率降低 ③尿中失去大量蛋白质导致低蛋白血症 ④继发性醛固酮增多血容量增多

1.48 尿路感染最主要最常见的感染途径是 ()

- ①血行感染 ②上行感染 ③直接感染 ④淋巴道感染

1.49 粒细胞缺乏症是指 ()

- ①白细胞总数低于 $2000/\text{mm}^3$ ($2.0 \times 10^9/\text{L}$), 中性粒细胞低于 $500/\text{mm}^3$ ($0.5 \times 10^9/\text{L}$)
②白细胞总数低于 $2000/\text{mm}^3$, 中性粒细胞低于 $1000/\text{mm}^3$
③白细胞总数低于 $1000/\text{mm}^3$, 中性粒细胞低于 $500/\text{mm}^3$
④白细胞总数低于 $3000/\text{mm}^3$, 中性粒细胞低于 $1000/\text{mm}^3$

1.50 20岁女性, 昏迷入院, 病史不详, 血压 $90/60 \text{ mmHg}$ ($12/8 \text{ Kpa}$), 瞳孔小如针尖, 口中有蒜臭味, 全身肌肉阵发性震颤, 多汗, 流涎, 两肺布满湿罗音, 血尿常规正常, 应首先考虑哪种疾病 ()

- ①糖尿病昏迷 ②尿毒症昏迷 ③肝性昏迷 ④有机磷农药中毒

2 多项选择题(每小题1分, 共25分。在每小题五个备选答案中选出二至五个正确答案, 并将正确答案的序号分别填入题干后面的括号内, 错选、多选、漏选均不得分)

2.1 哪些是混合性呼吸困难的病因

() () () () ()

- ①肺气肿 ②重症肺炎 ③肺不张 ④大量胸腔积液 ⑤胸部严重外伤

2.2 意识障碍伴出血点应考虑

() () () () ()

- ①流行性脑脊髓膜炎 ②肺性脑病 ③败血症 ④脑溢血 ⑤糖尿病酮症酸中毒

2.3 局部浅表淋巴结肿大见于

() () () () ()

- ①白血病 ②感染 ③淋巴瘤 ④结核 ⑤肿瘤

2.4 明显的颈动脉搏动常见于

() () () () ()

- ①主动脉瓣关闭不全 ②三尖瓣关闭不全 ③甲状腺功能亢进 ④高血压 ⑤严重贫血

2.5 窦性心律不齐的特点是

() () () () ()

- ①与呼吸有关 ②吸气时加快 ③吸气时减慢 ④呼气时加快 ⑤呼气时减慢

2.6 主动脉瓣区第二心音减弱见于

() () () () ()

- ①高血压 ②动脉硬化 ③正常老年人 ④主动脉瓣狭窄 ⑤主动脉关闭不全

2.7 肝浊音界消失见于

() () () () ()

- ①气胸 ②人工气腹 ③肝肿大 ④胃肠穿孔 ⑤胃肠胀气

2.8 锥体束征包括哪几项

() () () () ()

- ①巴彬斯基(Babinski)征 ②奥蒂海姆(Oppenheim)征 ③戈登(Gordon)征 ④布鲁金斯基(Brudzinski)征 ⑤霍夫曼(Hoffmann)征

2.9 以下关于溴磺酞钠滞留试验的说法, 哪些正确

() () () () ()

- ①溴磺酞钠(BSP)滞留试验是用于检查肝功能的试验
②正常人注射BSP后45mm, 血中滞留量不应少于注射量的5%
③病毒性肝炎、肝硬化等BSP滞留增加
④黄疸病人不宜做本试验
⑤心功能不全、休克等可影响本试验的结果

2.10 以下关于尿比重的说法, 哪些是正确的

() () () () ()

- ①尿崩症时尿比重增加 ②糖尿病时尿比重增高 ③慢性肾炎晚期尿比重固定于1.010左右 ④正常人尿比重与尿量有关, 尿量多时比重高, 尿少时比重低 ⑤脱水时尿比重增高

(未完待续)