

当代名医

梁剑波治疗痫证经验

梁宏正*

主题词 癫痫/中医药疗法 ① 梁剑波

广东省名老中医梁剑波,从事中医工作50年,学识渊博,经验丰富。现将梁师治疗痫证经验,介绍如下:

1 大发作的治疗

先宜豁痰宣窍,熄风定痫,用家传验方乌沉益智散:制川乌、沉香、益智仁各20g,天麻、白附子、防风、法半夏各30g,羌活、独活各25g,当归、僵蚕、甘草各15g,雄黄精、冰片各3g,全蝎10g,蜈蚣6条。上药共为细末,磁瓶收贮。每发作时以生姜汤送服9~12g。本方亦可酌情减量改作煎剂。并可用于痫证持续发作。俟患者醒后,还须根据病因症状分别给予治疗。

如惊忧积气,心受风邪,发作时牙关紧闭,涎潮昏仆,醒后精神若痴,宜镇惊开窍,熄风定痫。用《本事方》惊气丸加减:附子、木香、天麻、僵蚕、白花蛇各15g,橘红、麻黄、全蝎、苏子、制南星各10g,朱砂5g。为极细末,入麝香、冰片各1g和匀,炼蜜为丸如龙眼大,每服1丸,薄荷汤下。本方并治惊痫风痫。

如属肝火上逆,肝风夹痰,蒙蔽心窍,发作时惊叫,声如猪羊,手足颤动,面色潮红,痰声漉漉,舌质红,脉洪数或弦滑数者,宜清火平肝,消痰定颤。予经验凉肝丸:胆星、钩藤、黄连、滑石、川贝、青黛、生铁落、僵蚕、天麻、丹参、甘草各20g,羚羊角5g,桑叶30g。共为极细末,姜汁、竹沥水打糊为绿豆大小丸,朱砂为衣,每次服5g,清茶送服,日

服3次。

2 小发作的治疗

治宜杜绝其生痰之源,健脾熄风养络。痰盛者用温胆汤加石菖蒲、全蝎、钩藤;脾虚者用六君子汤加胆星、木香、黄连、丹参。小发作得到控制后亦不要停药,可予梁师的断痫良方:人参10g,远志6g,石菖蒲6g,茯苓12g,钩藤12g,胆星10g,炒枣仁12g,黄连3g,川木瓜12g,僵蚕10g,甘草5g。每日1剂。直至病情完全控制。本方意在益气安神,涤痰熄风,以巩固疗效。

小儿痫证临床上有表现为肌肉惊惕、手足多动、面红烦躁、睡觉露睛等症,梁师认为多是火盛动风所致。与小儿“肝常有余”、“心火亢盛”的生理特点有关。可予凉肝镇惊、泻心解痉的龙胆镇惊汤:龙胆草10g,山梔10g,生地12g,钩藤10g,莲子心6g,天竺黄10g,水牛角15g,龙齿12g(上两药先煎),远志5g,郁金10g,生甘草5g。每天1剂,煎煮2次,兑合分2次温服。

3 局限性发作治疗

患者常口唇或手足局部抖动,脑电图检查常有轻度异常,治标时可予严用和氏的乌药顺气散化裁:白芷10g,川芎5g,炙麻黄5g,姜炭3g,橘红3g,枳壳5g,桔梗10g,僵蚕10g,钩藤10g,姜、枣为引。本方意在行气温运,祛风止痉。若小儿出现腹痛、呕吐者,可加白芍12g、广木香6g、元胡10g。俟发作控制后,可改服养心汤、天王补心汤化裁,以防止因发作频繁损及胞络心营,导致意识丧失。这一治疗措施为必不可少的。

4 精神运动性发作的治疗

患者以发作性运动障碍并伴有精神异常为

* 广东省肇庆市第一人民医院,肇庆市城中路174号(广东526021)

特点, 发则昏仆抽搐; 或神志恍惚, 幻视幻听, 平素性情固执; 或神疲思睡, 夜间游走等。必须疏畅气机, 豁痰开窍。梁师的经验是先与乌沉益智散(方见前), 待病情缓解后, 再与定痫丸或清心温胆汤: 陈皮 5 g, 法半夏 12 g, 茯苓 12 g, 枳实 10 g, 竹茹 10 g, 黄连 10 g, 麦冬 10 g, 石菖蒲 10 g, 远志 6 g, 香附 10 g, 地龙 10 g, 珍珠母 30 g(先煎), 甘草 5 g。每天 1 剂, 坚持连服 30~50 剂, 顽疾可愈。

5 发作后的调摄

梁师常告诫痫病经发作期治疗后, 须防间歇期再发。并根据沈芊绿氏的经验: “痫证必经年竣补, 才保无虞”, 认为痫证的患者在控制病情之后, 仍须坚持服药 6~12 个月以上, 使体质改善, 荣卫周流而疾病乃得根治。对常服抗癫痫西药的患者, 在用中药治疗的同时, 不宜立即停服西药, 而应逐步减量, 或服维持

量, 最后过渡至完全改用中药治疗。

小儿为纯阳之体, 多见食欲不佳, 面色无华, 心烦吵闹, 宜健脾益气, 和胃化浊, 兼以清心凉肝, 方选参苓白术散或六君子汤加黄连、川贝、钩藤、白芍等。成人多有记忆力减退, 失眠多梦, 腰痠便干, 可予滋阴宁神汤, 川芎、当归、白芍、熟地、人参、茯苓、紫河车、远志、熟枣仁、山萸肉、黄连、甘草、牡蛎或左归丸等以滋养肝肾, 益阴安神。妇人多见月经不调, 或经期病发作者, 则与丹栀逍遥散加地骨皮、丹参、胆星、石决明。此外, 临床上还有发作控制后, 手足颤震的患者, 属肝虚风动, 可以家传定震丸: 川芎、当归、熟地、白芍、天麻、秦艽、全蝎、细辛、防风、白术、黄芪、威灵仙各 15 g, 共为细末, 炼蜜为丸, 每服 6 g, 开水送, 日 2 次。本方还可治老人手足颤震, 有良效。

紫 色 痘 疮 膏 新 用

刘 金*

1 方药组成及制法

方药: 轻粉 9 g, 红粉 9 g, 琥珀粉 9 g, 乳香粉 9 g, 血竭粉 9 g, 冰片 0.9 g, 煅珍珠粉 0.9 g, 蜂蜡 30 g, 香油 120 ml。

制法: 将香油放于锅内加温, 数开后离火, 然后将前五种药粉入油内, 混匀再入蜂蜡使其完全熔化, 待将冷却时兑入冰片、煅珍珠粉搅匀成膏备用。

加减运用: 扁平疣按原方配制; 传染性软疣、尖锐湿疣于原方内加入白矾 9 g、雄黄 9 g; 黄褐斑(黧黑斑)、雀斑把原方中的轻粉 9 g 减为 4.5 g, 红粉 9 g 减为 4.5 g, 加入密陀僧 9 g。

2 疗效标准与治疗结果

扁平疣: 淡红或褐色扁平丘疹消失, 皮肤颜色恢复正常, 3 个月内无新丘疹出现为治愈。局部外涂治疗 5 周, 扁平丘疹无变化为无效。治疗 246 例, 结果 1 周内治愈 12 例, 2 周治愈 26 例, 3 周治愈 75 例, 4 周治愈 121 例, 5 周治愈 10 例, 平均治愈天数为 24

天, 治愈率为 99.2%。2 例因汞过敏停止治疗为无效, 占 0.8%。

传染性软疣: 球形半球形丘疹消失, 愈后不留疤痕, 3 个月内无复发为治愈。治疗 5 周球形丘疹无减少或此消彼生为无效。治疗 84 例, 结果 5 周内治愈 81 例, 治愈率为 96.4%, 3 例无效, 占 3.6%。

尖锐湿疣: 乳头状增殖消失, 淡红色丘疹消失, 3 个月内无新疣生出为治愈。外涂治疗 5 周疣体无变化或旧疣消失新疣又生为无效。治疗 5 例均为男性生殖器尖锐湿疣, 结果 4 例治愈, 1 例治疗 1 个月疣体消失, 停药后又长出小疣体为无效。

黄褐斑(黧黑斑): 面部褐色深褐色斑片, 每日外涂在 2 个月内消失, 1 年内无色素加深为治愈。褐色斑片基本消失, 夏季再出现淡褐色斑片, 外涂药再消失为有效。治疗 84 例, 结果 51 例治愈, 占 60.7%, 33 例有效, 占 39.3%, 总有效率为 100%。

雀斑: 深褐色米粒至绿豆粒大斑点消失, 半年内无色素加深为治愈。褐色斑点减少或基本消失为有效。治疗 22 例, 结果 12 例治愈, 10 例有效, 总有效

* 内蒙古扎兰屯市中蒙医院 (162650)