

高等中医自学考试及中医晋升考试辅导

江西省1991年下半年高等中医自学考试

《中医内科学》试题 (续完)

- 3.40 中风中经络,络脉空虚,风痰入络证的主方是 ()
- ① 二陈汤合玉屏风散
② 黄芪桂枝五物汤合二陈汤
③ 牵正散合导痰汤
④ 四君子汤合导痰汤
- 3.41 中风之中脏腑与中经络的主要区别在于 ()
- ① 有无后遗症 ② 外风与内风
③ 有无神志不清 ④ 邪浅与邪深
- 3.42 眩晕一证以下列何证为主 ()
- ① 虚 ② 实 ③ 寒 ④ 热
- 3.43 荆防败毒散用于感冒的何种证型 ()
- ① 风寒证 ② 风热证 ③ 暑热证 ④ 暑湿证
- 3.44 寒霍乱之重证,症见大汗淋漓,四肢厥冷,声哑转筋,脉细欲绝,宜选用 ()
- ① 生脉饮 ② 独参汤
③ 炙甘草汤 ④ 通脉四逆加猪胆汁汤
- 3.45 某患者,女,40岁,3月来经常夜间发热,手足心亦热,心烦少寐,颧红口干,舌红津少,脉细而数,症属 ()
- ① 气虚发热 ② 血瘀发热
③ 阴虚发热 ④ 肝郁发热
- 3.46 四肢关节疼痛剧烈,痛有定处,得热痛减,天阴寒冷则痛增,屈伸不利,局部不红不热,苔薄白,脉弦紧,宜选用 ()
- ① 防风汤 ② 桃红饮
③ 白虎加桂枝汤 ④ 乌头汤
- 3.47 腹痛急暴,痛时喜温喜熨,遇寒痛甚,大便溏薄,小便清利,苔薄白,脉沉紧,宜选用 ()
- ① 柴胡疏肝散 ② 芍药甘草汤
③ 正气天香散 ④ 参苓白术丸
- 3.48 “精气夺则虚”最早见于何著作 ()
- ① 《素问》 ② 《诸病源候论》
③ 《脾胃论》 ④ 《理虚元鉴》
- 3.49 “肺胀者,虚满而喘咳”出于何著作 ()
- ① 《灵枢》 ② 《金匱要略》
③ 《丹溪心法》 ④ 《张氏医通》
- 3.50 “治痿独取阳明”最早见于何著作 ()
- ① 《金匱要略》 ② 《丹溪心法》
③ 《素问》 ④ 《临证指南医案》
- 3.51 某患者,男,58岁,经常耳鸣,近1年来听力明显减退,左耳失聪,四肢困倦,神疲乏力,纳谷不香,少寐多梦,苔薄白微腻,脉细而弱,治宜选用 ()
- ① 耳聋左慈丸 ② 益气聪明汤
③ 半夏白术天麻汤 ④ 滋水清肝饮
- 3.52 遗精频作,小便热赤,尿时亦有少量精液外流,口苦口渴,心烦不宁,口舌生疮,苔黄腻,脉濡数,治疗宜选用 ()
- ① 知柏地黄丸 ② 萆薢分清饮
③ 金锁固精丸 ④ 水陆二仙丹
- 3.53 咳喘上气,胸胁胀痛,气粗鼻煽,咳而不爽,痰吐稠粘而黄,伴有形寒,发热,烦闷口渴,苔薄黄,舌质红,脉浮滑数,治当宣肺泄热,宜用 ()
- ① 麻黄汤 ② 小青龙汤
③ 麻杏石甘汤 ④ 三子养亲汤
- 3.54 喘证的病理性质有虚、实两类。叶天士说,“在肺为实”,在何脏为虚 ()
- ① 心 ② 肝 ③ 肾 ④ 脾
- 3.55 “原夫霍乱之为病也,皆因饮食,非关鬼神”之说出自何著作 ()
- ① 《灵枢·经脉》
② 《伤寒论·辨霍乱病》
③ 《诸病源候论·霍乱病诸候》
④ 《备急千金方·霍乱》
- 3.56 臌胀湿热蕴结证,宜清热化湿利水消胀法,选用下列何方为佳 ()
- ① 调营饮 ② 中满分消丸
③ 实脾饮 ④ 猪苓汤
- 3.57 首先运用苏合香丸治疗胸痹心痛的是何著作

()

- ① 《金匱要略》 ② 《时方歌括》
③ 《医林改错》 ④ 《世医得效方》

3.58 我国最早的肺癆专著是 ()

- ① 《红炉点雪》 ② 《理虚元鉴》
③ 《十药神书》 ④ 《外台秘要》

3.59 悬饮饮停胸胁,咳唾引痛,气喘不能平卧,肋间胀满,舌苔薄腻,脉弦滑有力。治当逐水祛饮,宜用 ()

- ① 控涎丹 ② 柴枳半夏汤
③ 甘遂半夏汤 ④ 己椒苈黄丸

3.60 “风寒湿三气杂至,合而为痹也。其风气胜者为行痹,寒气胜者为痛痹,湿气胜者为着痹也。”之说出于何著作 ()

- ① 《素问·痹论》 ② 《金匱·中风历节病》
③ 《诸病源候论·风痹候》 ④ 《医宗必读》

4 多项选择(每小题1分,共10分。在每小题五个备选答案中选出二至五个正确答案,并将正确答案的序号分别填入题干后面的()内,错选,多选,漏选均不得分。)

4.1 虚秘是指下列哪种病证

() () () () ()

- ① 气秘 ② 气虚秘 ③ 血虚秘
④ 冷秘 ⑤ 阳虚秘

4.2 反胃的临床特征有

() () () () ()

- ① 朝食暮吐,暮食朝吐 ② 呕吐物为宿谷不化
③ 口干口苦 ④ 嘈杂吞酸 ⑤ 食入即吐

4.3 治疗气郁化火之郁证的主方是

() () () () ()

- ① 丹桅逍遥丸 ② 左金丸
③ 柴胡疏肝饮 ④ 滋水清肝饮
⑤ 越鞠丸

4.4 癫狂的病理因素有

() () () () ()

- ① 气 ② 火 ③ 痰 ④ 虚 ⑤ 瘀

4.5 程氏革藜分清饮可用于治疗下列哪些病证

() () () () ()

- ① 膏淋 ② 尿浊 ③ 遗精
④ 消渴 ⑤ 水肿

4.6 治疗痿病的基本法则为

() () () () ()

- ① 理气化痰 ② 清肝泻火 ③ 消痰散结
④ 滋阴养血 ⑤ 活血化痰

4.7 痉证的主要临床表现有

() () () () ()

- ① 项背强急 ② 四肢抽搐 ③ 角弓反张
④ 口眼歪邪 ⑤ 半身不遂

4.8 腰痛的治疗法则有

() () () () ()

- ① 散寒行湿 ② 清热利湿 ③ 活血化瘀
④ 温补肾阳 ⑤ 滋补肾阴

4.9 痢疾的发病机理主要是

() () () () ()

- ① 邪滞肠中与气血相搏
② 肠道传导失司,脉络受伤
③ 气血壅滞,化为脓血
④ 清浊不分,混杂而下
⑤ 脾胃虚弱,湿邪壅滞

4.10 咳嗽的治疗,除直接治肺外,还应注意整体治疗,如 () () () () ()

- ① 治心 ② 治肝 ③ 治脾
④ 治胃 ⑤ 治胆

5 填空(每题2分,共10分。)

5.1 痢疾多由外受_____内伤_____损伤脾胃与肠腑而成,其发病多与季节有关。

5.2 热秘,大便干结,小便短赤,面红身热,伴有腹胀腹痛,口干口臭,舌红苔黄而燥,脉滑数,治法:_____主方:_____

5.3 哮喘的发病内因:_____是关键,每因外感、_____,_____而诱发。

5.4 《医学正传·劳极》提出肺劳的治疗原则:“一_____则_____,_____,一_____则_____。”

5.5 腹痛的临床辨证,主要根据病因,疼痛部位,疼痛性质,辨别其_____在气在血,_____。

6 问答(每小题4分,共12分。)

6.1 从临床表现如何鉴别胃脘痛与“真心痛”?治疗胃脘痛的原则有哪些?

6.2 为什么说“胃不和则卧不安”?其临床表现有何特点?如何进行治疗?

6.3 脾不统血与肾气不固均可导致尿血,其病机及临床表现有何不同?

7 医案分析(每题5分,共10分。)

7.1 某患者,男,65岁,腹泻病史15年,大便时

溏时泻,稍进油腻食物,大便次数增多,日行4~5次,无脓血。纳谷不香,脘腹胀满,面色萎黄,神疲乏力,舌淡苔白,脉细而弱。

根据病情,本案的中医诊断:_____。

本案的病机:_____;

本案的治法:_____;

本案的主方:_____;

如久泻不已,腰痛肢冷,两膝痠软,舌淡苔薄,脉沉细,可选方_____。

7.2 某患者,女,48岁。全身浮肿3年,腰以下为甚,按之凹陷不易恢复,脘腹胀闷,纳谷不香,食量减少,面色萎黄,神疲乏力,四肢不温,小便短少,舌质淡,苔白腻,脉沉缓。

根据病情,此案的中医诊断:_____。

本案的病机:_____;

本案的治法:_____;

治疗本案的主方:_____;

如经治水肿不退,腰部冷痛,尿量减少,四肢厥冷,畏寒神疲,面色灰滞,舌质淡胖,脉沉迟无力,可用_____合_____温肾利水。

8. 综合分析 (6分)

(在每小题五个备选答案中选出二至五个正确答案,并将正确答案的序号分别填入题干后面的括号内,错选、多选、漏选均不得分)

某患者,女,72岁。慢性支气管炎病史20余年,每年入冬咳嗽加重不能平卧。刻下心悸不宁,惊惕不安,头晕目眩,痰白量多,形寒肢冷,小便短少,苔白而滑,脉细弦滑。

8.1 本案的辨证:

() () () () ()

- ① 心悸之心虚胆怯证 ② 心悸之心血不足证
③ 心悸之心阳不振证 ④ 心悸之水气凌心证
⑤ 心悸之心血瘀阻证

8.2 本案的治法:() () () () ()

- ① 镇惊定志 ② 补气养血 ③ 养心安神
④ 振奋心阳 ⑤ 化气行水

8.3 本案的主方是:

() () () () ()

- ① 安神定志丸 ② 归脾汤 ③ 天王补心丹
④ 苓桂术甘汤 ⑤ 桃红饮

8.4 下肢浮肿患者加何方以温阳行水:

() () () () ()

- ① 朱砂安神丸 ② 真武汤 ③ 五苓散
④ 猪苓汤 ⑤ 五皮饮

8.5 如呕吐清水痰涎者加何药以和降胃气:

() () () () ()

- ① 旋复花、代赭石: ② 沉香、降香;
③ 刀豆子、柿蒂; ④ 竹茹、胆星;
⑤ 姜半夏、陈皮、生姜。

牛黄消炎丸治愈乳房囊性增生病3例

陈抗美*

牛黄消炎丸具有清热解毒、消肿止痛之功,多用于治疗咽喉肿痛、疔疮疮疖。笔者于1986年偶然发现其具有软坚散结之功效,治愈乳房囊性增生病3例,现介绍如下。

1 药物及用法:牛黄消炎丸为《中华人民共和国药典》(1977年版)处方,由南京同仁堂制药二厂生产。水丸,每粒重0.3g。内服,1日3次,每次10粒。

2 疗效观察:3例均为单侧乳房囊性增生,年龄25~32岁。增生物0.5~1.5cm。内服牛黄消炎丸6~10天增生物消失。

3 典型病例:高××,女,28岁,干部。右乳房外上

肿块一年余。1986年3月6日因感冒咽痛就诊。乳房肿物曾在某职工医院确诊为乳房囊性增生病。肿块为圆形,如樱桃大小,中等硬度,界限不清,经前乳房胀痛明显。予牛黄消炎丸,每日3次,每次10粒。服药4天,乳房肿块缩小,6天后肿块消失。随访6年,未见复发。

4 讨论:牛黄消炎丸由牛黄、大黄、天花粉、青黛、蟾酥、雄黄和珍珠母组成。全方具清热解毒、消肿散结功效。乳房囊性增生病属于祖国医学“乳癖”范畴,主要见于中青年妇女。多由肝气郁结,冲任失调,乳络阻滞,气血凝聚所致。牛黄消炎丸对热郁型的乳房囊性增生病有消肿散结的功效。所述病例在治疗过程中均未见不良反应。

* 北京复兴医院三里河门诊部(100045)

收稿日期:1992-08-10