

自拟“化瘤汤”对肿瘤的治疗

周容华*

主题词 肿瘤/中医药疗法 @化瘤汤

肿瘤,属于祖国医学的症瘕、积聚、癭瘤范畴。究其病机,多与气滞血凝、痰瘀聚结有关。因此,笔者遵奉《内经》“坚者削之”、“结者散之”、“瘀者行之”之旨,把活血化瘀作为主要治则,自拟“化瘤汤”:归尾 10g,赤芍 10g,红花 10g,桃仁 10g,丹参 20g,水蛭 10g,半枝莲 30g,白花蛇舌草 30g。在临证时,根据肿瘤病变之不同,灵活化裁,自 1979 年以来,治疗脑肿瘤 5 例,甲状腺肿瘤 28 例,纵隔肿瘤 2 例,子宫肌瘤 14 例,疗效尚满意,现将治疗情况介绍如下。

1 脑肿瘤

颅内肿瘤,祖国医学一般认为属髓海病变,临证多以剧烈头痛、眩晕、目疾等为主要表现。多由痰湿之邪凝聚于脑,脑部气滞血瘀,痰瘀互结所致。在其病变过程中,痰瘀互结,脑络痹阻,日久化热动风,风火鸱张,损伤阴液,致肝肾不足。故用化瘤汤加熄风化痰之品,如:全蝎、僵蚕、蜈蚣、天麻、钩藤、川贝。5 例脑肿瘤,其中男性 3 例,女性 2 例;年龄最小者 24 岁,最大者 58 岁。蝶鞍前上方占位病变、脑血管瘤 2 例,鞍内嫌色细胞瘤 1 例,空蝶鞍垂体瘤 2 例。5 例病人均用化瘤汤加味治疗,以 3 个月为 1 个疗程,均治完 2 个疗程后,经头部 CT 复查,脑部未见异常,病人自觉症状消失,并能正常生活工作。5 例病人经随访,存活时间最长者 7 年,最短者 2 年。

病例:王××,男,59 岁,干部,1989 年 11 月 20 日初诊。上月 19 日晚 11 时许,患者突然耳鸣目眩,头痛如劈,呕吐,腰胀,双侧大腿胀痛,不能步履。在我院住院 8 天,因头痛不减送

某医院行脑部 CT 检查,诊断为蝶鞍前上方占位病变、脑血管瘤。患者因害怕手术而求治于余。就诊时诉巅顶剧痛,同时从太阳穴至下颌角痛如刀割,步履艰难,须人搀扶,纳差,肌肉瘦削,舌质淡胖、舌边紫暗、苔白厚腻,脉象弦滑而大。此乃痰瘀互结于脑,脑络痹阻,治以活血化瘀,通络开窍,化痰散结法。拟化瘤汤加天麻、钩藤、半夏、川贝各 10g,全蝎、僵蚕各 8g,鸡血藤 30g,每日 1 剂,水煎服。服药 1 月后,头痛减轻,饮食增加,不呕吐,苔薄腻,脉缓滑,仍肢软乏力。原方去半夏,加女贞子、川牛膝各 10g,龟板 30g,5 剂。服药后诸症减轻,效不更方,后以此方出入连服 5 个月,症状消失。继以上方制丸药一料,服两月以巩固疗效。并于 1990 年 7 月 11 日在某医院行 CT 复查,头部 CT 扫描未见异常。随访至 1992 年 2 月未见复发,患者已于 1990 年底重新工作。

2 甲状腺肿瘤

甲状腺肿瘤,中医学称之为癭瘤,多与肝气郁结,气机郁滞,瘀血内停,痰浊交阻有关。故用化瘤汤加舒肝解郁、理气化痰之品,如:海蛤粉、昆布、海藻、山慈姑、三棱、莪术、穿山甲。经治 28 例中,男性 7 例,女性 21 例;年龄最小 17 岁,最大 58 岁。病程最短 1 个月,最长 12 年。甲状腺肿单侧者 26 例,双侧者 2 例;肿块最大 4cm×4.5cm,最小 2cm×2cm。28 例均用化瘤汤加减治疗,1 个月为 1 个疗程,28 例中治疗 1 个疗程 4 例,2 个疗程 9 例,3 个疗程 11 例,4 个疗程 2 例,未满 1 个疗程 2 例。治疗后,临床治愈 17 例,基本痊愈 5 例,好转 3 例,无效 3 例。25 例于 1991 年秋作随访记录,停药后最长已满 12 年,最短 4 年,都未见复发。

病例:傅××,男,55 岁,干部,1984 年 11 月初诊。前颈右侧肿块数月,经武汉某医院作碘¹³¹扫描:甲状腺右下冷结节,B 超提示为 4cm

* 湖北省武穴市第一人民医院,湖北省武穴市

(436400)

收稿日期:1992-03-18;修回日期:1992-07-10

×4.5cm 大的肿块。患者因惧怕手术治疗,延余诊治。肿块质地坚硬、皮色如常、不痛,可随吞咽动作而上下移动,舌质紫暗、边有瘀点,脉象沉涩。患者平素性情抑郁不乐,以致肝气郁结,疏泄条达失常,痰气交阻,积聚而生癭瘤。治拟理气化痰,破瘀散结。用化瘤汤去丹参、水蛭,加海蛤粉、昆布、海藻、煅牡蛎各 30g,山慈姑、夏枯草、海螵蛸各 10g。服药 3 剂,颈部肿块渐消;服药 12 剂后,肿块全消,触之未见异常,经碘¹³¹扫描及 B 超检查证实肿块全部消失。惟年老体弱,精神疲倦,纳差,拟服益气养血健脾以扶正,服八珍汤 5 剂收功。随访 7 年,未见复发。

3 纵膈肿瘤

纵膈肿瘤,多与胸阳不振,痰浊内凝,气机郁滞有关,故用化瘤汤加宽胸散结、理气化痰之品,如:全瓜蒌、薤白、郁金、桔梗。其中男性 1 例,女性 1 例;年龄最小 24 岁,最大 50 岁。用化瘤汤加味治疗,2 例病人均治疗 2 月余,症状全部消失,在武汉某医院 X 线拍片,做断层拍片复查,证实肿块全消,3 年来追访多次,未见复发,并能正常工作。

病例:吴××,女,46 岁,工人,1988 年 3 月 20 日初诊。患者 1 月前胸痛,吐痰血,咽喉疼痛、如物梗阻,声音嘶哑。经我院西医五官科诊治月余,胸痛加重,送武汉某医院拍片,做断层检查两次,确诊为:右上纵膈肿瘤。因患者拒绝手术,求治于余。咳逆倚息不得平卧,吐痰血,右胸憋闷疼痛,头昏心慌,食欲不振,口干、声音嘶哑,肌肉日渐消瘦,四肢乏力,小便黄,大便结,舌质红边有瘀点、苔薄黄,脉象弦数。此乃热邪犯肺,热伤血络,气滞血瘀,痰瘀互结所致。治以清热化痰,宽胸散结。方用化瘤汤去水蛭、归尾,加全瓜蒌 15g,薤白 10g,郁金 10g,桔梗 10g,川贝 10g,葶苈子 10g,鱼腥草 30g,仙鹤草 30g。服药 5 剂后,咳嗽减轻,咯绿色粘液,血痰消失,咯痰后胸部渐觉轻松,憋闷大减,夜能入睡,原方去葶苈子,加甘草 6g,芦根 30g,连服 7 剂,诸恙悉减。后以此方出入连服两月余,诸证痊愈。又到武汉某医院复查,断层拍片证实:纵膈肿瘤完全消失。患者休息 3 个月后恢复工作,3 年来多

次追访,均身体健康。

4 子宫肌瘤

子宫肌瘤,多与血瘀气滞,寒邪内阻胞宫有关。故用化瘤汤加温经散寒、活血化瘀之品,如肉桂、小茴、益母草、三棱、莪术、生卷柏之属。《本草备要》中记载:卷柏,“生用破血通经,治症瘕淋结”。本品用量达 30g,必不可少,为治子宫肌瘤之要药。经治 14 例中,年龄最小者 32 岁,最大者 52 岁。14 例全部用化瘤汤加减治疗,以 3 个月为 1 个疗程,其中 1 个疗程者 2 例,2 个疗程者 5 例,3 个疗程者 6 例,未满 1 个疗程者 1 例。其中临床痊愈 8 例,显效 4 例,有效 1 例,无效 1 例。1991 年秋追访,除无效者 1 例外,其他病例疗效巩固。

病例:郭××,女,38 岁,农民,1979 年 1 月 17 日初诊。患者近 1 年来,阴道不规则流血,量多色红或紫黯成块,淋漓不断。此次经水两月未行,小腹刺痛难忍,小腹包块按之坚硬,推之不移。妇检:触及子宫前有一儿头大包块,推之不移,与子宫粘连,界限不清。B 型超声波探查:诊断为子宫肌瘤。因患者不愿手术,到我处求治。舌质边有瘀点,脉沉迟而弱。证系血瘀气滞,寒邪内阻胞宫。药用化瘤汤去白花蛇舌草,加三棱、莪术各 10g,生卷柏 30g,益母草 15g,小茴、肉桂各 8g。经期前腹痛时加香附、川楝子各 10g。服药 10 余剂,患者小腹剧痛,阴道下血较多,色暗夹有瘀块,继续用上方加减服 74 剂,包块消失。妇检:小腹部未触及包块。超声波检查:子宫进 2cm,出 6cm,其间可见子宫腔反射,无包块波征。后以调理脾胃、养血调经法,用八珍汤 10 剂,以善其后。

请订阅《中药事业报》

它将帮助您:掌握全国中药产销动态;了解各地中药市场信息;提供中药最新科技资料;丰富药材栽培保护技术;鉴别中药真假伪劣品质;充当家庭医疗保健顾问;汇集介绍家庭生活知识。

欢迎各界在当地邮局订阅,邮发代号 77-21,每份订价全年 31.20 元,半年 15.60 元。报社地址:重庆市解放西路 120 号 邮政编码:630012