

江西省 1991 年下半年高等中医自学考试

《中医儿科学》试题

(答案在下期刊出)

1 填空题(每题 1 分,共 20 分)

1.1 相传——是我国最早的一部儿科专著,书中提出的小儿为——的观点,对后世关于小儿生理特点的论述影响很大。

1.2 婴儿期阶段小儿生长发育特别快,周岁时体重为出生时的——倍,身长为出生时的——倍。

1.3 2~3 岁的小儿,每日所需的睡眠时间为——小时。

1.4 胎粪的颜色应是——,粘稠无臭。

1.5 肺炎喘嗽的主要病机是——,主要病理产物是——。

1.6 哮喘缓解期肺气虚弱的治疗,选方为——。

1.7 口疮虚火上浮证的治疗,选方为——。

1.8 小儿久泻而转化为慢惊风症的发病机理是——。

1.9 小儿积滞脾虚夹积证的治疗,选方为——。

1.10 痫症临床辨证分型,常见有惊痫、风痫、痰痫及——。

1.11 小儿水肿常见变证为邪陷心肝、水毒内闭、——。

1.12 麻疹顺证恢复期的治疗,选方为——。

1.13 风痧皮疹可满布全身,唯——较少或无疹。

1.14 白喉阴虚燥热证的治疗,选方为——。

1.15 小儿麻疹感受风热暑湿时行疫毒,由口鼻入侵,初起邪在肺胃,继则——,后期气虚血滞,肝肾亏损。

1.16 解颅脾虚水泛证的治疗,选方为——。

1.17 紫癜病程较长,病势缓和,时发时止,多属虚证,以——为主,也有——者。

1.18 新生儿赤游丹发病部位,多见于——。

1.19 小儿生后 24 小时内出现的黄疸,多为——黄疸。

1.20 脐风的治疗,常用方是——。

2 单项选择题(每题 1 分,共 10 分。将正确答案的序号填入括号内。)

2.1 小儿身长上、下部量,值相等时的年龄是()

①6 岁 ②8 岁 ③10 岁 ④12 岁

2.2 正常小儿前囟闭合的时间是()

①6~8 个月 ②8~10 个月 ③10~12 个月 ④12~18 个月

2.3 定吐丸适用于()

①胃热吐 ②胃寒吐 ③惊恐吐 ④肝气犯胃吐

2.4 腹痛绵绵,时作时止,痛处喜按,得温则舒,得食则缓,证属()

①腹部中寒 ②乳食积滞 ③脏腑虚冷 ④气滞血瘀

2.5 小儿水肿脾肾两虚证的治疗,宜选用()

①金匱肾气丸 ②济生肾气丸 ③真武汤 ④五苓散

2.6 临床出现腹泻与便秘交替的是()

①蛲虫病 ②蛔虫病 ③姜片虫病 ④钩虫病

2.7 临床可出现尿频、遗尿的是()

①蛔虫病 ②蛲虫病 ③姜片虫病 ④钩虫病

2.8 耳后及枕骨下淋巴结肿大的疾病是()

①麻疹 ②风痧 ③丹痧 ④水痘

2.9 临床“牛颈”症状见于()

①白喉 ②疟腮 ③丹痧 ④顿咳

2.10 汗证营卫不和证的治疗选方为()

①牡蛎散 ②玉屏风散 ③黄芪桂枝五物汤 ④固真汤

3 词解(每题 4 分,共 16 分)

3.1 舌疳

3.2 蛔厥

3.3 麻不厌透

3.4 压脐法

4 是非题(每题 1 分,共 10 分。对的打“√”,错的打“×”。)

4.1 正常小儿 6 岁以后开始将乳牙换为恒牙。()

4.2 鹅口疮心脾积热证,临床表现为口腔舌面满布白屑,疼痛流涎,面赤唇红,啼哭烦躁,大便干结,小便短赤,舌质红。()

4.3 小儿呕吐泛酸、嗳气频频,常见于肝气犯胃吐。()

4.4 水痘皮疹多见于头面部及四肢暴露部位。()

- 4.5 麻疹出疹期发热持续,起伏如潮,谓之“潮热”。每潮一次,疹随外出。()
- 4.6 白喉临床可出现言语障碍,吞咽困难,口眼歪斜,肢体瘫痪等症状。()
- 4.7 年龄较小的疳腮患儿,病程中邪毒易内窜厥阴而出现腹痛,睾丸肿痛之症。()
- 4.8 解颅也可因外感时邪,热毒壅滞,上攻于脑而成。()
- 4.9 紫癜常伴有鼻衄、齿衄、呕血、便血、尿血。()
- 4.10 脐风因抽搐频繁,死亡率极高,即使痊愈后,也留有痴呆、失语等后遗症。()
- 5 问答题(每题9~10分,共29分)
- 5.1 气滞血瘀腹痛是怎样形成的?其腹痛特点、临床治法与选方如何?(10分)
- 5.2 疳腮热毒蕴结证的临床表现、治法及选方如何?

(9分)

- 5.3 小儿暑温与疫毒痢在临床发病特点上有何异同?(10分)

6 病案(共15分)

张××,男,18个月。

患儿系7个月早产,生后因母乳不足,以奶粉喂养,6个月后胸骨稍见隆起,现见额宽,正面视之呈倒三角形,头围48cm,俯仰自如,头发枯黄稀疏,面白无华,上下牙齿各出4颗。尚不能行走,并不会叫爸爸、妈妈。两目有神、四顾正常,智力尚可,并能嬉戏。易出汗,常感冒,发则咳嗽痰鸣,缠绵不愈,大便溏,日2次。舌淡苔薄白,指纹色淡。

根据上述病情,要求回答:1. 中医诊断(病名、证型)。2. 证候分析。3. 治法。4. 选方用药(方名及药物,不写剂量)。

江西省1991年下半年高等中医自学考试

《针灸学》试题

1 单项选择题(下列各题有4个备选答案,其中只有一个是正确的,请把正确答案的号码写在题干相应的括号内。每小题1分,共20分)

- 1.1 天宗穴能治疗肩臂痛,主要原因是()
- A. 手太阳经穴 B. 穴位在肩胛部
- C. 远道取穴 D. 循经取穴
- 1.2 其直者,从缺盆下乳内廉的经脉是()
- A. 手厥阴经脉 B. 手少阴经脉
- C. 足阳明经脉 D. 足少阴经脉
- 1.3 肩髃穴能治疗肩痛,主要原因是()
- A. 远道取穴 B. 灸法
- C. 穴位在肩部 D. 循经取穴
- 1.4 按经脉所通,主治所及的理论,巅顶痛最好选用()
- A. 太冲 B. 列缺 C. 合谷 D. 内庭
- 1.5 光明穴位于腓骨前缘,当()
- A. 外踝尖上3寸 B. 外踝尖上4寸
- C. 外踝尖上5寸 D. 外踝尖上6寸
- 1.6 至阳穴的定位应在()
- A. 第七胸椎棘突下 B. 第八胸椎棘突下
- C. 第六胸椎棘突下 D. 第九胸椎棘突下
- 1.7 手阳明大肠经的腧穴主治,多为()
- A. 前头鼻口齿病 B. 侧头耳肋肋病
- C. 后头项肩臂病 D. 巅顶目前阴病

- 1.8 脾之大络散布于()

A. 季肋 B. 渊腋 C. 胸肋 D. 胃

- 1.9 《灵枢·根结》所言之“根”是指()

A. 手六经的井穴 B. 足六经的井穴

C. 手六经与足三阳经的井穴

D. 足六经与手三阴经的井穴

- 1.10 头针“运动区”的下2/5亦称()

A. 言语一区 B. 言语二区

C. 言语三区 D. 言语四区

- 1.11 下列哪种中药为水针所不用()

A. 鱼腥草 B. 肿节风

C. 曼陀罗 D. 徐长卿

- 1.12 决定补泻效果产生的因素之一是()

A. 进针的快慢 B. 得气的大小

C. 针刺手法 D. 留针时间的长短

- 1.13 隔盐灸主要用于()

A. 中风脱症 B. 中风闭症 C. 昏厥 D. 剧痛症

- 1.14 针灸治抽搐痰盛,除选用主穴外,痰盛常随证配用()

A. 印堂 神门 B. 脾俞 肺俞

C. 内关 丰隆 D. 人中 十宣

- 1.15 据子母补泻法,肾经虚证可补()

A. 阴谷 B. 涌泉