

江西省 1991 年下半年高等中医自学考试

《中医外科学》试题

1 单项选择题(每小题 0.5 分,共 25 分)

1.1 “疡科之证,在上部者俱属风温、风热;在下部者属湿火、湿热;在中部者,属气郁、火郁”,出自 ()

- ①《外科正宗》 ②《外科枢要》
③《外科大成》 ④《疡科心得集》

1.2 结扎法的适应证,下列哪项不符 ()

- ①瘤、赘疣 ②痔核、脱疽
③窦道、瘰管 ④脉络断裂出血

1.3 八宝丹的适应证下列哪项最正确 ()

- ①阳证疮疡溃后脓水将尽
②阴证疮疡溃后脓水将尽
③阴证、阳证疮疡溃后脓水将尽
④阴证、阳证疮疡溃后脓水未尽

1.4 疮疡溃后脓水稀少,坚肿不消,身热无力,面色无华,舌淡苔薄,脉数无力,宜用 ()

- ①透脓散 ②托里消毒散
③薏苡附子败酱散 ④桃红四物汤

1.5 颈痛、乳痈是以什么命名的 ()

- ①部位 ②症状 ③特性 ④范围大小

1.6 外科望舌苔,辨别病邪性质的主要依据是 ()

- ①舌苔有无 ②舌苔的颜色
③舌苔有根无根 ④舌苔的厚薄

1.7 善证恶证的正确含义是 ()

- ①善证是指脏腑生理功能正常
②恶证是指脏腑生理功能衰败
③主要从全身情况判断疾病预后
④局部病灶结合全身情况判断预后

1.8 斑的含义是 ()

- ①皮肤表面形态的改变
②不高凸也不凹陷皮面的限界性色素改变
③稍高出皮肤的片状色素改变
④凹陷于皮肤的色素改变

1.9 肿疡脉迟是 ()

①实邪内蕴,气血衰少 ②邪气深闭,其毒难化

- ③遗毒在内,气血凝滞 ④邪气壅塞,

正气尚盛

1.10 外科疾病发生发展的根本原因是 ()

- ①气血凝滞 ②经络阻塞 ③脏腑功能失调

④阴阳失调

1.11 下列哪项不属“脾善”的表现 ()

- ①唇色滋润 ②饮食知味
③形丰便调 ④寢寐安宁

1.12 流痰发病与何脏亏损有关 ()

- ①心 ②肝 ③脾 ④肾

1.13 流注发于髂窝者,无论何种原因,一般称 ()

- ①暑湿流注 ②髂窝流注
③余毒流注 ④瘀血流注

1.14 附骨疽的成脓时间在 ()

- ①起病后 3~4 周 ②起病后 2~3 周
③起病后 1~2 周 ④起病后 1 月

1.15 发生“走黄”的原因 ()

- ①正虚 ②伤津 ③腑实 ④邪盛

1.16 疔疮走黄原因以下哪一项可以不考虑 ()

- ①早期失治误治 ②挤压碰伤毒散
③过早切开引流 ④麻痘余毒未清

1.17 产妇发生流注,其病因是 ()

- ①暑湿阻于营卫 ②余毒流注经络 ③恣食厚味,化生火毒 ④恶露不尽,瘀血停滞

1.18 一人手指生疮,患指均匀红肿,呈半屈曲状,被动伸直时,引起剧烈疼痛,应诊断为 ()

- ①蛇头疔 ②蛇肚疔 ③蛇眼疔 ④托盘疔

1.19 治疗乳痈初起常用内服方为 ()

- ①黄连解毒汤 ②牛蒡解肌汤
③瓜蒌牛蒡汤 ④五味消毒饮

1.20 解郁化痰法可用于下列哪种病 ()

- ①乳痈 ②乳头破碎
③乳癖 ④乳衄

1.21 乳房深部脓肿切开排脓采用哪种切口最好 ()

- ①放射状切口 ②横切口
③乳房根部弧形切口 ④乳房弧形切口

1.22 乳癌四期诊断依据是 ()

- ①肿块已翻花 ②肿块超过 5cm
③同侧腋窝淋巴结转移 ④锁骨上淋

巴结转移

1.23 乳房疾患,证见经前期胀痛应诊断为 ()

- ①乳痈 ②乳腺增生病

- ③乳岩 ④乳病
- 1.24 临床诊断乳癌,哪项最为重要 ()
①乳房疼痛 ②乳头内陷
③乳房浅表青筋暴露 ④乳内可触及肿块
- 1.25 乳房部结块如梅李,经前不胀痛应诊断为 ()
①内吹乳痈 ②乳癖 ③乳病 ④乳癆
- 1.26 治疗气瘰的常用内治方剂是 ()
①海藻玉壶汤 ②四海舒郁丸
③逍遥散 ④桃红四物汤
- 1.27 下列除……之外,都是岩表现的特点 ()
①肿块坚硬如石 ②皮核相亲
③结块可动与周围组织不粘连
④肿块不光滑有棱角
- 1.28 石瘰的病因病理是 ()
①忧思郁怒,湿痰凝结
②气郁湿痰瘀血凝滞而成
③一为患怒,二为水土不佳
④饮水和食物中含碘不足
- 1.29 药物性皮炎初次发病潜伏期为 ()
①1天内 ②4天以上 ③1月以上 ④4~20天
- 1.30 红斑性狼疮有全身神疲、面部红斑、口干唇燥、舌质红脉细数是什么证 ()
①热毒炽盛 ②脾肾阳虚
③肝郁血瘀 ④阴虚火旺
- 1.31 皮肤慢性期外用用药应选择哪种剂型 ()
①水剂 ②散剂
③软膏、药酒、外洗药 ④粉水剂
- 1.32 引起药物性皮炎最常见的给药途径有 ()
①口服、注射 ②吸入 ③栓塞 ④皮肤外敷
- 1.33 粉刺的皮疹特点 ()
①风团 ②黑头丘疹
③松厚鳞屑 ④成簇丘疹
- 1.34 复方土槿皮酊常用在哪种皮肤病 ()
①白疔 ②鹅掌风、脚湿气
③圆癣 ④湿疮
- 1.35 内痔主要根据什么症状进行分期 ()
①便血 ②疼痛 ③脱出 ④患病时间
- 1.36 静脉曲张性外痔多合并 ()
①直肠息肉 ②肛裂
③内痔 ④肛乳头肥大
- 1.37 结缔组织外痔是由……所致 ()
①炎症刺激 ②痔静脉曲张
③腹腔压力增高 ④遗传因素
- 1.38 鉴别痔疮脱出、脱肛、息肉痔,常用体位是 ()
①侧卧位 ②胸膝位 ③截石位 ④蹲位
- 1.39 肛瘘手术的成败,其关键在于 ()
①切除瘻管 ②引流通畅
③将外口与瘻管一并切除 ④找到内口并切除
- 1.40 以截石位为标准,找出下列哪种病不是其好发部位 ()
①内痔好发于齿线上3、7、11点
②赘皮外痔好发于齿线下6、12点
③肛裂好发6、12点
④血栓外痔好发于肛缘5、7点
- 1.41 枯痔散疗法的作用机理是一种 ()
①湿性坏死疗法 ②干性坏死疗法
③硬化疗法 ④萎缩疗法
- 1.42 患者男性,成年,肛旁胀痛,伴发热,近两天局部有跳痛。检查:距肛门4cm处(左侧),肿胀隆起,灼热稍红,压痛明显,有应指感,白细胞计数升高。诊为 ()
①骨盆直肠窝脓肿 ②坐骨直肠窝脓肿
③直肠后间隙脓肿 ④肛周皮下脓肿
- 1.43 直肠周围注射法的适应证是 ()
①内痔、直肠脱垂 ②Ⅱ、Ⅲ度直肠脱垂
③Ⅰ度直肠脱垂 ④肛管脱垂
- 1.44 神经毒毒蛇咬伤后的创口是 ()
①局部不红不肿麻木 ②局部红肿稍痛
③伤口剧痛肿胀 ④局部微红肿痒痒
- 1.45 深Ⅱ度烧伤无感染情况下,愈合时间是 ()
①1~2周 ②2~3周 ③3~4周 ④5~6周
- 1.46 破伤风的潜伏期一般为 ()
①24小时 ②2天 ③4~14天 ④3~4周
- 1.47 臃疮的病因是 ()
①风寒外袭 ②脾虚生湿
③湿热不注 ④气血两虚
- 1.48 血栓性浅静脉炎多发生在 ()
①股静脉 ②髂股静脉
③腘静脉 ④大隐静脉
- 1.49 褥疮的好发部位 ()
①大腿 ②膝关节 ③小腿 ④足跟
- 1.50 蛇咬伤早期缚扎的松紧度最好是 ()
①阻断淋巴回流 ②阻断静脉血回流
③阻断动脉血供 ④阻断淋巴液及静脉血回流

2 多项选择题(每小题 1 分,共 25 分)

2.1 风邪所致肿痛的特点是

() () () () ()

① 肿处宣浮 ② 攻痛无常 ③ 来热急速 ④ 游走无定 ⑤ 皮肤红热

2.2 溃瘍脉沉是

() () () () ()

① 邪盛正衰 ② 遗毒在内 ③ 寒滞经络 ④ 气血凝滞 ⑤ 气血不足

2.3 病变在骨关节疼痛多为

() () () () ()

① 持续痛 ② 酸痛 ③ 钝痛 ④ 刺痛 ⑤ 隐痛

2.4 记载主诉时应简明扼要,正确记录是

() () () () ()

① 主要症状及明显体征 ② 异常感觉的性质及持续时间 ③ 治疗经过 ④ 类似发病史 ⑤ 发病的可能原因

2.5 外科中“痰”的含义是指

() () () () ()

① 疾病名称 ② 病理产物 ③ 部分体表肿块 ④ 致病邪气 ⑤ 病机转化

2.6 疔药的优点有

() () () () ()

① 适应证广泛 ② 无副作用 ③ 作用持久 ④ 固定位置 ⑤ 保护疮面

2.7 发颐成脓后期,脓可从……溃出

() () () () ()

① 颌颌部 ② 口腔部 ③ 外耳道 ④ 颈部 ⑤ 枕部

2.8 附骨疽早期诊断依据是

() () () () ()

① 起病急、寒战高热 39~40℃ 以上 ② 患肢疼痛彻骨,1、2 天内即不能活动 ③ 脓肿骨胀 ④ 骨端深压痛,叩击痛 ⑤ 肿块有波动感

2.9 流注按其常见病因取名有

() () () () ()

① 暑湿流注 ② 余毒流注 ③ 瘀血流注 ④ 寒邪流注 ⑤ 湿邪流注

2.10 在流注与流痰的鉴别中,有助于流注的诊断是

() () () () ()

① 发于肌肉 ② 随处可生 ③ 成脓较快 ④ 收口较容易 ⑤ 日晡潮热

2.11 流痰的后期临床特征是

() () () () ()

① 脓稀夹有败絮样物质 ② 疮面形成漏管久不收口 ③ 有虚损症状 ④ 局部功能障碍 ⑤ 高热头痛

2.12 乳发的辨证施治用方可选

() () () () ()

① 瓜蒌牛蒡汤 ② 龙胆泻肝汤 ③ 丹栀逍遥散 ④ 黄连解毒汤 ⑤ 仙方活命饮

2.13 乳痈切开时应注意

() () () () ()

① 切口取放射形 ② 切开后,注意把间隔分开 ③ 因脓腔较大,引流不畅时,做对口引流 ④ 用九一丹药线以提脓祛腐 ⑤ 脓腔内塞白降丹纱布以平胬肉

2.14 瘰疬的病因可有

() () () () ()

① 气滞 ② 血瘀 ③ 痰凝 ④ 肝肾不足 ⑤ 胃热壅滞

2.15 诊断白疔的依据是

() () () () ()

① 扁平丘疹和红斑,可融合成片 ② 境界清楚 ③ 多层银白色鳞屑 ④ 用力搔抓或刮之有筛状出血 ⑤ 糜烂流汁

2.16 牛皮癣的特点是

() () () () ()

① 皮肤肥厚呈皲裂状 ② 阵发性剧痒 ③ 可有抓痕和血痂 ④ 渗出、糜烂 ⑤ 结节、结痂

2.17 皮肤病的自觉症状可有

() () () () ()

① 麻木 ② 疼痛 ③ 瘙痒 ④ 抓痕 ⑤ 结节

2.18 下列哪些是脓疱疮皮损

() () () () ()

① 红斑 ② 水疱 ③ 脓疱 ④ 糜烂 ⑤ 鳞屑

2.19 肛痿的手术原则是

() () () () ()

① 正确处理内口 ② 必须去除静脉曲张 ③ 尽量不要切断肛肠环 ④ 应切断内括约肌 ⑤ 尽量去除管壁和支管

2.20 外痔的主要症状

() () () () ()

① 便血 ② 坠胀、疼痛 ③ 便秘 ④ 有异物感 ⑤ 分泌粘液

2.21 肛门疾病中,内治法多用于

() () () () ()

① 内痔嵌顿伴感染 ② 年老体弱的内痔患者 ③ 内痔兼有其它严重疾病 ④ 有习惯性便秘的肛裂患者 ⑤ 脱肛

2.22 一度脱肛的主要表现有

() () () () ()

- ①脱出物淡红色,长约3~5cm ②触之较厚有弹性 ③触之柔软,无弹性,可自然回复 ④呈圆锥形 ⑤呈圆柱形

2.23 在脱肛与动脉硬化性闭塞症的鉴别诊断中,哪些支持后者的诊断

() () () () ()

- ①多见于50岁以上 ②双侧下肢常同时发病 ③常伴有迁移性静脉炎 ④伴有高血压、冠状动脉供血不足 ⑤起病较快易坏死

2.24 血栓性深静脉炎,病变在髂股静脉者有

() () () () ()

- ①下肢皮肤焮红灼热 ②下肢疼痛、水肿 ③大腿外侧有明显压痛 ④大腿内侧、股管处有明显压痛 ⑤下肢皮肤发白或略发绀

2.25 血栓性深静脉炎早期的内治法则宜

() () () () ()

- ①温经散寒 ②活血通络 ③清热利湿 ④祛风燥湿 ⑤补气活血

3 填充题(每小题2分,共10分)

3.1 托法在临床具体应用时,可分_____和_____两类。

3.2 漏的含义,包括两种不同性质的病理改变:一为_____,二为_____。

3.3 薛立斋说:“筋骨呈露曰筋痿,_____交结曰血痿,_____不变曰肉痿,随喜怒消长曰气痿,坚硬不可移曰石痿。”

3.4 II期内痔,痔核较大,大便时可_____便后_____回纳。

3.5 脱疽血瘀证,患肢持久性_____痛,寒湿证常有_____性跛行。

4 问答题(共40分)

4.1 何谓疮疡内治三大法则?其适应证如何?(10分)

4.2 痢证的临床特点有哪些?(10分)

4.3 如何理解《外科医案汇编》一书中指出的治乳症不出一气字?(10分)

4.4 脚湿气的三型各有什么特点?(4分)

4.5 直肠息肉的中医病因是什么?当息肉发炎表面糜烂时有些什么症状?(6分)

中医研究院针灸研究所科林技术开发公司经销下列针灸用品

- | | | |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. ZDZ-3型经络导平仪 3350 | 21. 韩氏多用针灸治疗仪 197 | 36. 26公分塑料针灸模型人 30元/个 |
| 2. 心脑诊断治疗仪 IIIA 2030 | 22. JG-10激光针灸治疗仪 1640 | 37. 热磁波按摩器 57元/个 |
| 3. 颈椎病治疗仪 1280 | (以上价格均为元/台) | 38. 《妇人针方九集》4.9元/本 |
| 4. 胆石症治疗仪 IIIA 1828 | 23. 针灸针 0.5~3英寸 0.17元/支 | 39. 《中国针灸治疗学》38元/本 |
| 5. 胆结石治疗仪(LC) 123 | 4~6英寸 0.25元/支 | 40. 耳模小号 5元/个 |
| 6. 骨质增生治疗仪 IIIA 1966 | 24. 一次灭菌针灸针 0.5~3英寸 | 41. 降压器(全自动)55元/台 |
| 7. 风湿病治疗仪 IIIA 1879 | (华佗)0.22元/支 (环球)0.20元/支 | 42. 拔火罐(大、中、小)2.50元/个 2.00元/个 1.50元/个 |
| 8. HB-ED耳穴诊断治疗仪(台式)1280 | 25. 针灸器械包(大)62元/套 | 43. 脱敏胶布 10元/筒 |
| 9. HB-EDT耳穴诊断治疗仪(袖珍)205 | (小)18元/套 | 44. 针盒 2.50元/个 |
| 10. 温经治疗仪 285 | 26. 磁镊针(可调)26元/支 | 45. 揸针 1.00元/包 |
| 11. JJ-205中国经络诊疗器(出口型)395 | (不可调)16元/支 | 46. 皮内针 1.00元/包 |
| 12. JJ-305D中国经络诊疗器型 220 | 27. 梅花针 6元/支 | 47. 俞穴用查尺 30元/个 |
| 13. ZYZ-1型多功能针灸治疗仪 180 | 28. 周氏万应点灸笔(精装)35元/盒 | 48. 神灸针灸笔 89元/台 |
| 14. 青岛 G6805 针灸治疗仪(1型)175 | (简装)26元/盒 | 49. 针夹 4.00元/个 |
| 15. G6805 针灸治疗仪(上海)220 | 29. 灸架 9元/个 | 50. XL--200型系列血液辐射治疗仪 7258元/台 |
| 16. 多路疾病探测治疗仪 890 | 30. 艾条 4.5元/盒 | 51. XL--200型系列血液辐射治疗仪(便携式)5635元/台 |
| 17. 神阙电子灸仪 197 | 31. 耳豆板 12元/块 | 52. FYC-11伏卧式多功能腰椎治疗床 6692元/台 |
| 18. 魔针多功能疾病探测自动治疗仪 1150 | 32. 磁珠 25元/包 | |
| 19. 小魔针——全自动治疗器(袖珍)98 | 33. 《标准针灸经穴挂图》13元/套 | |
| 20. MLA-I型多功能激光针灸治疗仪 3350 | 34. 《耳穴挂图》12元/套 | |
| | 35. 51公分塑料针灸模型人 56元/个 | |

为了方便广大用户,本公司办理邮购业务,近年来我们已为数千用户办理了邮购,深受欢迎。

邮寄办法:(1)总价50元以上商品办理邮购;(2)加收10%邮寄手续费;(3)从邮局或银行汇款均可,款到发货;(4)来函务必注明所需物品名称、收件人及详细地址、邮政编码;(5)单位邮购来函要合同书;(6)本公司重信誉、守合同,敬请邮购者放心。

公司地址:北京东直门内北新仓18号中国中医研究院针灸所内。交通:乘地铁到东直门站下车,出南站口向西约300米,或乘24路、106路、107路车到小街下车,进中医研究院大门后向南针灸所即可,联系人:田新华,邮政编码:100700,电话:4014411—2705,开户银行:北京工商银行北新桥分理处,帐户:670124--89。

欢迎来人来函选购,同时欢迎各种形式的技术合作。