

质;湿敷组、造模组的甲状腺滤泡上皮细胞呈高立方柱状增生,细胞顶部可观察到许多含有胶样物的吞噬体,粗面内质网显著扩张,部分融合成较大的囊泡,少数细胞核发生变形,有核切迹或凹陷,滤泡腔胶质稀少,微绒毛增多、粗大;消瘦组甲状腺超微结构与正常组相同。

3 讨论

瘰癧发病与气滞、痰凝、血瘀相关,其中与痰瘀壅结关系尤为密切。消瘦膏具化痰、祛瘀、散结之作用,所选药物均为峻猛、香窜之品,取其力猛攻坚而获捷效,而芳香之品气味俱厚,能率领药物开结行滞,直达病所。

外敷消瘦膏有明显抗甲状腺肿效果,对各

年龄组及各类良性甲状腺肿均有疗效,尤以对病程短、甲状腺肿程度较小患者收效尤著,临床总有效率为84.4%。由于敷药期间无明显副作用,弥补了西药内服的不足,颇受患者欢迎。

动物实验观察表明,外敷消瘦膏与西药甲状腺片作用近似,能显著减轻甲状腺重量,使甲状腺细胞由增生状态恢复至正常结构,并能调整甲状腺功能,纠正血清低 T_4 水平。外敷该药对实验动物无副作用,对其正常生长亦无影响。

本论文得到山东医科大学附属医院病理科乔柏生教授、孙鸿宇副教授,省中医院冯建华、郭宝荣、陈刚老师,山东中医学院中心实验室叶向荣、刘斌老师指导,特此致谢

误治寒中救逆案

韦能定*

王××,男,51岁,教师,1973年11月12日初诊。咽部哽塞不利,时轻时重已3月,曾作慢性咽炎急性发作以青、红霉素,六神丸,炎得平,板蓝根片等配合银翘马勃、玄麦甘桔汤治疗半月不效。经钡餐造影等检查后,排除食道癌,诊为慢性咽炎、癔病球。继服半夏厚朴汤加木蝴蝶、黄连各10克,药后渐起纳差神疲,泛恶欲呕,头昏头痛,畏寒,自认为病久体虚冒风,自服治感冒西药,并继服前方58剂后,突然昏仆在地,不省人事。经灌开水、掐穴位、肌注可拉明等约1小时后始呼之能应,但神识朦胧,盖被3床仍四肢冰凉。舌红胖暗,苔黑滑厚,脉浮大数而无力。证属寒凉伤中,浊阴内盛,虚阳外越,有欲脱之势。急拟温中散寒,破阴回阳,益气救脱:生晒参(另炖)、附片(先煎)、龙骨、牡蛎各30g,干姜20g,砂仁(后下)、白蔻(后下)、炙甘草各10g。浓煎取汁,频频饮服。尽剂,神识转清,四肢渐温,但胃脘冷痛,欲呕,纳差神疲,大便稀溏日2、3解,小便清长。黑滑苔稍退,脉转沉细无力,上方去龙骨、牡蛎以减其制,增和胃降浊之品:生晒参(另炖)、附片(先煎)各20g,法半夏、茯苓、干姜各12g,砂仁(后下)、白蔻(后下)、吴萸、

公丁香、炙甘草各10g。每日1剂,三煎分服。4剂后呕吐止,胃脘冷痛减轻,食纳增加,精神好转,头身重痛,大便仍溏,日一解,小便淡黄量多。舌淡红略胖,苔转白滑,脉沉细缓无力。上方去法半夏、生晒参、公丁香,加桂枝10g、威灵仙12g、明党参30g。服18剂后,头身重痛除,胃脘余隐痛,头昏多梦,腰膝酸冷,大便稍干。白滑苔转薄,脉沉细缓。改拟脾肾两温:党参24g,附片(先煎)、山萸、焦术各12g,肉桂、炙甘草各8g,杜仲、熟地、山药、枸杞各15g,吴萸、干姜各10g。服42剂后,头昏多梦除,腰膝酸软减轻,仍胃脘隐痛,大便微溏,精神、食纳大增。舌淡红,苔薄白,脉细缓。改早晨服附子理中丸15g,晚上服右归丸15g,中午以生附子10g,洗净切片,荷叶包,大米100g,蒸后食饭。连用3月,诸症悉除,康复上班。迄今17年后随访健康。

按:本例梅核气因久服黄连致寒凉伤中,浊阴内盛,虚阳外越,有欲脱之势。故治以大剂量参附龙牡温阳益气救脱,干姜散寒,砂仁、白蔻和胃化湿,炙甘草调和药味。二诊脉敛、神清、脱固,故去龙骨、牡蛎;欲呕、胃脘冷痛,加法半夏、茯苓、吴萸、公丁香增温胃降逆、散寒止呕之力。三诊中寒已减,头身仍痛,故去法半夏、公丁香,加桂枝、威灵仙祛经脉中寒湿。头身重痛愈后,以右归饮温肾阳,党参益气健脾,吴萸、干姜温胃暖脾。以九剂温养脾胃,附子荷叶饭散余寒,养胃气收功。

* 四川开县中医院,四川省开县汉丰镇新街(634400)

收稿日期:1991-11-13