

江西省1991年下半年高等中医自学考试

《中医伤科学》试题

(答案见下期)

1 填空题(每格0.5分,共18分。填写时请注意,部分内容前后顺序不可颠倒。)

1.1 明初,太医院制度分为十三科,伤科分为:“_____”和“_____”两个专科。

1.2 压痛可分为:_____和_____。根据压痛的部位、_____,可帮助鉴别损伤的性质种类。

1.3 若肝血不足,血不养筋,则出现_____,_____等症。

1.4 按致伤因素的职业特点可分为_____和_____等损伤。

1.5 练功疗法古称_____,它是通过_____的方法来防治某些_____疾病,促使_____加速恢复的一种方法。

1.6 肱骨髁上骨折可分为:_____型、_____型和粉碎型3种。骨折后,根据骨折侧端方移位情况,前2种类型的骨折又可分为:_____型和_____型骨折。

1.7 皮肤胶布牵引时间一般不超过_____周,在牵引中胶布如有_____,应及时更换。若皮肤创伤或有_____,均不可用此法牵引。

1.8 治疗股骨颈骨折时,应尽可能使_____角和_____角恢复正常,否则会影响髋关节功能。

1.9 伤筋的主要症状是_____,_____,_____,药物治疗伤筋时应掌握如下原则:急性伤筋的初期及中期治宜_____;急性伤筋的后期及慢性伤筋治宜_____。

1.10 胸肋内伤,辨证分型一般可分为_____,_____,_____。肋骨骨折多发生在_____肋。

2 单项选择题(每题1分,共13分。只能选1个正确答案,并把代表该答案的字母填入括号内。)

2.1 我国现存最早的一部伤科专著是: ()

- A.《备急千金要方》 B.《世医得效方》
C.《仙授理伤续断秘方》 D.《证治准绳》

2.2 三垫固定法常用于何种骨折移位? ()

- A.成角移位 B.侧方移位

C.分离移位 D.旋转移位

2.3 颈椎的活动范围,左右旋转均为:

- A.45°~55° B.55°~70°
C.60°~80° D.75°~85°

2.4 下列方法中,何种属损伤早期治法: ()

- A.和营止痛法 B.清热凉血法
C.接骨续损法 D.活血舒筋法

2.5 肱骨内上髁撕脱骨折的主要原因是: ()

- A.肱二头肌的牵拉 B.肱三头肌的牵拉
C.旋前圆肌的牵拉 D.前臂屈肌群的牵拉

2.6 筋伤中期的治疗原则是: ()

- A.消除凝滞,舒筋通络
B.活血消瘀,理气止痛
C.补气养血,祛风通络
D.补肾强筋,活利关节

2.7 擦擦法始见于: ()

- A.《外台秘要》 B.《千金方》
C.《素问·气血形志篇》
D.《正骨心法要旨》

2.8 损伤喘咳症,属血虚发喘者宜用: ()

- A.苏子降气汤 B.三子养亲汤
C.清气化痰丸 D.二味参苏饮

2.9 股骨髁上骨折,局部血肿大,胫后动脉、足背动脉搏动减弱或消失,应考虑为: ()

- A.股动脉损伤 B.动脉损伤
C.胫后动脉损伤 D.胫前动脉损伤

2.10 股骨颈移位骨折,手法整复后最宜采用哪种固定方法? ()

- A.穿丁字鞋固定 B.超髌关节夹板固定
C.沙袋夹挤固定 D.持续牵引固定

2.11 掌指关节脱位的特征之一是: ()

- A.患指短缩,局部肿胀疼痛
B.指间关节和掌指关节均呈过伸畸形
C.掌指关节过伸畸形,并弹性固定
D.掌指关节屈曲畸形,并弹性固定

2.12 胫管综合症受压迫的神经是: ()

- A.胫前神经 B.胫后神经
C.腓深神经 D.腓浅神经

2.13 作抗阻力的腕关节背伸和前臂旋后动作,引起患处疼痛者为: ()

- A. 肱骨内上髁炎 B. 腕管综合症
C. 桡侧伸腕肌腱周围炎
D. 肱骨外上髁炎

3 多项选择题(每题1分,共17分。各题有2个以上答案是正确的,请选出正确答案并把代表这些答案的字母填入括号内。凡多填,少填或填错均不给分)

3.1 扭转暴力引起的骨折多为: () () () () ()

- A. 粉碎性骨折 B. 斜形骨折
C. 青枝骨折 D. 螺旋骨折
E. 横形骨折

3.2 摸法的主要用途是: () () () () ()

- A. 摸畸形 B. 摸肤温
C. 摸异常活动 D. 摸弹性固定
E. 摸肿块

3.3 外治理筋手法常应用于: () () () () ()

- A. 骨折 B. 脱位 C. 伤筋
D. 先天畸形 E. 骨病

3.4 复元活血汤方内有: () () () () ()

- A. 穿山甲、大黄、桃仁
B. 赤芍、地龙、生地
C. 归尾、柴胡、花粉、红花
D. 川牛膝、枳壳、丹参、元胡
E. 泽泻、陈皮、香附、川芎

3.5 损伤中期内治常用: () () () () ()

- A. 行气消瘀法 B. 攻下逐瘀法
C. 和营止痛法 D. 接骨续筋法
E. 舒筋活络法

3.6 因血供障碍常可发生缺血性骨坏死的有:

() () () () ()

- A. 股骨颈头下骨折 B. 胫骨上段骨折
C. 腕舟骨腰部骨折 D. 肱骨外科颈骨折
E. 桡骨下端骨折

3.7 肱骨干中1/3骨折,近端向前外移位的原因是: () () () () ()

- A. 三角肌的牵拉 B. 肱二头肌的牵拉
C. 肱三头肌的牵拉 D. 喙肱肌的牵拉
E. 胸大肌的牵拉

3.8 肱骨髁上骨折最易合并血管神经损伤的是:

() () () () ()

- A. 肱动脉 B. 正中神经 C. 桡神经
D. 尺神经 E. 桡动脉

3.9 股骨粗隆间骨折中,属不稳定型的有:

() () () () ()

- A. 顺粗隆间无移位骨折
B. 顺粗隆间有移位骨折
C. 顺粗隆间粉碎性骨折
D. 反粗隆间骨折
E. 粗隆下骨折

3.10 股骨干骨折后: () () () () ()

- A. 下1/3骨折时,远端往往向后移位
B. 由于疼痛刺激和内出血量较大,早期可能合并休克
C. 最常见的并发症是脂肪栓塞综合症
D. 上1/3骨折作持续牵引时应将患肢置于屈髋屈膝中立位
E. 在牵引过程中,发现牵引过度时应及时纠正

3.11 尺桡骨干双骨折多由: () () () () ()

- A. 直接暴力所引起
B. 传达暴力所引起
C. 扭转暴力所引起
D. 肌肉强烈收缩所引起
E. 病理因素所引起

3.12 下列症状中,哪些是髋关节前脱位所特有的: () () () () ()

- A. 髋关节功能障碍
B. 腹股沟处可摸到股骨头
C. 髋关节疼痛剧烈
D. 患肢弹性固定于外展外旋轻度屈曲位
E. 伤肢膝部不能靠在对侧大腿上

3.13 下列损伤中,哪些死亡率较高:

() () () () ()

- A. 颈₄以上骨折合并截瘫
B. 闭合性肋骨骨折伴少量气胸
C. 腰椎骨折合并不完全性瘫痪
D. 骨盆骨折合并有大血管损伤
E. 肋骨骨折合并张力性气胸

3.14 急性伤筋需要鉴别的疾病有:

() () () () ()

- A. 骨肿瘤 B. 风湿肿痛
C. 骨结核 D. 湿热流注
E. 骨折

3.15 出现腰痛,下肢放射的疾病常有:

() () () () ()

- A. 棘间韧带损伤 B. 梨状肌综合症
C. 腰椎间盘突出症 D. 慢性腰肌劳损

E. 腰椎椎管狭窄症

3.16 闭合性颅顶骨折的类型有: () () () () ()

A. 斜形骨折 B. 粉碎骨折

C. 螺旋形骨折 D. 线形骨折

E. 凹陷骨折

3.17 股骨头骨骺炎的治疗原则是:

() () () () ()

A. 限制患肢负重 B. 避免继续损伤

C. 防止发生关节畸形

D. 症状好转后加强行走锻炼

E. 药物调养亏虚

4 名词解释题(每题2分,共14分)

4.1 间接暴力

4.2 深度按摩法

4.3 骨擦音

4.4 闭合性脱位

4.5 反常呼吸活动

4.6 疼痛弧

4.7 扭伤

5 问答题(每题6分,共24分)

5.1 颈椎病痹痛型的主要临床表现有哪些? 如何进行检查?

5.2 简述脱位的诊断要点。

5.3 有移位的单纯骨盆骨折应如何整复?

5.4 老年股骨颈骨折患者,全身情况常可发生哪些变化? 当感染发热时,其发热有何特点?

6 病案分析(每题7分,共14分)

6.1 王某,男,25岁,工人,于半小时前不幸被重物砸伤,致使右前臂肿痛而急来院求治。

检查:患者痛苦面容,但全身情况良好,检查配合。检查中发现患者右前臂中段呈现向后成角畸形,局部肿胀疼痛,压痛明显,且有异常活动,经X线片检查提示右尺桡骨干中下段双骨折,骨折线呈横形,在同一平面上,且有明显重叠,单用拔伸牵引手法很难使重叠得到完全纠正。

试问此种损伤属何种暴力所致? 应如何手法整复?

6.2 姜某,女,40岁,干部,因外伤致胸痛已2个月,复发疼痛3天。患者于2个月前,右胸部撞伤致疼痛,经治后好转,但未加继续治疗,故时感左胸部隐隐作痛,时轻时重。3天前因大扫除劳累,汗出后受寒,自感左胸部疼痛加剧,前来诊治。

检查:患者形体消瘦,左胸部无明显肿胀,有压痛但无固定压痛点,胸廓挤压试验阴性,心肺听诊正常,舌淡红苔薄白脉细涩。X片示无异常。

根据上述病例回答:①完整诊断及简要病机

②辨证论治

江西省1991年下半年高等中医自学考试

《中医外科学》试题答案及评分标准

1 单项选择题:(每小题0.5分,共25分)

1. ④ 2. ③ 3. ③ 4. ② 5. ① 6. ② 7. ③
8. ② 9. ① 10. ④ 11. ④ 12. ④ 13. ② 14.
① 15. ④ 16. ④ 17. ④ 18. ② 19. ③ 20.
③ 21. ③ 22. ④ 23. ② 24. ② 25. ② 26.
② 27. ③ 28. ② 29. ④ 30. ④ 31. ③ 32.
① 33. ② 34. ② 35. ③ 36. ③ 37. ① 38.
④ 39. ④ 40. ④ 41. ② 42. ② 43. ② 44.
① 45. ③ 46. ③ 47. ③ 48. ④ 49. ④ 50.
④

2 多项选择题:(每小题0.5分,共25分)

1. ①③④ 2. ②④ 3. ①②③⑤ 4. ①② 5. ①
②③④ 6. ①③④⑤ 7. ①②③ 8. ①②③④
9. ①②③ 10. ①②③④ 11. ①②③④ 12. ②④
⑤ 13. ①②③④ 14. ①②③④ 15. ①②③④

16. ①②③ 17. ①②③ 18. ①②③④ 19. ①③
⑤ 20. ②④ 21. ①②③④⑤ 22. ①③ 23. ①
②④ 24. ②④⑤ 25. ②③

3 填空题(每小题2分,共10分)

1. 透托法 补托法 2. 窦道 瘰管 3. 赤脉 皮
色 4. 脱出肛外 自行 5. 静止 间歇

4 问答题(共40分)

4.1 (10分)①疮疡在发展过程中分为初起、成脓、溃后三个阶段,由此而立消、托、补三大法,即谓疮疡内治三大法则。

②消法使初起肿疡得以消散,适用于初起肿疡及外科非化脓性肿块性疾病。

③托法是用补气血和透脓的法则扶助正气,托毒外出,以免毒邪内陷。适用于外疡中期,正虚毒盛,不能托毒外出,疮形平塌,难溃、难腐的虚证。