

江西省 1991 年下半年高等中医自学考试

《中医伤科学》试题答案及评分标准

1 填空题(每格 0.5 分,共 18 分)

1. 接骨 金箍 2. 直接压痛 间接压痛 范围 程度
3. 手足拘挛 肢体麻木 屈伸不利 4. 生活、工农业
运动、交通 5. 导引 肢体运动 损伤性 肢体功能
6. 伸直型 屈曲型 尺偏型 桡偏型 7. 4~6 周
滑脱 静脉曲张 慢性溃疡 皮炎 对胶布过敏者
8. 内倾(或填颈干) 前倾 9. 疼痛 瘀肿 功能障碍
活血化瘀、消肿止痛 养血活络、温经止痛 10.
伤气型 伤血型 气血两伤型 4~7

2 单项选择(每题 1 分,共 13 分)

1. C 2. A 3. C 4. B 5. D 6. A 7. C 8. D 9. B
10. D 11. C 12. B 13. D

3 多项选择题(每题 1 分,共 17 分)

1. BD 2. ABCDE 3. ABC 4. AC 5. CDE 6. AC
7. AD 8. AB 9. CDE 10. ABE 11. ABC 12.
BD 13. ADE 14. BDE 15. CE 16. DE 17. ABCE

4 名词解释题(每题 2 分,共 14 分)

4.1 是造成损伤的一种外力形式,这种外力所造成的
损伤,发生在远离外力所作用的部位。

4.2 即用手指、掌根、全掌或双手重叠在一起进行推
摩的一种理筋手法。

4.3 骨折断端相互触碰或摩擦而产生的声音。

4.4 皮肤无创口,脱位关节与外界不相通。

4.5 多根多处骨折时,该部胸廓失去支持,故在吸气
时因胸腔内负压增加而向内凹陷。呼气时,胸腔内负压
减低而向外凸出,成为反常呼吸活动。

4.6 是指患肩外展未到 60°时,疼痛较轻,被动外展至
60°~120°范围内时,疼痛较重,当上肢上举超过 120°
时,疼痛又减轻,且可自动上举。因而对 60°~120°这个
范围,临床上常称为“疼痛弧”。

4.7 扭伤系间接暴力使肢体和关节周围的筋膜、肌
肉、韧带过度扭曲、牵拉、引起损伤或撕裂。

5 问答题(每题 6 分,共 24 分)

5.1 答:临床表现,①多数无明显外伤史,少数可外伤
而诱发。(1分)②很多患者原因不明,渐渐感到一侧肩、
臂、手麻木或疼痛,颈部后伸、咳嗽、甚至增加腹内压时
疼痛增加。(1分)③部分患者可有头晕、耳鸣、耳痛或握
力减弱及肌肉萎缩,但颈部症状不明显。(1分)临床检
查:①下段颈椎棘突或患侧肩胛骨内上角常有压痛点,
部分患者可摸到条索状硬结,颈部活动受限,以麻木为

主者,可有疼痛减退或握力减弱(1分)②牵拉试验阳
性压头试验阳性(1分)③必要时拍颈椎 X 片检查,观
察病变情况(1分)

5.2 答:①有明显外伤史(1分)②一般症状:肿胀、疼
痛、关节功能障碍(2分)③特有体征:关节盂空虚、畸
形、弹性固定(2分)④X 线检查可提示关节脱位(1分)

5.3 答:复位的方法应视骨折移位情况而定①髂骨翼
外旋、耻骨联合分离者,患者仰卧,术者先牵引患侧下
肢以纠正半侧骨盆向上移位,然后用双手相对挤压髂骨
骨部,使骨折整复。(2分)②亦可使患者侧卧于木板上,
患侧在上,用推按手法对骨盆略加压力,使分离骨折得
到复位。(2分)③髂骨翼内旋、耻骨联合向对侧移位者,
患者取仰卧位,术者先纵向牵引纠正患侧骨盆向上移
位,然后用双手分别置于两侧髂前上棘处,并同时向外
侧推按分离骨盆,使其骨折复位。(2分)

5.4 答:①常出现神色憔悴、倦怠懒言、胃纳不佳、舌
淡、脉细弱等。(1分)②由于津液亏损、中气不足、舟无
水不行,可出现大便秘结。(1分)③长期卧床,可发生褥
疮、泌尿系感染或结石,坠积性肺炎等并发症。(2分)④
老年人感染发热,有时体温不一定高,出现低热。(2分)

6 病案分析(每题 7 分,共 14 分)

6.1 答:根据以上情况,①患者右尺桡骨干中下段横
形骨折,骨折线又在同一平面上,此种损伤多由直接暴
力所造成。(2分)②由于骨折有角,且重叠较明显,对
此,在整复时患者取平仰位,患肢肩外展 90°,屈肘 90°,
前臂取中立位。先由两助手作上下对抗牵引,以纠正骨
折成角畸形和重叠畸形,若因骨折重叠严重,不能被牵
引所完全得到纠正时,可加用折顶手法予以纠正,使骨
折得到复位。为防止两骨靠拢,在整复时可合用分骨手
法。(5分)

6.2 答:①诊断为胸部陈伤(或答宿伤)(1分)②病机,
胸部挫伤,经脉受损,血溢脉外,致瘀血停滞,气机运行
受阻,不通则痛。因治疗未彻底,瘀血散而未尽,气机未
畅,故见隐痛,近日因劳累又外受风寒,使旧伤复作,故
疼痛加剧。舌淡红,脉细涩,为正虚瘀血未尽之象。(3
分)③辨证论治:

外治:敷贴、万应膏、狗皮膏(1分)

内治:益气养血、化瘀止痛,佐以疏风散寒(1分)

方药:八珍汤合柴胡疏肝散加羌活、防风等,或八

珍汤合三棱和伤汤。(1分) All rights reserved. http://www.cnki.net