DOI:10.13288/j.11-2166/r.2006.02.013

2 带状疱疹

王某某,男,80岁。腹部有簇状红疹水疱,有的已溃破,呈带状排列。患者自诉灼痛,症属带状疱疹。用青黛10g,冰片2g研末,香油调匀涂于患处,溃破处直接撒入药粉。每日涂药1次,1日即痛止,3日结痂。继用药3日而愈。

3 脓疱疮

刘某某,男7岁。患者面部上肢暴露处有多个豆状水疱,水疱内有混浊的脓性液,疱周围发红,诊为脓疱疮。用青黛10g,冰片1g,用凡士林调成膏,涂于患处,每日2次,连用3日而愈。

青黛治疗口角炎及口唇炎

河北省迁西县医院(064300)

周桂英 蒋保川

我们曾用青黛,滑石治疗口角炎、口唇炎有效。自拟名为青滑散。

口角炎、口唇炎是指口角区发生的炎症,虽其病因复杂多样,但临床基本表现为充血、干裂、糜烂、渗出等损害,病变多为双侧对称,可向口内及口外黏膜,皮肤蔓延发展引起口角炎及口唇炎。

口角炎、口唇炎的原因较多,可为局部性,亦可为全身因素所导致,主要有细菌、白色念珠菌、梅毒螺旋体的局部感染,营养不良及维生素缺乏,经常流涎及有舔口角习惯等。食物中的添加剂、调味剂、防腐剂、保鲜剂、催熟剂、着色剂等化学制剂亦可引起。

本病好发于儿童,上下唇联合处潮湿发红,局部可有浸泡状湿白区,易发生糜烂,皲裂,渗出,结痂及继发感染,张口时痂易破裂出血而出现疼痛及痛痒,病变可于3周内愈合,但若处理不当或病因未去除则可长久不愈或反复发作。

方法:青黛10g,滑石10g,温开水冲服,每日3次。儿童用量:青黛6g,滑石6g,温开水冲服,每日3次。外用:青黛3g,滑石3g,香油或醋调合,睡前外搽。

无痛疗疮话青黛

河南省鹤壁矿务局第二职工医院(458010)

李国臣 刘相富 乔新生

以青黛为主制成的青黛散,治疗口腔溃疡,疗效优于市售之冰硼散。因其局部外用无疼痛、无刺激,尤其适用于小儿。

青黛散是由青黛、五倍子、冰片按5∶3∶1的比例研极细末而成。应用时可外吹于口疮的局部,或香油调敷外涂之,每日3~5次。临床应用数百例,初发者有效率约90%,复发者约80%,疗程3~10天。

疗效分析:方中青黛能内解血分之毒、外清气分之热,且杀虫抑菌为君;伍五倍子之燥湿敛疮为臣;佐冰片之辛凉散邪为使。共奏清热解毒、收口敛疮之功,药证相符,疗效自然确切。对于复发型口腔溃疡者,可联合黄连素(或穿心莲)、补中益气丸(或六味地黄丸)内服,内外结合,标本兼治,以增加疗效,且避免复发。

以青黛为主的外用药配制及应用

江苏省江都市工贸公司医务室(225200)

张学华 张 群

青黛为爵床科植物马蓝、木蓝等叶中干燥色素制成品。有清热解毒,凉血消炎之功。我们临床多以青黛为主配合的外用药,收效颇捷。列述如下。

1 青黛2g,芦荟6g,共研极细末。此方乃仪征已故名中医孙谨臣家传秘方。功效:消炎解毒、止血定痛。主治:牙疳、慢性牙龈炎。如曾治某患者,右下牙龈红肿溃破月余,稀脓血水不止,疼痛难忍,昼夜不宁,饥不能食。前医用抗生素口服及静脉滴注数日无效,经介绍来余处诊治。遂将药粉搽敷患处,药与疡面凝固如胶,稀脓血水即止,当日疼痛见轻,可进食稀粥。前后用药5天,肿消痛止。也可用于拔牙后出血不止,亦可收到止血消炎之效。

2 我们曾目睹吾师治疗病毒性腮腺炎,以上品徽墨研少许麝香磨汁,外涂腮颊肿痛处,收效甚佳。而今之时,麝香为稀有贵重之品,很难广泛应用于临床。故用清热解毒之青黛代之。以青黛3g,冰片0.5g,共研细末,用鸡蛋清适量调匀,外敷患处。敷药与肿痛处胶固如漆,可使药性在局部缓慢吸收。多数患儿1天后肿痛明显减轻,1~2天后可如法再用。有清热解毒,消炎散结之功。

3 慢性口腔溃疡反复发作,局部灼痛,新肌不生,疮面凹陷,经久难愈。以青黛6g,珍珠粉30g,冰片1g,共研极细末。将药粉吹敷疮面,一般用药2~3天疼痛见轻,继续吹敷数日,疮面新肌组织始生,疮面渐平,病可痊愈。可收消炎解毒,祛腐生新之效。

4 青黛15g,枯矾30g,滑石30g,石膏30g,黄柏10g,共研细末。功效:消炎解毒,祛湿收敛。适应症:水泡疮。以麻油适量将药粉调成糊状,外敷患处。用时将患处常规消毒,用消毒针头将水泡刺破挤瘪,然后搽敷。临床应用此方20余年,多在3天左右可愈。溃后感染,脓水不止者,7日左右可结痂。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net