DOI:10.13288/j.11-2166/r.2006.02.015

2 带状疱疹

王某某，男，80岁。腹部有簇状红疹水疱，有的已溃破，呈带状排列。患者自诉灼痛，症属带状疱疹。用青黛10g，冰片2g研末，香油调匀涂于患处，溃破处直接撒入药粉。每日涂药1次，1日即痛止，3日结痂。继用药3日而愈。

3 脓疱疮

刘某某，男7岁。患者面部上肢暴露处有多个豆状水疱，水疱内有混浊的脓性液，疱周围发红，诊为脓疱疮。用青黛10g，冰片1g，用凡士林调成膏，涂于患处，每日2次，连用3日而愈。

青黛治疗口角炎及口唇炎

河北省迁西县医院(064300)

周桂英　蒋保川

我们曾用青黛，滑石治疗口角炎、口唇炎有效。自拟名为青滑散。

口角炎、口唇炎是指口角区发生的炎症，虽其病因复杂多样，但临床基本表现为充血、干裂、糜烂、渗出等损害，病变多为双侧对称，可向口内及口外黏膜，皮肤蔓延发展引起口角炎及口唇炎。

口角炎、口唇炎的原因较多，可为局部性，亦可为全身因素所导致，主要有细菌、白色念珠菌、梅毒螺旋体的局部感染，营养不良及维生素缺乏，经常流涎及有舔口角习惯等。食物中的添加剂、调味剂、防腐剂、保鲜剂、催熟剂、着色剂等化学制剂亦可引起。

本病好发于儿童，上下唇联合处潮湿发红，局部可有浸泡状湿白区，易发生糜烂，皲裂，渗出，结痂及继发感染，张口时痂易破裂出血而出现疼痛及痛痒，病变可于3周内愈合，但若处理不当或病因未去除则可长久不愈或反复发作。

方法：青黛10g，滑石10g，温开水冲服，每日3次。儿童用量：青黛6g，滑石6g，温开水冲服，每日3次。外用：青黛3g，滑石3g，香油或醋调合，睡前外搽。

无痛疗疮话青黛

河南省鹤壁矿务局第二职工医院(458010)

李国臣　刘相富　乔新生

以青黛为主制成的青黛散，治疗口腔溃疡，疗效优于市售之冰硼散。因其局部外用无疼痛、无刺激，尤其适用于小儿。

青黛散是由青黛、五倍子、冰片按5∶3∶1的比例研极细末而成。应用时可外吹于口疮的局部，或香油调敷外涂之，每日3～5次。临床应用数百例，初发者有效率约90%，复发者约80%，疗程3～10天。

疗效分析：方中青黛能内解血分之毒、外清气分之热，且杀虫抑菌为君；伍五倍子之燥湿敛疮为臣；佐冰片之辛凉散邪为使。共奏清热解毒、收口敛疮之功，药证相符，疗效自然确切。对于复发型口腔溃疡者，可联合黄连素(或穿心莲)、补中益气丸(或六味地黄丸)内服，内外结合，标本兼治，以增加疗效，且避免复发。

以青黛为主的外用药配制及应用

江苏省江都市工贸公司医务室(225200)

张学华　张　群

青黛为爵床科植物马蓝、木蓝等叶中干燥色素制成品。有清热解毒，凉血消炎之功。我们临床多以青黛为主配合的外用药，收效颇捷。列述如下。

1 青黛2g，芦荟6g，共研极细末。此方乃仪征已故名中医孙谨臣家传秘方。功效：消炎解毒、止血定痛。主治：牙疳、慢性牙龈炎。如曾治某患者，右下牙龈红肿溃破月余，稀脓血水不止，疼痛难忍，昼夜不宁，饥不能食。前医用抗生素口服及静脉滴注数日无效，经介绍来余处诊治。遂将药粉搽敷患处，药与疡面凝固如胶，稀脓血水即止，当日疼痛见轻，可进食稀粥。前后用药5天，肿消痛止。也可用于拔牙后出血不止，亦可收到止血消炎之效。

2 我们曾目睹吾师治疗病毒性腮腺炎，以上品徽墨研少许麝香磨汁，外涂腮颊肿痛处，收效甚佳。而今之时，麝香为稀有贵重之品，很难广泛应用于临床。故用清热解毒之青黛代之。以青黛3g，冰片0.5g，共研细末，用鸡蛋清适量调匀，外敷患处。敷药与肿痛处胶固如漆，可使药性在局部缓慢吸收。多数患儿1天后肿痛明显减轻，1～2天后可如法再用。有清热解毒，消炎散结之功。

3 慢性口腔溃疡反复发作，局部灼痛，新肌不生，疮面凹陷，经久难愈。以青黛6g，珍珠粉30g，冰片1g，共研极细末。将药粉吹敷疮面，一般用药2～3天疼痛见轻，继续吹敷数日，疮面新肌组织始生，疮面渐平，病可痊愈。可收消炎解毒，祛腐生新之效。

4 青黛15g，枯矾30g，滑石30g，石膏30g，黄柏10g，共研细末。功效：消炎解毒，祛湿收敛。适应症：水泡疮。以麻油适量将药粉调成糊状，外敷患处。用时将患处常规消毒，用消毒针头将水泡刺破挤瘪，然后搽敷。临床应用此方20余年，多在3天左右可愈。溃后感染，脓水不止者，7日左右可结痂。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net