

平,气腥而窜,其走窜之性,无微不至。以治疗痈,放胆用之,立见功效。疔疮初起未成脓者,余恒用山甲、皂刺……,其已有脓而红肿者,服之红肿即消,脓亦易出。”

3 透脓方剂的功效和主治:《外科正宗》透脓散为疮疡托法代表方,功能托毒透脓,用治痈疽内脓已成,而不能速溃者,方中用皂角刺、穿山甲攻坚消肿,透脓外达。由于脓熟不溃多由正虚毒盛不能托毒外出所致,故合黄芪、当归、川芎以补气益血而扶助正气,托毒外出,以免毒邪内陷,正因本方是治痈疽肿毒脓成不溃,用之可以促使穿透,故名“透脓”。若痈疽内脓已成,毒邪炽盛,肿痛较甚,发热未溃者,可加清热解毒之银花、牛蒡等,如《心悟》透脓散。若元气虚弱而邪盛,脓毒不易外达,见疮形平塌、根脚散漫、难溃难腐之似溃未溃者,可补益气血与清热解毒并用,配以皂角刺。如《疡科准绳》冲和汤,《外科正宗》托里消毒散。若肿疡已脓,而毒盛正气未衰者,可用“透托法”,促其早日脓出毒泄,肿消痛减,以免脓毒旁窜深溃,如《外科全生集》代力散。

综上所述,穿山甲与皂角刺内服有消肿散结和托毒透脓之功,用于疮疡初起和脓熟不溃,不用于痈疽已溃,故本文指出二者功效为“透脓”,不为“排脓”之因。且《本草经疏》指出二者:“痈疽已溃不宜服”。但二者对疮疡已溃,脓出不畅可以外用。如《姚僧垣集验方》治疗病溃坏:“鲛鲤甲二十一片,烧研敷之。”

虽溃破疮疡不宜内服,但《本草衍义补遗》曰:“皂角刺治痈疽已溃,能引至溃处。”《本草汇言》曰:“皂荚刺已溃者能引之以行脓。”《医学入门》曰:“皂刺,已破者能引药达疮所。”说明前人皂角刺用于溃破疮疡,多属于引药达病的作用,也非主药,用量不大,与之透脓为目的有别。

皂角刺与穿山甲透脓有别。如《本草汇言》曰:“角刺治痘疹气滞,不能起顶灌脓者,功效最捷,而气虚者慎勿误用,恐透表过锐,反生虚泡也。若血滞不能起顶灌脓,又需鲛鲤,当非角刺所宜。”说明两者虽常相须共奏透脓之功,然使用也当气分血分之别。

透脓法不宜用之过早,肿疡初起未脓时勿用,如脓疡已成,毒盛正气不虚,尚未溃破之实证,只能“透托”,不可误用“补托”,否则,不但无益,反能滋长毒邪。遂犯“实实之戒”而加剧病情,故“透脓散”中黄芪一味药,凡湿热火毒炽盛之时,皆去而不用。

上海中医学院(200032) 戴龙瑞

畜鱼置介法在阿狄森氏病的运用

畜鱼置介法是喻嘉言在《寓意草》中所提出的一种治法,其云:“畜鱼千头者,必置介类鱼池中,不则其鱼

乘雷雨而冉冉腾散。”这实是补阳补阴两结合的方法,盖“鱼虽潜物,而其性乐于动”,属于阳;“介类沉重下伏”,属于阴。故置介类于鱼池之中,使阴阳既济,池水清沏静谧。作为治则,寓有补益阳气,又需资生阴分之意。即告诫我们不能猛用温补下元之法,必须滋养肾阴,从阴引阳。故采用本法之用药特点是:补阳之药,当温而不燥,勿伤其阴;滋阴之品,当含有潜阳之势,刚为柔制。由此可见,畜鱼置介法虽以温补下元为主,但不宜温燥,同时又要滋阴以扶阳,兼要潜镇虚阳,一法而寓三意,这是本法的内含特性。

阿狄森氏病则是慢性肾上腺皮质功能低下,临床以色素沉着、神疲无力为主要表现,常呈一派阳虚之证。但究其病因,系由于结核或自身免疫等因素所致,在我国和日本主要是结核造成肾上腺组织破坏,据统计,约占全部病例的68%。基于结核之特性,在中医中统称为癆病,故阿狄森氏病中医有称为“女劳疸”或“虚劳”者,所谓癆病,喻嘉言谓:“劳则必劳其精血也。”主要是耗伤其肾精而至出现一派虚损征象。即使是以阳虚为主要表象者,其实质已寓有阴虚之内涵,当癆疾明显者,其虚火内炽,更耗肝肾之阴,而可呈现肝肾阴虚,甚至典型的阴虚内热证,这是本病的病理特征。

基于畜鱼置介法之内含特性与阿狄森氏病的病理特征相吻,故余治疗阿狄森氏病时常采用喻氏畜鱼置介法之意。一是在阳药的选择上:本病临床上虽是以肾阳不足为其基本证型,从理论上而论,当以右归丸、桂附八味丸为代表方,但畜鱼置介法已告诫补肾之药不宜温燥,且《内经》有“肾恶燥”之戒,桂、附是当慎用,据笔者统计,自1956年以来以中医药治疗阿狄森氏病临床报道中的用药频度,其名列首位的药物是黄芪,其次是党参,而桂、附则列于20位之后,可见诸医家也明此意。余在择取阳药时,除参、芪之外,常喜用菟丝子、肉苁蓉,此二味都是补阳药,却又是“补阴兴阳”之品,诚如《本草正义》曰:“菟丝,唯此善滋阴液而又敷布阳和”;《本草求真》曰:“肉苁蓉力专滋阴,得此,阳随阴附而阳自见兴耳。”皆是滋柔而不温燥,阴阳两顾。二是滋阴药的选择:滋养肾阴既是从阴引阳之策,是为畜鱼置介法之本意,且与《难经》:“损其肾者补其精”之意相吻,也与本病系激素分泌不足,予以补充激素之本质雷同。余主取生地、枸杞二味,生地既是滋补肾阴之要药,“内专凉血滋阴,外润皮肤荣泽”(《本经逢原》),且戴元礼曰:“阴微阳盛,相火炽强,宜生地黄以滋阴退阳。”枸杞既能滋补肾阴、温润营血,又能“长肌肉,益颜色,肥健人。”有利于皮肤黧黑之色素减退;至于滋阴之介类药物选择,则余常取龟板、鳖甲,其滋补肾精,又具有潜

镇作用,可滋阴兼清其虚热,对有结核病灶、临床呈现阴虚内热证者更为合拍。

总之,阿狄森氏病虽以阳虚为主要见证,但治疗不能纯用温补元阳,应气阴两顾,尤宜以精气两补,补精以化气,举阴以兴阳,既可防大温大热温燥之剂耗津灼液,也可防纯用补精之药壅塞不化之弊,且其置介以潜阳,也合结核所致阴虚内热之病证,诚为“有是证,用是药”,药证相符。

上海市中医文献馆(200020) 潘文奎

针刺天突可缓解梗阻

食管癌是我国常见的恶性肿瘤,属祖国医学“噎膈”范畴。噎,是吞咽时梗噎不顺;膈,是胸膈阻塞,饮食不下。本病初期类似“梅核气”,应注意鉴别。诊治此病,应使患者解除顾虑,树立信心,增强战胜疾病的勇气;还可针刺天突穴,缓解梗阻,为进一步辨证施治,提供条件。有报道认为,针刺天突穴,可使食管蠕动增强,内腔直径增宽。如笔者治疗李×,男,76岁。1988年5月25日初诊。患者诉吞咽困难一年余。开始仅觉吞咽不适,后吞咽时胸骨后闷胀、微痛,逐渐加重。近来日渐消瘦,有时吐出食物伴泡沫状粘液,面色白,水饮难下。舌红少津,有青紫斑无苔,脉弦涩。经某医院食管钡餐造影,诊为晚期食管癌。辨证为痰气互结,瘀血内阻,阴阳俱衰。治宜化痰软坚,破瘀顺气,兼扶正气。处方:浙贝15g,胆星10g,白花蛇舌草25g,桃仁10g,红花10g,柴胡10g,桔梗10g,枳壳10g,北沙参15g,麦冬15g,党参20g,炙黄芪30g。3剂,水煎服。因患者水饮难下,先针刺天突穴。针后自觉梗阻缓解,饮水通畅,当晚吃9个饺子。该患者共针刺5次,后家属放弃治疗,存活6月余。又如江××,男,65岁。1985年9月10日初诊。患者吞咽困难10月余。始觉咽部不适,后吞咽困难逐渐加重,不能进干食,现饮流食亦觉困难,有时吐食物伴泡沫状粘液。大便硬。形体消瘦,舌红苔光剥,脉象弦细。经某县医院食管钡餐造影,诊为食管癌(上段)晚期。当即针刺天突穴,针后自觉梗阻缓解,自饮稀面疙瘩汤,顺利下咽。次日患者告晨饮稀面汤不觉梗噎,中午吃疙瘩汤,咽下顺利,晚吃面条亦无梗阻。该患者又存活3月余。

北京红十字朝阳医院中医科(100020) 梁安荣

固冲汤加减治老年崩漏

月经量多,势急如山之崩称崩中;血量不多,而淋漓不断如屋之漏,称漏下。崩和漏的病因病机相似,症状又可互相转化,所谓“崩为漏之甚,漏为崩之所”,故

临床上常崩漏并称。崩漏的病因是多方面的,正如清·吴谦等编《医宗金鉴·妇科心法要诀》所述:“淋漓不断名为漏,忽然大下谓之崩,紫黑块痛多属热,日久行多损冲任。脾虚不摄中气陷,暴怒伤肝血妄行,临证审因须细辨,虚补瘀消热用清”。

子宫非时出血,周期提前,经期延长,经血量多,常见于功能性子宫出血,子宫内膜异位症等。其因一是由于冲任二脉损伤,脾胃之气不足,不能制约血海;其二是血海伏热,血热妄行;其三是情志不舒暴怒伤肝或气滞致使血不归经,经乱无期。

崩与漏在临证时须审因辨证,本若少时治肾,中年调肝,老年治脾的原则。但也不可拘泥。余在实践中用张锡纯的固冲汤加减治疗老年崩漏效果较满意,举例如下。

杨××,49岁,工人。病历号:150444。患者月经先期,经量多,行经期长,每次服安络血、维生素K,肌注止血敏方可止血。此次无效,来中医科诊治。患者面色发黄,头晕,气短懒言,倦怠乏力,纳少腹胀,牙龈出血,失眠多梦,经行7天不净,量多,色淡,大便不成形。脉细弱无力,舌体胖,有齿痕。证属脾气虚,血失统摄,治宜益脾固冲。方用固冲汤加减,炒白术10g,生黄芪60g,煅龙牡各30g,生杭芍12g,海螵蛸15g,茜草6g,棕榈炭10g,党参30g,大小蓟各15g,仙鹤草20g,血余炭10g,桑寄生12g。5剂,水煎服。二诊来述,服药3剂,经量减少,服完5剂,月经即净。后继服益脾汤调理。本方生黄芪、党参、煅龙牡、仙鹤草、大小蓟剂量要大,茜草量要小一些是本方之特点,欢迎同道临床验证。

北京天坛医院(北京100050) 胡文凤

· 征 文 ·

经中国民间疗法研究会决定,拟于1993年11月上旬在河南洛阳召开中国民间疗法研究会性医学组成立暨学术交流会议。现征稿如下:(1)中医、西医、中西医结合有关性医学的理论探讨、文献整理、诊疗动态、综述等;(2)治疗性病、性功能障碍的经验交流、短篇报道、新疗法、新器械的开发运用;中医秘、单、偏方的发掘与整理等;(3)性保健、性病预防、老年人性指导等。要求来稿未公开发表。临床论著、科研报告、文献述评在4000字左右,其它论文在2000字左右,均附500字摘要和作者小传(包括姓名、性别、年龄、履历、工作年限、专业职称、职务、社会兼职、学术专长与著述、科研成果等)。来稿经评审录用后将发给会议通知,优秀论文连同作者小传将编入《性医学临床精要》一书。每篇论文需交审稿费10元。

来稿请于1993年9月15日前寄至河南省洛阳第一拖拉机厂职工医院刘进录收,邮编471003。