

临床报道

稳心冲剂治疗气虚血瘀型
快速型心律失常临床研究

执笔:周玉萍* 张文军*

摘要 稳心冲剂治疗快速性心律失常,并与胺碘酮进行比较,近3年的临床与实验研究,稳心冲剂临床主症总有效率93.58%(248/265),各症状平均总有效率92.26%,心电图总有效率90.2%(239/265);胺碘酮临床总有效率88.0%,心电图总有效率84.0%(63/75)。经统计学处理,稳心冲剂优于胺碘酮($P<0.05$)。

主题词 心律失常/中医药疗法 气虚/中医药疗法

④ 稳心冲剂

心律失常是心脏病的常见症状之一,属中医学的“心悸”“怔忡”等症候范畴。据我院观察,其病机以气虚血瘀多见。近3年来我们采用稳心冲剂治疗心律失常并与胺碘酮进行对比,现总结如下:

1 临床资料

1.1 一般情况:稳心冲剂组观察265例,其中男136例,女129例;年龄13~77岁,平均56.5岁;病程1周~16年,平均6.5年。胺碘酮组75例,其中男36例,女39例;年龄20~68岁,平均52.6岁;病程3~12年,平均5.8年。

1.2 原发病情况:稳心冲剂组诊断为冠心病62例,风心病41例,心肌炎34例,高心病25例,肺心病15例,心肌病10例,先心病12例,植物神经紊乱13例,原因不明53例。胺碘酮组冠心病38例,风心病3例,心肌炎10例,高心病6例,心肌病4例,肺心病7例,原因不明7例。

1.3 心律失常分类与程度:表1示,两组患者心律失常的分类来看,主要分为室上性和室性

两类,均为快速性心律失常。

两组患者的一般情况、原发疾病及心律失常的分类及程度均相似,具有可比性。

表1 两组心律失常的分类及程度情况

分 类	稳心冲剂组(265例)			胺碘酮组(75例)		
	重度	中度	轻度	重度	中度	轻度
室上性						
房性结性早搏	20	20	5	10	9	
阵发性室上速	8	4	1	1	3	
阵发房颤房扑	9	8		2	1	
持续房颤房扑	19	12	6	1	3	
室性						
频发室性早搏	46	31	16	22	6	
早搏二三联律	21	16	6	8	4	
短阵室速	11	3	3	3		

1.4 辨证情况:参照1980年全国冠心病辨证论治研究座谈会标准(1985年修订标准)、1988年全国心痹诊断标准,两组患者均诊断为气虚血瘀、心脉不畅。主证见心悸气短,心跳间歇;次证见胸痛乏力,神疲自汗,面色苍白;舌体胖嫩有齿痕,舌质淡紫或淡暗,苔薄白为主,薄黄次之,脉疾数或结代。心电图检测均有各类心律失常。两组中医症候情况基本一致,具有相当可比性。

2 治疗及观察方法

两组患者经临床确诊后,住院病例休息3天,门诊病例观察3次,心律失常未见改善或仍恒定出现者,开始给药观察。稳心冲剂组予稳心冲剂(由党参、黄精、三七、琥珀粉等5味药组成),每次1包,每包9g,温开水冲服,一日3次,连服4周为一疗程。胺碘酮组给予胺碘酮,药物混于安慰剂制成的冲剂(9g冲剂含胺碘酮

* 中国中医研究院广安门医院,北京宣武区北线阁内(100053)

收稿日期:1993-02-12;修回日期:1993-04-21

0.2g)中。住院患者每日每次取坐位、卧位各做心脏示波5~10分钟,心脏听诊2~3分钟以判断心律失常严重程度及疗效。治疗前、中、后常规做心电图,部分病人做血流变心功能测定、血脂分析,拍胸片测心脏面积及有关生化检查,有条件单位做24小时动态心电图。

本文观察病例来自7个医院,有1/3以上是住院病例。本观察工作由专人负责。

3 疗效分析

3.1 心律失常疗效评定标准:参照全国中西医结合治疗冠心病心绞痛及心律失常座谈会(1979年,上海)、全国冠心病辨证论治研究座谈会(1980年,1985年修订)、全国心痹疗效标准(1988年)三个标准,制定以下心律失常疗效标准。

心电图疗效标准:显效:异位心搏数减少>75%;阵发或持续性房颤、房扑、室上速转为窦律;有效:异位心搏数减少>50%;阵发性室上速或房颤、房扑用药后发作频率,持续时间均较原来减少>50%,多发变偶发;无效:用药后无变化;加重:用药后过早搏动>50%,或房颤、房扑、阵发性室上速发作频率、时间>50%。

中医症状疗效评定标准:显效:症状消失改善>75%,心电图显效;有效:症状较前减少>5%,心电图有效;无效:症状无变化,心电图无改善;加重:症状较前加重,心电图亦加重。

表2 两组各类心律失常心电图疗效比较

分 类	稳心冲剂组(265例)				胺碘酮组(75例)		
	显效	有效	无效	加重	显效	有效	无效
室上性							
房性结性早搏	25	16	3	1	11	6	2
阵发性室上速	10	3			3		1
阵发房颤房扑	8	9			2		1
持续房颤房扑	13	17	6	1	1	2	1
室性							
频发室性早搏	40	43	9	1	12	15	3
早搏二三联律	16	22	5		3	6	3
短阵室速	6	11			1	1	1
合 计	118	121	23	3	33	30	12

3.2 两组心电图疗效比较:表2示,稳心冲剂组心电图总有效率为90.2%,胺碘酮组总有效

率为84.0%,前组疗效虽然稍高于后组,但两组疗效无明显差异($P>0.05$)。对每类心律失常做两组间疗效比较,均无显著差异($P>0.05$)。

3.3 两组症状疗效比较:表3示,稳心冲剂组4项主要症状的疗效,明显优于胺碘酮组($P<0.01$)。

表3 两组症状疗效比较

症 状	稳心冲剂组(265例)			胺碘酮组(75例)		
	显效	有效	无效	显效	有效	无效
心悸气短	161	87	17	27	39	9
心跳间歇	132	106	27	27	36	12
胸痛乏力	127	120	18	22	27	26
头晕汗出	136	109	20	20	26	29

3.4 对血液流变学、心功能等的影响:我们对稳心冲剂组30例治疗前后测定了血液流变学的各项指标,治疗后全血粘度(高切速)、血浆比粘度、红细胞压积、红细胞电泳时间、血沉均明显下降($P<0.05\sim 0.01$)。对稳心冲剂组30例治疗前后测定了心功能情况,治疗后每分搏出量、每搏量、射血分值、射血指数、小轴汇短率均明显增加(P 均 <0.01)。对两组房性早搏、室性早搏中部分患者测定了治疗前后心率的变化,结果示,稳心冲剂组房性早搏从治疗前平均92.12次/分降至74.62次/分,室性早搏从治疗前平均89.45次/分降至78.81次/分;胺碘酮组房性早搏从102.11次/分降至78.12次/分,室性早搏从98.18次/分降至78.37次/分。两组治疗后心率均有显著性下降。两组治疗前后血糖检测表明,中西治疗药物对血糖均无明显影响($P>0.05$)。

4 讨论

稳心冲剂立法为益气养阴,活血化瘀,复脉宁神。本病病位在心,临床表现虽有疾数及结代脉之不同,然病机均为气虚血瘀。党参、黄精益气养阴,三七粉、琥珀粉等药物活血利水、疏肝行气、复脉宁神,标本兼顾。7家医院用稳心冲剂治疗以气虚血瘀型为主症的快速性心律失常,临床心悸气短主症总有效率达93.58%

(248/265),各症状平均总有效率92.26%,心

心电图有效率达 90.2%，与西药胺碘酮进行临床对照观察，心悸气短主症总有效率为 88.0% (66/75)，各症状平均总有效率 74.7%，疗效满意。本方还有改善心功能、降低血粘度作用，对冠心病缺血劳损型的心电图有效率达 51.2%，除此之外，对收缩压、心率有降低减慢作用，但在正常范围。实验表明：稳心冲剂在毒理方面完全可靠、无毒副作用，临床数百例患者服用未发

现不良反应，其药效对各种造模心律失常有明显治疗作用。本药有活血化瘀的作用，能使正常小鼠系膜微血管明显扩张，并使红细胞电泳能力提高，使麻醉犬心肌收缩力提高，心脏的“泵”功能得以改善，降低心肌耗氧量，从而达到治疗的目的，质量标准、稳定性试验结论满意。稳心冲剂配方新颖，药少力专，服用方便、药价合理，在临床上具有推广应用的價值。

最新推出泰乐牌 TC 系列瘫痪、消炎止痛治疗机

不信疗效高 用后再付款 质量有问题 一年保更换

山东省乐陵市医疗器械厂是生产泰乐牌 TC 系列治疗机的专业厂，所生产的 TC 系列瘫痪治疗机和消炎止痛治疗机经山东中医学院附院、南京鼓楼医院、广西中医学院附院、长春中医学院附院、成都中医学院附院、四川省人民医院、陕西省人民医院、甘肃省中医院、西安医大一、二附院、北京军医总院、白求恩医大三院等全国几百家医院临床治疗 1885 例证明：对脑中风，脑外伤引起的偏瘫，单瘫，及综合后遗症；关节炎，肩周炎，各部位风湿痹痛，颈椎病，骨质增生，坐骨神经痛，软组织伤等治愈率高，总有效率达 95% 以上。TC 系列治疗机已在国际国内多次获奖。

其功能特点如下：

(1) 电脑自选多种波形 (2) 频率多变适应诸症 (3) 脉宽脉幅 随症选择 (4) 红外输出 勿调自控 (5) 独特磁场 立杆见影 (6) 秘方渗透 通络止痛 (7) 数字定时 一机两用 (8) 自动关机 音乐报停

销售与服务方式：

四保到底用户永无后顾之忧

- 1、一月内无效保退
- 2、一年内质量问题保换
- 3、三年内免费维修
- 4、使用壹万小时(5 年)可以旧折价换新

如赊销，只限全民县级以上的医疗单位，赊销期为三个月，此间仍按四保执行，个人恕不办理。

新一代 TC 系列治疗机价格如下：

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Ⅱ A 电子瘫痪治疗机 3600 元/台 | Ⅱ B 电子瘫痪治疗机 4800 元/台 |
| Ⅱ A ₂ 电脑瘫痪治疗机 6800 元/台 | 920A 电脑前列腺治疗机 6800 元/台 |
| QB 电子消炎止痛治疗机 3400 元/台 | QC 电子消炎止痛治疗机 4600 元/台 |
| QD 电脑消炎止痛治疗机 6700 元/台 | 930B 电脑前列腺治疗机 7800 元/台 |

山东省乐陵市医疗器械厂

法人代表：陈忠杰 业务联系人：张洪霞 张荣华

厂址：山东省乐陵市兴华路 8 号 电话：(05445)741082 电挂：5665 邮政编码：253600

开户银行：乐陵市中国银行 帐号：810062

ABSTRACTS OF ORIGINAL ARTICLES

Clinical Observation on Tachy — Cardiac Arrhythmia of Deficient Qi and Stagnant — Blood Type Treated by WenXin (Heart Stabilized) Powder.

Zhou Yuping, Zhang Wenjun

Contrast clinical and laboratory studies were made between the therapeutic effect of Wenxin Powder and on tachycardiac arrhythmia in the last 3 years. The total effective rate of Yinxin Powder on main symptoms was 93.58% (248/265) and the average total effective rate for all symptoms and ECG were 92.26% and 90.2% (239/265) respectively. For Amiodaronum the total effective rate for clinical symptoms and ECG were 88.0% and 84.0% (63/75) respectively. Statistical Treatment of the above results revealed, that the Wenxin Powder is better than Amiodaronum.

Authors' Address: Guanganmen Hospital, China Academy of TCM, Beijing, 100053.

Key Words: cardiac arrhythmia/TCM therapy deficiency of Qi/TCM therapy @ Wenxin Powder

(Original article on page 476)

Experimental and Clinical Studies on Carcinoma of Colon Treated by Changliuping.

Guo Yong, Pang Dexiang.

Thirty one cases of colon carcinoma were treated with Changliuping, combined with surgical operation and chemotherapy. The survival rates of 1, 3, and 5 years 100%, 81.25% and 65.0% respectively. Results showed that this decoction is capable of improving the physical condition, lowering the level of CEA, with certain adjusting action on immunity, while experiments proved that the decoction yields marked inhibition on S_{180} , Lewis and EAC, on spontaneous metastasis and marked elevation of cytoimmunity in tumor bearing mice.

Author's Address: Affiliated Hospital, Zhejiang College of TCM, Hangzhou, Zhejiang 310006

Key Words: tumor of intestine/TCM therapy

(Original article on page 481)

Contrast Observation on Acute Attack of Chronic Cholecystitis treated by Traditional Chinese Medicine and Western Medicine.

Zhang Zongming, Chen Huaizhen, Liu Huaizhen

In our group, there were 104 cases of chronic cholecystitis treated with traditional decoctions and compar-

ison was made with another group of 100 cases treated with western medicine. Results showed that both groups revealed similar therapeutic results, only the time needed for the mitigation of abdominal pain in the former was much shorter than the latter.

Authors' Address: Affiliated Hospital, Anhui College of TCM, Hefei, Anhui 230031

Key Words: Cholecystitis/integrated traditional Chinese with western medicine chronic disease

(Original article on page 484)

Vocal Nodules and Vocal Polyps Treated with Xiaojie Kaiyin Powder and Its Influence on Hemorheology.

Zheng Changxiong, Xin Yaojie, Zhang Jianhua, et al.

One hundred cases of vocal nodules and vocal polyps were treated with the Powder with an effective rate of 36%, mitigated rate of 27%, the total effective rate being 63%. The effective rate was related to the TCM typing of syndromes, types, sizes and colors of vocal polyps and has nothing to do with the locations of the lesion. After 3 months of treatment, the abnormal hemorheological changes in vocal nodules and sessile vocal polyps were markedly improved.

Authors' Address: Shuguang Hospital, Shanghai College of TCM, Shanghai 200021

Key Words: polyps /TCM therapy vocal cord

(Original article on page 486)

Clinical Observation on Local Application of Honey on Wounds and Burn Wounds.

Liang Quan, Chen Tuxiao, Chen Chunzhi, et al.

1363 cases of wounds and burn wounds were treated with topical application of bee honey with an average therapeutic course of 14.5 days, the total effective rate being 97.5%. When comparison made with 635 cases treated by antibiotics, the results were significantly different. Observations revealed that bee honey possesses the actions of nourishing the wounds, antiinflammation, antimicrobe, absorption and decrease of exudation, improvement of healing.

Authors' Address: Affiliated Hospital, Changzhi Medical College, Changzhi, Shanxi, 046000

Key Words: Wounds and trauma/TCM therapy burns/TCM therapy honey/therapeutic application

(Original article on page 489)