

珠矾散治疗下肢溃疡 50 例临床观察

赵明利¹ 郭润田² 吴刚¹

主题词 腿溃疡/中医药疗法 @ 珠矾散

下肢溃疡俗称“老烂腿”，往往缠绵难愈。用常规西医换药法常无良效，且易复发。文献中的中药方法虽多，但多含汞、砷等有毒物质，且配制复杂，药品繁多，难于推广，此类患者深以为忧。本院采用自拟珠矾散粉剂为主，自 1990 年 10 月至 1991 年 10 月，共治疗下肢各类溃疡 50 例，取得满意疗效，现报道如下：

1 临床资料

共治疗各种溃疡 50 例，溃疡面 60 处，其中门诊治疗 16 例，住院治疗 34 例；男性 31 例，女性 19 例；最大年龄 85 岁，最小 18 岁，平均 60 岁，30 岁以下的 2 例，30~50 岁 15 例，50 岁以上 33 例。有合并症者 16 例，其中糖尿病 7 例，湿疹 5 例，高血压病 4 例。致疮原因：大隐静脉曲张 32 例，深静脉回流障碍 9 例，外伤 7 例，切口感染 2 例。病程最长 50 年，最短 10 天。疮面最小 1cm×1cm，最大 20cm×10cm；疮面 2cm×2cm 以上者 36 处，占总疮面的 60%。生于内踝者 19 例，外踝者 16 例，胫前 13 例，腋窝 1 例，上臂 1 例。一般疮面皮肤发黑，变硬，色素沉着，疮中下陷，肉芽暗淡灰白，溢流污水，有的伴有可凹性水肿。

2 珠矾散组成与治疗方法

珠矾散组成：三七 20g，枯矾 10g，冰片 10g，珍珠 10g，按比例混合过 200 目筛，装瓶备用。应用方法：常规酒精消毒溃疡四周皮肤，生理盐水清洁疮面，再以干棉球拭净。将“珠矾散”洒敷伤口之上，根据疮面大小决定用药多少，一般 2~4g/cm²，药粉不宜过厚，以遮盖为度，忌用敷料包扎。用药初期使腐物脱落，分泌

物渐增，待有新生肉芽，则可见一层药痂覆盖疮口，故勿需包扎；下次换药时，去掉药痂，清洗疮口，换敷新药即可，1~2 次/日。对有合并症者，配合清热解毒、活血化瘀、通络利湿之品内服，如银花、连翘、蒲公英、地丁草、赤芍、丹皮、赤苓皮、泽泻等，7~10 剂。适应症：(1)下肢静脉曲张或血栓性深静脉炎所致的下肢皮肤溃疡；(2)非特异性感染之皮肤溃疡；(3)浅而小面积褥疮。禁忌症：(1)有较深窦道，瘰管合并的皮肤溃疡；(2)特异性感染的溃疡，如气性坏疽，破伤风杆菌感染的伤口，神经性溃疡，放射性溃疡，疮口急性感染时期。

3 疗效标准和治疗结果

以疮面完全愈合，临床症状消失，为痊愈；以疮面缩小 50% 以上，临床症状基本消失，为好转。愈合时间最长 87 天，最短 5 天，平均 28 天。痊愈 48 例，好转 2 例，总有效率 100%，治愈率 96%。

4 典型病例

赵××，男，65 岁，病历号 12557，1991 年 1 月 7 日初诊。双小腿破溃 8 年，经多家医院治疗无效。既往有双下肢血栓性深静脉炎病史 9 年。检查：双小腿下 1/2 内侧有多处溃疡，最大为 10cm×8cm，深 0.5cm，疮面暗红，有较多黄色渗出液。溃疡周围皮肤表浅糜烂，双小腿呈可凹性浮肿。舌紫，苔黄，脉滑数。化验：血白细胞 7600/mm³，中性 86%，尿糖(一)。分泌物培养：金黄色葡萄球菌。辨证：湿热下注，毒热阻络。

入院后，局部外用珠矾散，并内服银花 30g，连翘 20g，蒲公英 15g，地丁草 15g，赤苓皮 15g，泽泻 15g，木通 10g，车前子 10g，赤芍 12g，丹皮 12g，川芎 12g，鸡血藤 20g，14 剂。16 天后，溃疡大部分愈合，下肢浮肿已消；20 天后，右下肢已痊愈，左下肢仅留 1.5cm×1cm 和 1.3cm×1cm 溃疡各一块，并已结痂；治疗 38 天

1 北京宣武中医院，北京宣武区万明路 8 号(100050)

2 北京宣武区卫生学校

收稿日期：1993-04-14；修回日期：1992-05-31

后全部愈合。

5 体会

一般认为, 瘰疬生于外腠者, 为三阳经湿热, 易治; 生于内腠者为三阴经湿热, 难治。作者认为: 不论是内 或外, 发病机理是一致的, 主要因为血瘀阻络, 气血循环障碍, 湿浊气瘀交阻多患此病。本组所用珠珀散中的三七, 性味甘温, 微苦, 有活血化瘀, 止血不留瘀的作用, 外用能止血, 定痛。珍珠性味甘咸寒, 有收敛生肌之

功效。枯矾性味酸寒, 无毒, 有清热解毒, 止血燥湿等功能, 可托里排脓, 生肌止痛。《本草》曰: “枯矾有食恶肉, 生好肉之功能”。冰片辛苦微寒, 外用有清热止痛, 防腐止痒之功。诸药混合, 能清热解毒, 活血化瘀, 去腐生肌, 消肿止痛等功能, 对经久不愈的溃疡, 疗效显著, 且无毒副作用。本组病例皆因多方治疗无效而改用本法, 实际已有自身对照。由于本法具有操作简单、用药少、成本低等优点, 值得推广运用。

三分三治疗发作期哮喘 60 例

张家荣* 胡锦泉*

笔者用三分三偶然治疗发作期哮喘 1 例, 取得疗效, 连续观察 60 例, 近期疗效满意, 现报告如下。

1 一般资料

60 例中 40 例系家庭病床, 20 例门诊病人。男 38 例, 女 22 例。年龄 7~87 岁, 其中 7~20 岁 6 例, 21~45 岁 23 例; 46 岁以上 31 例。病史最长 30 余年, 最短 3 年余, 平均 11 年。伴慢性气管炎 42 例, 肺气肿 34 例, 肺心病 18 例, 肺大泡 2 例, 支气管扩张 5 例, 肺不张 3 例, 高血压心脏病 4 例, 冠心病 7 例, 心衰 5 例。感染型哮喘 11 例, 过敏型 28 例, 混合型 18 例。

2 治疗方法

采用云南大理生产的三分三 (*Scopolia acutangula* C. Y. Wu etc Chen) 为主, 用食用白酒或黄酒加少量冰糖、甘草密封浸泡两周即可, 剂量以每 10ml 药酒含三分三 0.2g; 或者将三分三研为细粉装胶囊, 每粒含生药 0.1g, 成人剂量每次 0.2g, 每日 2 次, 儿童剂量减半。10 天为一疗程, 症状控制后剂量减半酌情维持一段时间。合并感染, 发热 (T39℃ 以上), 白细胞在 $10 \times 10^9/L$ 以上者, 给抗生素及中药对症治疗。

3 治疗结果

服药后 5 至 30 分钟症状完全缓解, 评为显效者 44 例 (73.3%); 30 分钟至 1 小时症状明显减轻, 评为有效者 11 例 (18.3%); 服药后 1 小时以上症状无减轻或服药后副作用较大不能够接受治疗, 评为无效者 5 例 (8.3%)。总有效率为 91.7%。5 例无效病例均诉服药后口

干难忍, 其中 2 例还感小便不畅, 3 例出现少腹隐痛, 2 例做精细工作时视物模糊, 1 例感心悸。有效病例中一般均治疗 2~3 个疗程, 服药时间最长者达半年之久, 仅微有口干, 未见毒副作用, 部分患者作肝肾功能检查均未发现异常。

4 讨论

三分三, 又名大搜山虎、山野烟、山茄子, 为茄科植物三分三的根。《中医大辞典·中药分册》记载: “产云南, 辛、苦、温, 有大毒。麻醉、止痛、解痉”。民间草医用其治疗咳嗽、哮喘、风湿关节痛、跌打损伤、骨折、疮疡肿毒。笔者根据民间治哮喘经验, 分别观察支气管哮喘以及慢性肺原性心脏病、高血压性心脏病、冠心病等哮喘、呼吸困难, 结果发现本品确实有良好的平喘止咳化痰, 缓解呼吸困难之功效。

三分三属毒麻药品, 毒性较大, 很少内服, 故内服时, 剂量需严格控制。我们的经验是, 成人体重在 50kg 左右, 每次 0.2g, 每日 2 次。体重每增加或者减少 15kg, 剂量相应增加或者减少 0.1g。另外还需根据病人的体质, 体质好的剂量可稍大一点, 体质差者, 剂量略小一些。有一患者, 曾用本品日用量达 1.8g, 也未出现明显的心悸、视物不清等症状。但有少数人仅用 0.3g, 即出现心悸、排尿不畅、少腹隐痛、视物不清等副作用, 这可能与患者的体质与耐受性有关。三分三云南有几个品系, 应用时应注意, 从小剂量开始, 逐渐增加, 以免发生中毒。本品内服后, 多数患者都有轻重不一的口干症状, 较重者, 用白茅根适量煎水服, 有一定的缓解作用。三分三治疗发作期哮喘, 经我们临床观察, 疗效是肯定的。由于有一定的毒副作用, 需有待进一步研究。

* 云南昆明市延安医院, 云南昆明 (650051)

收稿日期: 1992-01-27; 修回日期: 1992-08-19