DOI:10.13288/j.11-2166/r.1994.10.033

常需采用多途径的综合治疗，目前最常用的方法有：(1)局部药物外敷，如中国中医研究院广安门医院肿瘤科段凤舞主任研制的肝外一号，上海刘嘉湘氏研制的蟾酥膏。(2)肝区涂搽止痛，如冰片酊外搽、冰蟾止痛膏外搽。(3)穴位注射止痛，如核葵注射液注射期门、足三里穴。(4)针刺止痛，多选用肝俞、胆俞、期门、合谷、太冲等，或选用肝癌敏感点。

原发性肝癌发病急，病程短，进展快，疼痛剧烈，单纯使用中医药止痛尚无法完全使疼痛彻底缓解，因此治疗肝癌疼痛多采用中西医结合，必要时酌情使用较强的麻醉止痛药，以便改善症状，减轻痛苦。

骨转移瘤疼痛的治疗

黄智芬

广西医科大学附属肿瘤医院(南宁 530027)

林苏

无锡市中医医院(江苏 214001)

骨转移瘤是指原发于某器官的癌和肉瘤，通过血行转移到骨，继续生长的肿瘤。骨转移意味着疾病的晚期，多有轻重不同的疼痛，预后很差，积极治疗可以减轻病人痛苦，延长生存期，提高生存质量。包括解除或减轻70%癌症患者的疼痛，是中医辅助治疗骨转移瘤的疗法之一。

骨转移瘤的中医药治疗目前成熟的经验不多。我们受骨病从肾治的启发，用辨证与辨病相结合，从温肾阳、滋肾阴、补肾壮阳的药物治疗骨转移瘤患者，特别是在止痛方面确实收到不同程度的效果。

肾阳亏虚、寒凝阻滞型，治宜温阳补肾，散寒通滞法，常用阳和汤加减。肾阴亏虚、火毒内蕴型，治宜滋阴补肾，降火解毒法，常用知柏八味丸加减。气血不足，阴阳俱虚型，治宜益气补血，阴阳双补法，常用十全大补汤加减。气血瘀滞，毒热蕴结型，治宜活血祛瘀，解毒散结法，常用身痛逐瘀汤加减。实践证明，在4法中选加补骨脂、骨碎补、淫羊藿、川断、巴戟、菟丝子、苁蓉、狗脊等药，效果较好。

骨转移瘤属于全身性疾病的局部表现，应用补肾药物有助于对疼痛的控制。同时，在辨证论治中若要提高止痛中药疗效，应注意用药的定性与定位相结合，才能得事半功倍的效果。行气活血止痛用三七、当归、乳香、没药、郁金、川芎、王不留行、香附；散寒祛风止痛用附子、藁本、防风、白芷、细辛、桂枝；祛湿通络止痛用羌活、独活、秦艽、全蝎、威灵仙、蜈蚣；颈项痛用葛根、羌活；肩臂痛用桑枝、姜黄；上肢痛用羌活、桑枝；下肢痛用独活、秦艽；胸痛用瓜蒌、枳壳、檀香；肋痛用川楝子、郁金；背脊痛用桂枝、狗脊、威灵仙；腰痛用牛膝、川断；尾骶痛用牛膝、马钱子。我们认为，恶性肿瘤在术后或化、放疗后，作为预防转移应首先选用六味地黄丸，这是对骨转移瘤的预防较理想的药物之一。

河蟹为主治疗癌症疼痛

郭岳峰 杨振江

河南省中医药研究院(郑州 450000)

目前癌痛的治疗主要为两方面，一为辨证论治，一为固定单、验方治疗。根据癌痛的病因病机，我们深入挖掘民间验方，经过长期摸索，以河蟹(中华绒螯蟹)为主研制成“癌痛消”(胶囊)用于治疗癌症疼痛，取得了较为满意的疗效。经临床系统观察56例，止痛效果肯定，起效迅速，作用时间长。一般30分钟即见明显的止痛效应，止痛时间可持续6～10小时，无毒副作用，长期服用无成瘾性。同时又有一定程度的抑癌作用，对有些靠西药麻醉镇痛剂止痛的患者，可以起到替代作用，在一定程度上缓解疼痛。

河蟹性味咸寒，入心肝肾胃经，功能清热散血、续绝伤及止痛的作用，主治跌打损伤、筋断骨折、瘀血肿痛。民间用其治疗各种原因所致的骨关节疼痛，我们取其清热散血、化瘀止痛之功，配以威灵仙、血竭、乳香、没药活血散瘀止痛，元胡、乌药理气止痛、首乌、白芍、木瓜缓急止痛。诸药合用，因而具有较好的止痛效果。

钮思源同志逝世

中国共产党的优秀党员，中国中医药学会理事、全国中医编辑学会副主任委员，原中医杂志社社长兼副总编辑钮思源同志，因病医治无效，于1994年9月8日在北京逝世，享年68岁。

30多年来，他为在中医药界影响最大的期刊《中医杂志》殚精竭虑，为提高杂志社的经济效益竭心尽力，为与国外合作出版中医杂志日文版、意大利文版、西班牙文版等做出了突出的贡献。钮思源同志的一生是为振兴、发展党的中医事业辛勤耕耘的一生，是全心全意为人民服务的一生，他的逝世，使中医杂志社失去了一位老专家、老编辑，我们为此感到万分悲痛，他忘我、无私的革命精神和优秀、崇高的品德，将永远深刻地铭记在我们心中。

钮思源同志安息吧。

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net