

治疗老龄皮肤癌 19 例临床观察

刘 申* 刘心吾** 胡宝华*

主题词 皮肤肿瘤/中医药疗法

应用三品一条枪(下简称“三品”)对浸润较浅的无淋巴转移或无骨质破坏的皮肤癌疗效肯定。然而对面积大,时间较长,浸润较深或已有骨质破坏者,疗效并不理想。对此,我们除应用三品(粉剂或锭剂)为主药外,根据局部情况适当换用红升丹和艾灸疗法,并参合体质和癌灶色泽,质地,脓液的不同情况,辨证施用中药内服,使疗效显著提高。

1 临床资料

19 例中,男 11 例,女 8 例;年龄最大 84 岁,最小 60 岁;病程最长 25 年,最短 10 年;鳞状上皮癌 12 例,基底细胞癌 7 例;癌生于头顶部 6 例,颧颜部 9 例,上、下肢、阴茎、乳房各 1 例;淋巴转移 1 例,全部病例均为浸润较深,溃烂面大(2~4cm×2~4cm),骨质破坏明显 1 例,合并有心、肝、肾疾患、或高血压者 10 例。

2 药物及治法

2.1 药物组成:白砒、明矾、雄黄、生乳香,比例为 1:2:0.2:0.1。制法:先将砒、矾二味,共研细入罐内,加炭火煨红,至青烟尽,白烟叠起,上下红彻住火,入后二味共研细粉,即三品粉。若以厚糊搓成条状,阴干,即三品锭。

2.2 红升丹。采用烧杯将汞溶解在硝酸中,得到硝酸汞。硝酸汞缓慢加热分解成红色的氧化汞,即红升丹的主要成分。注意稳定性极差的硝酸汞加热易还原成汞,外用易发生汞中毒。

2.3 黑膏药又称万应膏。主要成分有当归、穿山甲、白芷、广丹等 19 味中药。制法:将广丹以外的中药浸芝麻油,于铁锅内文火熬至药枯,去

渣加入适量广丹即成,薄纸摊贴备用。

治法:视局部情况或用三品粉适量撒于癌灶表面。或用锥切疗法将三品锭放入癌灶内部,外贴黑膏药,每 2~4 天换药 1 次。若局部感染严重或脓液清稀者,或癌灶脱落缓慢者,改用红升丹细末外撒 2~3 次,坏死组织脱落或液化明显加快后,再改用三品。若癌灶周围组织色黯淡,皮肤发凉,脓少质稀者,除应用红升丹外,局部配合艾灸,至局部发热为止,每日 1 次,一般 3~5 次可使皮肤变红润发温,之后改用三品。若体质弱,癌灶边缘组织僵硬、色黯、脓少者,加服人参养荣汤或香贝养荣汤(组成:白术、人参、茯苓、陈皮、熟地、川芎、当归、贝母、香附、白芍、桔梗、甘草等),除能改善全身症状外,还能明显增强三品的祛腐能力。

3 治疗结果

全部病例首次治疗均有明显效果,其中 1 例用药 2 次,使 25 年的鳞状上皮癌组织全部脱落;用药少于 10 次达到痊愈者 2 例;用药 10~20 次,疗程在 2 个月左右痊愈者 3 例;因其他原因中断治疗者 4 例;用药 20 次以上,疗程在 3 个月以上者 9 例。19 例中接受过红升丹和艾灸治疗者 16 例,14 例配合服中药。皮肤愈合者 11 例,癌灶明显缩小,而未达愈合者 8 例,其中 4 例为中断治疗患者。

4 病案举例

赵××,女,83 岁。前额右侧皮肤溃烂增生 12 年,体积约 30mm×30mm×10mm 大小,常溃烂流脓血,气味臭秽,久治不愈。拟诊,皮肤癌,本院病理切片报告为基底细胞癌,用三品粉外撒,黑膏药外贴治疗,初期疗效较好,癌灶液化脱落迅速,月余后脱落逐渐变慢,边缘组织质硬色黯,脓液稀少,改用红升丹外撒 3 次,内服中药香贝养荣汤 10 余剂,以后继续应用三品治疗,3 个月后癌灶完全脱落,局部逐渐愈合。

* 河南平顶山市第一人民医院,平顶山市优越路 117 号(467000)

** 河南平顶山鲁山县公疗医院

收稿日期:1993-05-23;修回日期:1993-09-22