

子水提剂可以提高病人及正常人淋巴细胞 GBH 反应, 女贞子还有抗衰老的作用。对 117 例肿瘤病人患者的观察中, 服药两个月后病人的精神食欲好转, 体力增加, 血红蛋白、白细胞及血小板升高。北京中医学院东直门医院近年来使用猪苓多糖伍用化疗治疗晚期原发性肺癌 102 例, 可以改善机体的一般状况, 增加或保持体重, 增进食欲, 能明显提高肺癌患者巨噬细胞吞噬功能 E 玫瑰花形成率, 提高晚期病人的生存质量和延长生存期。河南医科大学第一附属医院王瑞林等报道, 采用化疗合并冬凌草与单纯化疗 115 例食管癌, 观察到冬凌草对化疗药物有增效作用。广安门医院报道, 中西医结合治疗组白细胞 $>4000/\text{mm}^3$ 之患者占 87%, 单纯化疗组为 64%。血小板 >8 万 mm^3 之患者, 中西医结合组中占 98%, 单纯化疗组为 87%。

化疗病人自加服中药后, 巨噬细胞吞噬功能有所提高, 而对照组则有所下降。对照组患者化疗后血浆皮质醇含量平均值较化疗前略有降低, 而扶正组及对照

组转扶正组患者, 血浆皮质醇含量在扶正治疗后均有明显回升。

5.2 远期疗效的观察: 中国中医研究院广安门医院报道, 应用扶正冲剂合并化疗治疗 III 期胃癌(术后) 303 例患者之 1 年生存率为 99.0%, 3 年生存率为 77.31%, 5 年生存率为 53.40%。福州市红十字会医院对晚期胃癌病人手术前先给予扶正培本和调理, 术后又及时行中西医结合治疗(化疗+中医中药), 观察结果不但减轻病人术后的并发症和缩短其住院时间, 5 年生存率为 52%。

5.3 实验研究: 近年来全国各地一些医疗单位在防治癌症病人化疗副反应的临床研究中, 主要是运用健脾补肾的一些中药进行治疗。显示扶正冲剂合并化疗能提高抑瘤率, 能明显延长某些荷瘤小鼠的生存期, 具有较好的升提高白细胞及提高小鼠对环磷酰胺半致死量的耐受性, 无急性及亚急性反应。实验结果与临床观察是基本一致的。

补心气和滋心阴口服液治疗冠心病心绞痛

孙景礼¹ 郑秀春¹ 陈 坤²

冠心病属中医心痹范畴。自 1992 年 12 月~1993 年 3 月, 我院应用湖北省咸宁制药厂生产的补心气口服液和滋心阴口服液重点观察冠心病心绞痛患者 40 例, 获较满意疗效。

1 临床资料

40 例中, 男 31 例, 女 9 例。年龄 40~50 岁 4 例, 51~60 岁 29 例, 61 岁以上 7 例。病程 1 年以内 3 例, 2~3 年 13 例, 4~9 年 18 例, 10 年以上 6 例。

心阴虚: 心前区隐痛或绞痛, 心悸, 眩晕, 心烦, 失眠, 颧红, 盗汗, 手足心热, 口燥, 咽干, 舌尖赤, 脉细数或促。共 20 例。

心气虚: 心前区闷痛或绞痛, 心悸, 气短, 惊恐, 自汗, 面色白, 手足冷, 苔白, 脉细弱或结代。共 20 例。

病情较轻, 疼痛发作间隔长 18 例, 病情较重, 疼痛反复发作 22 例。

2 用药方法

心气虚者每天服补心气口服液, 心阴虚者服用滋

心阴口服液, 每日 3 次, 每次 1 支(10ml), 共服 1 个月。其中有 32 例, 在治疗期间停用其他抗冠心病药物, 有 8 例辅以其他对症药物治疗。

3 治疗结果

心气虚患者 20 例服补心气口服液后, 获显效 7 例, 改善 9 例, 无效 4 例; 心阴虚患者 20 例服滋心阴口服液后, 获显效 8 例, 改善 10 例, 无效 2 例。心电图疗效分析, 心气虚患者显效 5 例, 改善 5 例, 无效 10 例; 心阴虚患者显效 2 例, 改善 7 例, 无效 11 例。治疗后两组患者心悸、气短、眩晕、虚烦、失眠等症状均获不同程度的改善。

4 讨论

临床观察表明, 补心气口服液治疗心气虚型心绞痛和滋心阴口服液治疗心阴虚型心绞痛疗效确切, 在解除心绞痛的同时, 还能有效的消除或减轻临床症状, 尤其对心痛疗效较好。

补心气口服液由黄芪等药物组成, 滋心阴口服液由麦冬等药物组成做为中成药制剂, 其起效较迅速, 可试用于中医急症对冠心病患者的治疗。补心气口服液和滋心阴口服液在临床应用中未发现有任何明显的毒副作用, 是一种安全制剂。

1 吉林省长春市中心医院药剂科

2 吉林省长春市中心医院门诊部

收稿日期: 1994-04-29