

福建省1993年下半年高等中医自学考试

《中医外科学》试题

(答案下期刊出)

1 单项选择题(每小题0.5分,共25分。在备选答案中选出1个正确的答案,并将序号填入括号内。)

1.1 诊治外科疾病,强调重视脉诊的医家是()

①陈自明 ②薛己 ③齐德之 ④陈实功

1.2 漆疮、疥疮是以什么命名的()

①特性 ②病因 ③症状 ④传染性

1.3 “失荣”的含义是指()

①颈部肿块坚硬如石 ②恶性肿瘤患者后期面容消瘦失去荣华 ③发于颈部或转移至颈部的恶性肿瘤 ④一切虚损患者面容消瘦失去荣华

1.4 “五气过极均能化热生火”是指()

①心为五脏之君主,诸痛痒疮皆属心火 ②五脏之气均能郁久生火 ③六淫之邪,初期火热现象不显,中期热象明显 ④腑气不通壅塞生火

1.5 下列哪项不属“肾恶”的表现()

①二便不利 ②口渴引饮 ③咽干囊缩 ④面容渗黑

1.6 溃疡见数脉是()

①正气已衰 ②正虚邪未去 ③热邪未净 ④邪去正衰

1.7 辨脓时,下列哪项属气衰竭之败象()

①脓液由厚转稀 ②脓稀如水或夹有瘀血 ③脓稀似粉浆污水色晦腥臭 ④脓稀色绿或如姜汁

1.8 顺证、逆证主要是辨()

①局部症状 ②全身症状 ③局部症状结合全身症状 ④全身症状为主,结合局部症状

1.9 通里法的适应证,下列哪项不宜()

①阳证疮疡里热内结 ②肠燥便秘 ③脾肾阳虚证 ④皮肤病皮损红灼热者

1.10 下肢丹毒患者,肌肤焮红灼热,肿胀疼痛,轻度糜烂,渗液不多,可选用()

①二妙丸 ②萆薢渗湿汤 ③五神汤 ④龙胆泻肝汤

1.11 使用掺药,下列哪项不符()

①直接掺于疮面 ②配成溶液淋洗疮面 ③掺于膏药或油膏中敷贴 ④粘附于药线插入疮口

1.12 一中年男性,背部生疔未愈,继而四肢微热,伴寒战高热,口渴,应诊断为()

①暑疖 ②多发性疖 ③痈 ④流注

1.13 托盘疔发生于()

①指端 ②指甲下 ③手指背 ④手掌中心

1.14 蛇头疔易损骨,其主要征象是()

①肿势不消,指甲变黑 ②疼痛剧烈,彻夜不眠 ③肿

势连指,甲下积脓 ④脓水不尽而臭,疮口久不愈合

1.15 哪种疔疮容易损筋伤骨()

①蛇眼疔 ②疫疔 ③颜面疔 ④手部疔

1.16 丹毒发于小腿,名曰()

①流火 ②流注 ③流痰 ④抱头火丹

1.17 流注的好发部位是()

①头面部 ②骨骼关节 ③四肢躯干肌肉深部 ④项后部

1.18 髂窝流注患者,下肢表现为()

①外旋 ②内收 ③外展 ④屈曲

1.19 附骨疽早期诊断的重要依据是()

①起病慢,寒战高热 ②局部红肿灼热疼痛 ③病变骨端深压痛,叩击痛 ④患肢肿胀

1.20 附骨疽因发病部位不同,在中医文献中有各种名称,如生在大腿外侧的叫()

①附骨疽 ②咬骨疽 ③多骨疽 ④环跳疽

1.21 虚陷证的舌苔是()

①苔黄糙,质红绛或苔黄腻,舌尖有刺 ②苔黄腻质绛黑 ③光如镜,质红绛或苔薄,质淡红 ④苔全无,舌质干

1.22 从经络上看,男子乳房属()

①肝 ②脾 ③肾 ④胃

1.23 检查乳房的时间选择最好在()

①经前 ②经期中 ③经后1~7天 ④经后7~10天

1.24 乳痈初起的临床症状是()

①乳头溢液,不痛不痒 ②乳头破碎,痛如刀割 ③乳晕肿痛,皮色微红 ④乳房胀痛,恶寒发热

1.25 乳疽是指发生在()部位的疾患

①乳房皮肤 ②乳房皮肉之间 ③乳房深部后位 ④乳晕

1.26 乳岩与下列哪项关系最密切()

①火毒外侵,肝、肾二经湿热蕴结而成 ②初期形寒怕热,结块木硬,宜疏肝清胃软坚散结 ③多发于40~60岁绝经期前后的妇女 ④青壮年妇女乳房内常见的慢性肿块

1.27 最早提出五瘤配五脏观点的是()

①《三因方》 ②《灵枢经》 ③《外科枢要》 ④《外科正宗》

1.28 舌岩病名最早见于()

①《沈氏尊生》 ②《外科真诠》 ③《外科正宗》 ④《医宗金鉴》

1.29 肾岩阴茎部溃烂,肿胀疼痛,翻花如石榴状,有浆液血样渗出物,腐臭难闻,宜用()

①知柏地黄汤 ②龙胆泻肝汤 ③滋阴降火汤 ④阳和汤

1.30 白屑风外用()

①颠倒散洗剂 ②三黄洗剂 ③3%硼酸溶液 ④补骨脂酊

1.31 油风辨证分为()

①血燥、血瘀、肝肾不足 ②风热、湿热 ③血热、湿热 ④风热、燥热

1.32 热疮的好发部位是()

①发无定处 ②好发于口腔 ③好发于腰部 ④好发于皮肤粘膜交界处

1.33 酒皴鼻初起表现为()

①暂时性阵发性红斑 ②明显的毛细血管扩张 ③脓疱 ④鼻部组织肥厚

1.34 药物性皮炎大疱性表皮松解型的临床特点,哪项不正确()

①发病较急,皮疹1~4日遍布全身 ②高热,体温达40℃以上 ③皮疹初为斑疹,很快出现水疱、大疱,迅速出现广泛松弛性表皮松解坏死 ④预后较好,疗效显著

1.35 药疹的临床处理,应该首先是()

①抗过敏 ②使用肾上腺皮质激素 ③内服中药 ④停用一切可疑药物

1.36 下列各项除()外,为肛门直肠癌的好发部位

①截石位:内痔3、7、11点处 ②截石位:赘皮外痔6、12点处 ③截石位:外栓外痔3、9点处 ④截石位:肛裂3、9点处

1.37 混合痔的临床特点是()

①既有内痔,也有外痔 ②内痔并有血栓外痔 ③严重的内痔嵌顿 ④内痔部分与外痔部分形成一个整体

1.38 患者60岁,排便时出血量少,肛门脱出肿物,需用手推挤方能回纳,应诊断为()

①直肠癌 ②肛乳头肥大 ③混合痔 ④三期内痔

1.39 血栓外痔的主要症状是()

①便血、便秘、脱出 ②肛门部肿物、剧痛、不出血 ③肛门傍肿痛伴发热 ④肛门异物感,排便不畅

1.40 肛裂的主要症状是()

①便血疼痛 ②便血、周期性疼痛、脱垂 ③便血、周期性疼痛、便秘 ④疼痛、便血、流脓

1.41 下列疾病中除哪一种疾病外,均常与肛隐窝感染有关()

①慢性肛裂 ②肛周脓肿 ③肛乳头肥大 ④直肠息肉

1.42 肛瘻的主要症状是()

①便血、便秘、肿痛 ②肛周流脓疼痛、搔痒 ③肛门部肿物、剧痛、不出血 ④周期性疼痛、便血、流脓

1.43 脱肛时直肠周围注射法的作用机理是()

①增加直肠肛管之间的角度,改变直肠垂直状态 ②增加肛门括约肌张力 ③使直肠周围组织张力增加 ④使直肠与周围组织粘连

1.44 直肠癌的诊断,比较可靠的方法是()

①活体组织病理检查 ②直肠指检 ③直肠镜检查 ④钡灌肠摄片

1.45 神经毒蛇咬伤后的内治法则宜()

①凉血止血 ②活血祛风 ③清热利湿 ④和营通络

1.46 破伤风的中药治疗常用()

①犀黄丸 ②安宫牛黄丸 ③玉真散 ④至宝丹

1.47 脓疮周围皮肤伴有湿疮的可选用()

①红油膏 ②黄柏膏 ③疯油膏 ④青黛膏

1.48 褥疮的病因是()

①湿热蕴结 ②风热相搏 ③气血虚亏 ④脾肾不足

1.49 脱疽热毒证可选用()

①黄连解毒汤 ②五味消毒饮 ③四妙勇安汤 ④犀角地黄汤

1.50 烧伤后期疤痕疙瘩形成者,可用()外敷

①黑龙丹 ②黑虎丹 ③黑退消 ④黑布膏

2 多项选择题(每小题1分,共25分。在备选答案中选出2~5个正确答案,并将序号填在括号内。)

2.1 火热而致肿痛特点是()

①肿势胀急 ②皮薄光泽焮红 ③灼热疼痛 ④痛无休止 ⑤遇冷则减

2.2 疮疡作痒的原因是()

①疮疡初起 ②成脓中期 ③腐脱新生 ④疮面脓水浸渍 ⑤外用药物刺激

2.3 外科疾病初期伴恶寒发热者见于()

①颈痈 ②乳痈 ③蛇窜疮 ④腹部痈 ⑤流注

2.4 溃疡见滑脉是()

①邪盛病进 ②热邪未净 ③余毒不化 ④阴寒内盛 ⑤痰多气虚

2.5 询问现病史包括的内容有()

①与此次发病有关的既往史及个人生活史、家庭史 ②起病时间及病变部位、性质、程度 ③发病原因或诱因及缓解方法 ④发病情况及诊疗经过 ⑤伴随症状及全身其他情况

2.6 风邪致病特点是()

①迅速多变 ②阳证热证多见 ③易犯人体上部 ④皮色不变 ⑤多不化脓

2.7 髂窝流注应与环跳疽鉴别,下列哪些有助于前者的诊断()

①患肢屈而难伸 ②患肢下延伸直和弯曲 ③髂窝可

触到圆形肿块 ①臀部外突 ⑤不能活动

2.8 火陷的症状有()

①疮顶不高,根盘散漫 ②疮色紫滞,灼热剧痛 ③壮热口渴,烦躁不安 ④神昏谵语 ⑤便溏

2.9 瘰疬的病因有哪些()

①头面疮疖引起 ②肝郁脾虚,痰热内生 ③火毒蕴结少阳 ④肺肾阴亏,痰火凝结 ⑤心虚

2.10 流痰的初期内治法是()

①扶正托毒 ②滋补肝肾、温通经络 ③补益气血 ④散寒化痰 ⑤和营托毒

2.11 乳痈初起外敷药可用()

①金黄散 ②玉露散 ③仙人掌加金黄散 ④黑退消 ⑤阳和散

2.12 乳衄内治可用()

①丹栀逍遥散加减 ②归脾汤加减 ③六味地黄汤加减 ④金匱肾气丸加减 ⑤桃红四物汤加减

2.13 诊断晚期乳癌的根据有()

①肿块超过5cm ②同侧腋窝淋巴结肿大 ③肿块已翻花 ④锁骨上淋巴结肿大 ⑤同侧上肢有浮肿

2.14 下列哪项属身体实体肿瘤()

①肉瘤 ②血管瘤 ③脂肪瘤 ④骨瘤 ⑤失荣

2.15 下列哪些为盘状红斑狼疮的特点()

①隆起性蝶状红斑水肿 ②皮损边缘略隆起中心部分消退 ③皮损上有黄色鳞屑 ④有色素减退及轻度萎缩 ⑤水肿性红斑

2.16 下列哪几型属于瘾疹临床证型()

①风热型 ②肠胃湿热型 ③冲任失调型 ④风寒型 ⑤气滞型

2.17 下列哪些是皮肤病的自觉症状()

①瘙痒 ②斑疹 ③麻木 ④丘疹 ⑤结节

2.18 位于肛提肌上脓肿的特点是()

①位置深 ②全身症状重 ③局部体征轻 ④粪便中有脓液 ⑤常伴有腹痛腹泻

2.19 肛瘻形成后不能自行愈合的原因主要是()

①原始感染灶的存在 ②瘻管周围形成疤痕组织及引流不畅 ③外口存在可有细菌异物侵入,反复感染 ④病人大便无定时,直肠内粪便贮留 ⑤长期流脓,引起肛周湿疹

2.20 脱肛多见于()

①儿童 ②老年人 ③多次分娩的妇女 ④患有慢性腹泻者 ⑤肝硬化病人

2.21 脱肛用粘膜下注射法,术后注意事项有()

①3天后重复注射一次 ②流质饮食 ③内服清热解毒药 ④控制大便3天 ⑤避免用力负重

2.22 脱疽热毒证可选用()

①黄连解毒汤 ②仙方活命饮 ③四妙勇安汤 ④清营汤 ⑤顾步汤

2.23 脱疽未溃期,可外用()

①金黄膏 ②冲和膏 ③红灵丹油膏 ④红灵酒 ⑤红油膏

2.24 毒蛇咬伤后的排毒措施有()

①扩创法 ②烧灼法 ③针刺法 ④封闭法 ⑤注射止血药

2.25 小腿深静脉炎可见有()

①高热 ②腓肠肌疼痛肿胀 ③踝关节以上水肿 ④浅静脉怒张 ⑤将足向背侧弯曲时,腓肠肌疼痛加剧

3 填空题(每空1分,共10分)

3.1 垫棉法用于袋脓时,宜垫在疮口的_____方;如用于溃疡空腔,皮肉一时不能粘合时应_____。

3.2 《外科医案汇编》论治乳房病时指出:“……若治乳,从一_____字著笔,无论虚实新久,温凉攻补,各方之中夹_____之品,使其乳络疏通。”

3.3 乳头和乳晕部分发生大小不等的皲裂,称为_____,《疡科心得集》称此为_____。

3.4 肛瘻切开疗法的适应症是低位_____肛瘻和_____复杂性肛瘻。

3.5 血栓性深静脉炎,当血栓脱落时产生_____栓塞。血栓性浅静脉炎在红肿消退后留下_____。

4 简答题(共40分)

4.1 中医外科范围包括哪些?(6分)

4.2 颈痈的辨证特点有哪些?初起内治法则和常用方是什么?(8分)

4.3 流痰的特点有哪些?各期内治法则及常用方是什么?(8分)

4.4 试述乳房疾病的常用内治法、适应症及代表方。(10分)

4.5 何谓内痔?三期内痔的主要症状是什么?有哪些手术方法可适用于三期内痔?(8分)

福建省1993年下半年高等中医自学考试

《中医儿科学》试题答案及评分标准

1 填空题(每题1分,共20分)

1. 曾世荣、惊风抽搐(或惊风) 2. 心肝、肺脾肾 3. 母乳、人工、混合 4. 婴儿、幼童(或学龄前) 5. 忽缓忽

急、时作时止 6. 溢乳 7. 宜通经络、驱风镇痉 8. 邪毒炽盛、内陷心肝(或热毒炽盛、内陷厥阴) 9. 感冒夹痰 10. 肺脾肾不足、痰饮留伏 11. 抑龙丸(或安神