

胆草 10g, 黄芩 10g, 焦山栀 10g, 生地 10g, 七叶一枝花 15g, 车前子(包) 10g, 当归 10g, 柴胡 10g, 甘草 6g。水煎 3 剂。治疗 3 天后热除纳佳, 局部红肿基本消退, 继用苦参外敷 3 日而痊愈。

丹毒系现代医学“急性网状淋巴管炎”。皆因湿热或风热化火所致。治宜清热解毒, 凉血化瘀, 苦参一药, 味苦性寒, 善治湿热疮毒之证, 配合内治法, 内外合治则药到病除。

苦参治疗原发性皮肤淀粉样变

山东栖霞县人民医院(山东 265300)

杨桂芹 鲁振香

原发性皮肤淀粉样变, 由于病因复杂, 其病情顽固, 缠绵难愈, 医生多感棘手, 笔者曾以苦参为主药, 治疗此病 20 余例, 均获佳效。

曾治王某, 男, 60 岁, 干部, 自述两胫前及背部有密集坚实的丘疹, 伴剧烈瘙痒 10 余年, 加重半个月, 曾用中西医多种药物调治, 均无显效, 近半年来, 复因日晒瘙痒加重, 曾在某医院诊治, 给予强的松、维生素 C, 瘙痒略有减轻, 随之皮损迅速扩散, 背部又出现大面积同样皮损, 患者甚为紧张, 即来我院求诊。检查: 双胫前下 1/3 处, 分别有一约 10cm × 7cm、8cm × 7cm 的皮损, 其上有高粱粒及黄豆大小的半球形或圆锥状丘疹, 散在分布或密集成片, 呈淡褐色, 皮损处灰暗而无光泽, 外观似鲨鱼皮, 皮肤肥厚, 搔之微有脱屑, 背部亦有广泛皮损, 但程度较轻。病理报告: 在真皮切片中, 可见片状均匀一致的嗜伊红淀粉样蛋白质, 有裂隙(为蛋白质凝固所致), 1% 结晶紫染色呈紫红色, 诊为原发性皮肤淀粉样变, 中医称为癩皮风。辨证为血燥生风, 肌肤失养所致。给予徐长卿、花椒枝、硫磺、白矾, 3 剂外洗, 效果不著, 后在上方加苦参 30g 外洗, 3 剂瘙痒大减, 皮损颜色有所减轻, 患者大悦, 可见苦参在本方中起着举足轻重的作用。嘱之, 以此方外洗, 连用 3 个月, 每日午晚两次外用, 3 个月后, 竟想不到, 暗褐色的皮损消失, 代之以光泽而富有弹性的新生皮肤组织, 厚薄适中。随诊 3 年, 未再复发。

自 1990 年以来, 用自拟苦艾硫矾汤(苦参、

艾叶、花椒枝、徐长卿、硫磺、白矾)治疗本病 20 例, 全部获效。其中男性 19 例, 女性 1 例, 40 岁以上男性居多, 为 18 例, 病程最短者 1.5 年, 最长者达 17 年之久。半个月为 1 疗程, 短则 3 日见效, 长则 7 日见效, 一般需坚持 1~3 个月, 皮损才能恢复正常。每剂可连用 3 日。通过近几年的临床应用, 体会到苦参不仅对于一般体癣有效, 而且对自身蛋白质代谢紊乱所致的皮肤淀粉样变亦有卓效, 外用胜于内服。

苦参治疗猪囊虫结节

北京针灸骨伤学院(北京 100015)

张 荣 英

苦参是以清热除湿、祛风杀虫、利水为主要作用的药物。至于取其消肿散结之功, 治疗全身散在性痈肿包块(猪囊虫结节)未见有记载。笔者在临床中偶然发现苦参单味煎汤内服可治愈全身散在多发猪囊虫结节, 现介绍如下。

张××, 女, 31 岁, 农民, 入院日期 1978 年 6 月 8 日。入院诊断: ①左甲状腺旁肿块待查; ②甲状腺癌; ③甲状腺瘤; 入院后经切除结节, 病理检查确诊为左甲状腺旁猪囊虫结节, 行切除术后痊愈出院。1982 年 10 月 17 日因全身有散在性肿块来中医门诊治疗。诊视患者, 面色少华, 体质一般, 四肢胸背颈下多处有包块, 大小不等, 多数在 1cm × 1cm 或 2cm × 2cm 之间, 瘙痒, 别无明显不适。笔者结合既往病史给予杀虫之药苦参 60g, 水煎内服, 每日 1 剂。10 天后复诊, 全身包块明显减少或缩小, 继服苦参 60g, 每日 1 剂, 水煎服, 连服 20 剂, 各处肿块消失, 2 年后随访, 一切正常。

笔者体会, 苦参之所以能治疗猪囊虫结节, 其功归于杀虫、消肿散结之能。如《本经》有“主心腹结气, 疰瘕积聚……”之注。《滇南本草》有: 消肿毒、痰毒的经验;《随身备急方》亦有治疗瘰癧的记载。苦参杀虫之功, 医者皆知, 不再赘述。用苦参治疗猪囊虫结节, 有标本兼顾之意, 因此病症, 其本为虫, 其标为肿块(结节), 为虫体痰毒凝聚所致。苦参既能泻火解毒、燥湿杀虫, 又能散结消肿, 故用之标本同治, 获效甚捷。