

附表 治疗前后的临床症状比较

|     | 月经过多 |      | 不规则月经出血 |      | 贫 血 |      | 腹 痛 |      |
|-----|------|------|---------|------|-----|------|-----|------|
|     | 例数   | (%)  | 例数      | (%)  | 例数  | (%)  | 例数  | (%)  |
| 治疗前 | 35   | 87.5 | 25      | 62.5 | 22  | 55.0 | 15  | 37.5 |
| 治疗后 | 3    | 7.5  | 2       | 5.0  | 2   | 5.0  | 2   | 5    |

异。

3.4 外周血中NK细胞活性改变:治疗前30例测定NK细胞活性为 $22.23 \pm 5.62\%$ ,较对照组的 $45.17 \pm 10.05\%$ 显著减低。应用861消瘤片治疗半年后随机复查10例,NK细胞活性增高至 $36.51 \pm 5.91\%$ ,治疗前后NK细胞活性差异非常显著( $P < 0.001$ ),但尚较对照组者为低( $P < 0.05$ )。

#### 4 讨论

祖国医学认为子宫肌瘤系属症瘕之疾,常与崩漏并存,且多数患者出现血瘀兼有燥热之象,故其病机为瘀血内结,久蕴化热,伤津生燥所致。我院沈仲理教授多年来研究本症的治疗,累积了丰富经验,拟订了活血化瘀,清热软坚为主的治则。方药中选用半枝莲、石见穿、夏枯草、海藻等味苦、性微寒之品,具有清热化瘀、软坚消结之功,且能避温散易动血之虞,而收到化瘀不动血之旨。本病易见虚象,本着中医驱邪不伤正,扶正以祛邪的治则,配用党参、白术、黄精等性味甘平之品,可补脾益气,生津养血。现代药理学研究表明,海藻能促进病理产物及炎性渗出物的吸收,且含有抗凝物质,而且具有抗凝作用;党参、白术、黄精等可使红细胞增高,并有收

缩子宫作用。

本组40例服用861消瘤片半年以上,临床症状明显改善,子宫肌瘤总有效率达70%,表明该药对子宫肌瘤有一定疗效,特别是肌瘤小、子宫增大较轻者效应更佳(88.9%),且延长服药疗程对部分病例有提高疗效作用;而肌瘤较大、且呈多发性,子宫增大较明显者,其疗效则不够满意,其有效率仅30.8%。

本组部分子宫肌瘤患者,治疗后外周血NK细胞活性较治疗前明显增高,根据本院妇科有关子宫肌瘤患者NK细胞活性改变的研究<sup>[4]</sup>,推测治疗后NK细胞活性回升现象,可能反映了861消瘤片具有提高患者机体的免疫反应,使原有的内分泌紊乱得到了不同程度良性调整。

#### 5 参考文献

- 1 沈仲理. 中药新药治疗子宫肌瘤临床和实验研究指导原则. 卫生部医政局编订,1991.
- 2 周永昌,等. 超声医学. 第1版. 科学技术文献出版社,1989:812.
- 3 Korzeniewski Callewet. An enzyme-release for natural Cytotoxicity. J Immunol Methods 1983.
- 4 黄含英,等. 子宫肌瘤患者自然杀伤细胞活性的改变. 中华妇产科杂志 1990;25(6):358.

## 妇人咳嗽遗尿验方

崔寅春\*

咳嗽遗尿是指咳嗽时尿液失禁的病证。《素问·咳论》有“膀胱咳状,咳而遗溺”的记载。此证亦可称为“膀胱咳”。依笔者所见,年老体弱,生育过多,有难产史的妇女在外感咳嗽时常出现“膀胱咳”。本病病机多因平素脾气虚弱,肺阴不足以及生育过多造成气血亏损,外感后,肺气宣发肃降失司,肝经失其疏泄,升降出入失

调,肺气上逆则咳,中气下陷则遗尿。笔者多年前自拟一“妇人咳嗽遗尿方”,临床应用,效果良好,介绍如下。

本方由党参、白术、黄芪、当归、麦冬、五味子、柴胡、黄芩、青皮、陈皮组成。本方是在补中益气汤、生脉散和小柴胡汤基础上加减化裁而成,党参、白术、黄芪益气健脾为主药,当归、麦冬、五味子养阴润肺为辅药,柴胡、黄芩疏肝清热为佐药,青皮、陈皮开胸理气为使药。本方健脾益气,养阴润肺,疏肝理气,有气行滞化,通里达外,制约枢机之功。

\* 山西省吕梁地区中医院,山西省离石县(033000)

收稿日期:1994-05-04