

作用,促使皮损改善。临床用之,多能取效。曾治18例,痊愈13例,显效2例,无效3例。如治张××,女,45岁。1990年8月13日诊。左足背有一苔藓样斑块5年。斑块较钱币大,类圆形,表面干燥呈席纹状,正常皮色,自感阵发性剧痒。西医诊为神经性皮炎,用西药不效。来诊后,投上方3剂,用药第1天,痒减,第3天痒止,皮损改善。继用10天后皮损痊愈。随访2年未见复发。

2 用于足癣

治足癣脱屑型,用桂枝、防风各30g,枳壳10g。加水约2000ml,煎沸约10分钟,熏洗,每日1次,一般用7~10天,疗效较好。但水疱型和糜烂型则不宜用。曾治46例,痊愈42例,无效4例。如治叶×,男,72岁。1992年6月24日诊。反复足痒20多年,双足底及足侧皮肤干燥

粗糙,脱屑,足底皲裂。西医诊为足癣,用药不效。来诊后,投上方10剂,用药2天,痒减,4天痒止,7天后皮损基本痊愈。

3 用于胼胝

桂枝辛温能通脉行血散结,可用治胼胝,其效较好。处方:桂枝30g,枳壳20g,白醋100ml。加水约2000ml,煎沸约5分钟,不宜久煎。熏洗患处,每日2次,一般用药5~7天见效。曾治32例,痊愈30例,显效2例。如治陆××,女,76岁。1992年8月26日诊。患足胼胝反复20多年,时觉行走疼痛,曾用多种外治法效不佳。诊见:双足底近趾端处,皮肤增厚,呈斑片状,表面光滑,色黄白稍透明,触之坚硬。投上方8剂,每日1剂,洗浸2次,并按摩足底。用药2天角质软化,7天则增生的角质脱落。为巩固疗效,继用1周。随访年余未见复发。

增液承气汤加减治疗血唾、血精

颜 永 潮*

1 血唾

周××,男,52岁,1988年12月5日初诊。反复口唾红色已2个月余,夜间为甚,睡觉时常流到枕上,晨起第一口唾液也常呈红色,上午8时以后逐渐消失,无咳嗽及呕吐,无恶寒发热,伴头昏、乏力、口干、便干、溲黄。经西医药治疗无效。查:白细胞数 $12.0 \times 10^9/L$,中性粒细胞0.82,血红蛋白90g/L,血小板数 $100 \times 10^9/L$ 。舌质红、苔薄,脉沉细数。西医诊断:唾液腺炎。中医辨证:阴亏火旺,虚火上炎。治疗:滋阴降火,泻热通便,佐以平肝宁络散瘀,予增液承气汤加减。处方:生地15g,玄参12g,麦冬12g,生大黄10g,玄明粉15g,生鳖甲10g(杵先煎),黄芩12g,赤白芍各12g,旱莲草12g,茜草12g,田七粉4g(分吞)。服药4剂后,口唾粉红色减淡、减少,头昏口干好转,大便已通,小溲转清。药既效,原方加減再进,去生军,加女贞子10g,蒲公英15g。服7剂后血唾消失,其他诸症也愈,于12月16日查血白细胞数 $9.0 \times 10^9/L$,中性粒细胞0.52,血红蛋白100g/L,血小板计数 $110 \times 10^9/L$ 。嘱调护,忌辛辣,随

访未见复发。

2 血精

徐××,男,49岁,1991年6月5日初诊。患者反复血精3个月余,加重半个月。经多方治疗无效。诉述昨天同房后又精液呈血性,血色鲜红,并夹有血块,伴腰酸、乏力、头晕、五心烦热、口渴、便秘。无尿频、尿急,尿痛感及尿血史。检查:形瘦,面色潮红,查前列腺液:红细胞10~12个/高倍镜,白细胞3~4个/高倍镜。卵磷脂小体(++)。精液常规:红细胞15~20个/高倍镜,精子数目、活力均正常。腹部平片肾静脉造影及膀胱镜检查示后尿道充血,其余均示正常。舌质红、苔薄黄,脉弦细数。西医诊断:精囊炎,前列腺炎。中医辨证:阴虚火旺,虚阳迫血走下窍,治拟滋阴降火,泻热通便,宁络散瘀止血。处方:生地15g,麦冬12g,玄参12g,生川军10g,玄明粉15g,知母10g,川柏10g,怀山药20g,地榆炭10g,田七粉4g(分吞)。5剂后血精好转,量少,已无血块,大便通畅,头晕、乏力,口干改善,舌质红,苔薄,脉弦细。原方去生军、玄明粉,加紫草,再服7剂,患者血精消失,他症亦愈。复查:前列腺液及精液化验检查,腹部平片肾静脉造影膀胱镜检查均示正常。嘱再服知柏地黄丸合归脾丸1个月以巩固疗效,随访未见复发。

* 浙江省兰溪市中医院,兰溪市中山路82号
(321100)

收稿日期:1993-11-19