

吉兆;额有青纹,目有赤脉,口有黑气,耳有尘痕为凶兆^[16]。这些认识与周学海的舌体细络瘀血理论是完全吻合的。说明古代医家早在几百年前就已体验到观察微循环的重要。

通过舌脉诊法传统理论的探索,可以看出:舌脉是人体粘膜下能够透见络脉形色的重要窗口,舌质和舌腹面又是观察细络气血流通的最适部位,特别是气滞血瘀、血脉凝涩的各种病证,对其络形与络色的审视分析,确能为临床辨证提供依据。它的理论与方法中的科学内涵,在舌脉诊法研究中也是必须认真继承与发扬的。

4 参考文献

- 1 马继兴,马王堆古医书考释.湖南科技出版社.1992:173~273;285.
- 2 史崧校.灵枢经.影印本.人民卫生出版社.1956:30~38;90;18;54;111.
- 3 王冰次注.黄帝内经素问.影印本.人民卫生出版社.1956:133;77;53;106.
- 4 皇甫谧.针灸甲乙经.影印本.人民卫生出版社.1956:36

~38.

- 5 葛洪.肘后备急方.影印本.人民卫生出版社.1956:36.
- 6 丹波康赖.医心方.影印本.人民卫生出版社.1955:140~141;509.
- 7 孙思邈.千金要方.影印本.人民卫生出版社.1982:177,198.
- 8 陈梦雷.古今图书集成·医部全录.脏腑身形.人民卫生出版社.1963:1471.
- 9 安徽与上海中医学院.针灸学辞典.上海科技出版社.1987:408.
- 10 杨继洲.针灸大成.人民卫生出版社.1963:291.
- 11 巢元方.诸病源候论.人民卫生出版社.1955:70;71.
- 12 金礼蒙.医方类聚.第十分册.人民卫生出版社.1979:556.
- 13 周学海.形色外诊简摩.人民卫生出版社.1987:89~90.
- 14 靳士英,等.瘀证舌下络脉诊法的病理组织学观察.中医杂志.1992;(3):42.
- 15 王肯堂.证治准绳·幼科.影印本.上海科技出版社.1959:302.
- 16 张景岳.景岳全书.影印本.上海科技出版社.1959:745.

(国家自然科学基金资助课题)

中药小尿停临床疗效观察

曲 学 英*

小尿停是我在民间秘方基础上研制的纯中药冲泡剂。自1980年3月至1993年3月,共用之治疗各种原因引起的尿急、尿频、尿痛、尿量少等症状863例,取得了良好的效果。

1 一般资料

本组863例中,男329例,女534例。年龄最小5岁,最大86岁,平均41.4岁。其中因急慢性尿道炎引起者372例,膀胱炎195例,前列腺炎235例,原因不明者61例。病程最短2天,最长13年。

2 治疗方法

本组病例全部单独使用小尿停内服治疗。药物组成:车前草10g,白茅根10g,泡桐花(玄参科植物泡桐树的筒状花瓣)30g。将上药混合后粉碎搅拌均匀,按每小包10g分装。服用时取上药一小包放入杯中,加入70~100℃白开水200ml,浸泡15分钟后,滤出药液,加白糖适量,待温后一次服下。每包药可冲泡3~5次,

一天内分3~5次服用。急性患者10天为一疗程,慢性患者1个月为一疗程。

3 疗效标准与结果

痊愈:治疗1~3个疗程后,临床症状消失,观察半年不复发。显效:临床症状基本消失,小便次数较正常稍多。有效:临床症状明显减轻,小便次数仍多。无效:临床症状无变化。

本组863例,痊愈772例(96.4%),显效848例(98.3%),无无效者。

4 典型病例

患者杜××,女,35岁,山西省万荣县农民。1989年1月9日,因小便频数、疼痛到某县医院诊治,诊断为急性尿道炎。给予呋喃妥因口服。服药1天,疗效不明显,经人介绍来我处治疗。症见每10多分钟就小便一次,小便时尿道灼疼如刀割,尿量约10ml左右。给予小尿停10包,每天2小包,2小时服用一次。服药1小时后,小便灼痛减轻,2小时后,小便次数减少,灼痛减轻。12小时后尿急、尿频、尿疼基本消失。第2天改为1天服用1包,10天后复查,尿常规正常。随访至1993年5月未见复发。

* 山西省运城地区医学科学研究所,山西省运城(044000)

收稿日期:1993-11-18