DOI:10.13288/j.11-2166/r.1995.01.005

清热解毒未效者，多为瘀阻冲任，寒结胞脉，我们曾用以红藤、败酱草为主的清热解毒法与以桂枝、红花、吴萸为主的温经化瘀法对照观察治疗慢性盆腔炎，发现温通法能有效地改善慢性盆腔炎的腹痛、月经瘀块、肛门坠痛等症状，血液流变学指标显著好转；对输卵管阻塞、附件增粗、条索状变化者，我们以桂枝配皂角刺温经通络，促进增生组织的软化吸收；对有输卵管积水病变者，宜采用扶正化瘀利水法，药用：桂枝、水蛭粉、生黄芪、茯苓等化气利水，温经散结；对经期少腹冷痛，带多清稀者，可用桂枝配鹿角霜以散寒蠲带。桂枝的用量一般寒凝血瘀轻症用10g左右，对顽固性寒瘀痛经可用至20g，妇科症瘕积聚因需久服，不宜重用以免化燥伤阴。根据不同病证，桂枝配以相应的中药用于妇科瘀血证，痛经每次经前服用5天，连用3个月；慢性盆腔炎每月服20剂，连用2～3个月；子宫肌瘤根据大小需用3～6个月。

桂枝末外敷治遗尿、寒疝、头痛

泰兴市第三人民医院（江苏225421）
华 乐 柏

启蒙老师朱氏，年逾古稀，幼承家训，治学严谨，悬壶50余载，精于内外妇喉。平素擅用药末外敷疗疾，往往获奇效。笔者曾随诊4载，受益非浅，现就其运用桂枝末外敷疗疾之案例，整理几则，以供同道参考。

1 醋调敷神阙愈遗尿

乡邻之女季×，8岁，自幼遗尿，多则每夜2～3次，求诊于师。师曰：有一法可治。随取桂枝末若干，调用食醋调成饼状。临寐前先用温水熨脐10分钟，将其饼贴于脐部，然后用纱布盖上固定，晨起取下，每晚一次。一周后来诉，患儿于第4日停止遗尿。继以巩固，共用药10余次，半年后随访，未见复发。后用此法治疗32例，总有效率达90%以上，疗程短者仅3～4次即愈，长者必须连续外敷半月方能取效。

2 酒调敷局部疗寒疝

本村干部陈×，42岁。患疝气数载，每于劳累而作，曾劝其手术，因条件限制未行。一日因挑重担病发，先自热敷罔效，邀吾师出诊，笔者随之。诊见右侧腹股沟处有一肿物约拳头大小，反复揉托不能回缩。时值夜半，师曰：先以一法试之，无效即去医院手术。嘱取白酒调桂枝末呈糊状，摊于纱布之上，敷肿物处，然后固定。翌日早餐后患者来叙，药后局部先有热感，约时许肿物骤然回缩，腹痛消失。后屡发用之皆效。

桂枝治窦性心动过缓

山东省胶州市商业局门诊所（山东266300）
贤 述 温

近年来笔者用桂枝为主治疗窦性心动过缓多例，均收到满意的疗效。如治张××，男，54岁，1993年9月8日就诊。患者有冠心病史5年，心率一直在60次/分以下。近来头晕乏力，面色不华，心悸怔忡，胸闷气短，四肢不温，自汗出，舌质淡红，舌苔薄白，脉沉迟无力。心率52次/分。心电图提示：窦性心动过缓，心肌缺血。证属心脾阳虚，治以温阳益气通脉。方药：黄芪30g，党参30g，白术20g，川芎15g，茯苓20g，甘草10g。服上药5剂诸症大减，但心率未增。笔者在上方的基础上加桂枝15g，服10剂后心率增至68次/分，随访2月余，在安静时心率仍保持在60次/分以上。笔者应用桂枝治疗窦性心动过缓受清代医学家陈修园启发很大，陈修园《金匮方歌括》说："桂枝振心阳，如离照当空，则阴霾全消，而天日复明也。"

桂枝用于神经性皮炎、足癣、胼胝

广州市荔湾区第二人民医院（广州510160）
朱 小 燕

桂枝不仅有发汗解表、温经通脉的作用，还有消肿散结、杀菌止痒的作用。笔者又用于皮肤病的治疗，效果满意。

1 用于神经性皮炎

神经性皮炎因风湿相搏或血虚风燥，气血阻滞，肤失濡养所致。用桂枝、金银花各30g，枳壳15g。加水约1500ml，煎沸约5分钟（不宜久煎），去渣，待药液微温洗患处，每日1次，一般用药15～20天。则起到祛风止痒，活血散结的

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net