

山东省1994年上半年高等中医自学考试 《西医内科学基础》试题

(答案下期刊出)

1 单项选择题(在备选答案中选出1个正确答案,并填入括号内。每小题0.5分,共25分)

1.1 弛张热是指()

①体温在39℃以上,一天内温差在2℃以上 ②体温在40℃以上,一天内温差在2℃以上 ③体温在39~40℃之间,一天内温差在1℃以上 ④体温在40℃以上,一天内温差在1℃以上

1.2 吸气性呼吸困难最常见于()

①气胸 ②气管内异物或梗阻 ③肺气肿 ④支气管哮喘

1.3 下面哪项是错误的()

①潮式呼吸而带有尿味者应考虑尿毒症 ②呼气有烂苹果味见于轻型糖尿病 ③呼气有肝臭味见于肝昏迷 ④呼气有大蒜味是有机磷中毒

1.4 有关腹痛哪项是错误的()

①持续性腹痛多由炎症所致 ②痉挛性腹痛患者常拒按 ③间歇性、阵发性腹痛常见于平滑肌痉挛 ④个别心肌梗塞、心绞痛可出现腹痛

1.5 肺下界下降见于()

①肺气肿 ②胸膜粘连 ③肺不张 ④胸腔积液

1.6 一患者因发热、咳嗽、右侧胸痛,X线胸片发现右侧胸腔积液,为明确诊断,需进一步首先做下列哪项检查()

①结核菌素试验 ②痰涂片及培养 ③超声波定位 ④胸穿抽液送检验

1.7 影响心尖搏动位置的最次要因素是()

①心脏疾病 ②腹部疾病 ③神经疾病 ④胸部疾病

1.8 心浊音界呈靴形扩大见于()

①右心室大 ②左心室大 ③左心房大 ④右心房大

1.9 第二心音的听诊特点是()

①心音低、强、长 ②心尖部最强 ③与颈动脉搏动同时出现 ④于心尖搏动稍后出现

1.10 腹部炎症尚未累及腹膜壁层时,腹部阳性体征为()

①局部有压痛 ②局部反跳痛 ③局部肌紧张 ④肠蠕动感消失

1.11 双侧指关节梭状畸形,掌指关节僵直,活动受限

见于()

①类风湿性关节炎 ②风湿性关节炎 ③慢性肺脓肿 ④亚急性细菌性心内膜炎

1.12 以下哪种疾病可引起白细胞减少()

①急性心肌梗塞 ②急性溶血 ③再生障碍性贫血 ④恶性肿瘤

1.13 灰色大便见于()

①胰头癌 ②慢性肠炎 ③阿米巴痢疾 ④细菌性痢疾

1.14 下列哪项检查结果符合渗出液()

①粘蛋白试验阳性 ②外观透明,不自凝 ③比重小于1.018 ④蛋白质含量低于2.5g/dl

1.15 血清蛋白电泳出现γ球蛋白长时间上升见于()

①肾病综合征 ②暴发型肝炎 ③糖尿病 ④肝硬化

1.16 酚红排泄试验(PSP)用于检查()

①肾小球滤过功能 ②肾小管排泄功能 ③肾小管重吸功能 ④肾脏浓缩和稀释功能

1.17 骨质密度增高的病变,下列哪项错误()

①骨质增生 ②死骨 ③骨质软化 ④骨质压缩

1.18 尿路平片观察不到()

①肾脏外形、大小 ②不透X线的阳性结石 ③透X线的阴性结石 ④钙化

1.19 反映心房除极过程的心电图波形是()

①P波 ②QRS波群 ③T波 ④U波

1.20 正常心电图P波宽度应()

①<0.08秒 ②<0.11秒 ③<0.14秒 ④<0.20秒

1.21 心电图纸走速调节为50mm/秒时,每小格代表()

①0.01秒 ②0.02秒 ③0.04秒 ④0.08秒

1.22 心电轴正常时,QRS主波方向应是()

①I、Ⅱ导联均向上 ②I导联向上,Ⅱ导联向下 ③I导联向下,Ⅱ导联向上 ④I、Ⅱ导联均向下

1.23 心电图R—R间距时间平均为0.8秒,心室率应为()

①65次/分 ②75次/分 ③85次/分 ④95次/分

分

1.24 心电图机红色标志导线应接()

①左上肢 ②右上肢 ③左下肢 ④右下肢

1.25 关于病毒性肝炎的诊断,何种说法正确()

①乙肝表面抗原(HBsAg)阳性肯定是乙肝病人
②乙肝表面抗原阴性可排除乙型肝炎诊断 ③以上均对 ④以上均错

1.26 伤寒病人发病2、3周后,体温开始波动下降,但未恢复正常时,体温又突然升高,无特殊症状和体征,持续5~7天后退热,可能是()

①复发 ②再燃 ③再感染 ④合并其他感染

1.27 关于细菌性痢疾和阿米巴痢疾的鉴别,哪项错误()

①菌痢大便量少,为粘液、脓、血便、无臭 ②阿米巴痢大便多,为果酱样,有恶臭 ③菌痢大便涂片可找到痢疾杆菌 ④阿米巴痢大便镜检可找到阿米巴滋养体

1.28 暴发型流脑败血症型不可能出现()

①急起高热 ②全身出血点 ③脑膜刺激征缺如 ④瞳孔大小不等

1.29 普通型流脑的抗菌治疗应首选()

①磺胺嘧啶(SD) ②青霉素G ③红霉素 ④氯霉素

1.30 玫瑰疹对何种病诊断有价值()

①斑疹伤寒 ②伤寒或副伤寒 ③麻疹 ④猩红热

1.31 一侧胸廓饱满,语颤明显减弱,气管向对侧移位,叩诊呈鼓音,呼吸音明显减弱的病人,应考虑是()

①肺气肿 ②胸腔积液 ③气胸 ④肺结核空洞

1.32 支气管哮喘与心源性哮喘一时难以鉴别时可使用下列哪种药物()

①肾上腺素 ②氨茶碱 ③吗啡 ④速尿

1.33 下列何项对临床诊断肺癌最有价值()

①长期吸烟 ②呼气性呼吸困难 ③刺激性咳嗽,痰中持续带血 ④畏寒、发热、胸痛

1.34 突然寒战、高热、胸痛、咳嗽呈铁锈色首先考虑的诊断是()

①金黄色葡萄球菌肺炎 ②肺炎双球菌肺炎 ③肺结核 ④慢支急性发作

1.35 大咯血最常见于()

①慢性支气管炎 ②肺结核 ③大叶性肺炎 ④急性支气管炎

1.36 慢性心衰的基本病因不包括()

①心肌收缩力减弱 ②心脏前负荷过度 ③组织代谢增加 ④心房颤动

1.37 右心衰竭时应无()

①肝大压痛 ②下肢水肿 ③颈静脉怒张 ④脾脏肿大

1.38 左心衰竭时应无()

①劳力性呼吸困难 ②两肺湿罗音 ③颈静脉怒张 ④咳嗽与咯痰

1.39 心衰治疗药物可减轻心脏负荷的是()

①西地兰 ②利尿剂 ③地高辛 ④多巴胺

1.40 不会出现心电图QRS波增宽的疾病是()

①室性早搏 ②房性早搏 ③急性心肌梗塞 ④左心室肥大

1.41 可提示坏死性胰腺炎的是()

①脐部出现瘀斑 ②血钙增高 ③血清淀粉酶升高 ④血清脂肪酶升高

1.42 能提示胃溃疡癌变的表现是()

①上腹痛向背部放射 ②并发上消化道出血 ③钡餐发现多发性溃疡 ④胃酸缺乏、乳酸增多

1.43 某患者因大量呕血及黑便而来急诊,血压170/100mmHg(22.7/13.3kPa),下列处理哪项是错误的()

①大量冰水洗胃 ②输血补液 ③止血敏静滴 ④垂体后叶素静注

1.44 女性,28岁,已婚,突发尿频,尿急,尿痛,无发热,肾区无叩击痛,尿中的白细胞+/高倍镜,中段尿培养为大肠杆菌生长,计数小于1万/ml,可诊断为()

①急性肾盂肾炎 ②肾结核 ③慢性肾盂肾炎急性发作 ④急性膀胱炎

1.45 慢性肾炎类肾病型与肾小球肾病的鉴别主要是依据()

①尿蛋白定量 ②血浆蛋白定量 ③水肿程度 ④肾组织活检

1.46 下列实验室检查中哪一项不符合原发性血小板减少性紫癜()

①出血时间延长 ②骨髓象血小板形成巨核细胞增加 ③凝血时间正常 ④血块退缩不良

1.47 局部淋巴结肿大一般不是()

①感染 ②结核 ③肿瘤 ④白血病

1.48 急性白血病细胞浸润可引起()

①发热 ②出血 ③贫血 ④胸骨压痛

1.49 癌性胸水患侧下胸部叩诊音为()

①清音 ②鼓音 ③浊音 ④实音

1.50 判断糖尿病酮症酸中毒的程度较为可靠的方法是()

①测定血钠 ②测定血氯 ③测定血糖 ④测定二氧化碳结合力

2 多项选择题(在备选答案中选出2~5个正确答案,并填入括号内。每小题1分,共25分)

2.1 现病史主要包括()

①起病情况 ②主要症状的特点 ③伴随症状 ④病情演变 ⑤诊疗经过

2.2 临床常见的意识障碍有()

①嗜睡 ②意识模糊 ③昏睡 ④昏迷 ⑤谵妄

2.3 下列哪些情况会引起抽搐()

①中毒性肺炎 ②破伤风 ③高血钙 ④严重心律失常 ⑤一氧化碳中毒

2.4 蜘蛛痣可见于()

①健康妇女妊娠期 ②急性肝炎 ③慢性肝炎 ④转移性肝癌 ⑤肝硬化

2.5 可出现哮鸣音的肺疾患()

①支气管哮喘 ②肺结核 ③肺癌 ④慢支喘息型 ⑤肺炎球菌肺炎

2.6 可出现心前区饱满、隆起的疾病有()

①风心病 ②先天性心脏病 ③大量心包积液 ④冠心病 ⑤高血压心脏病

2.7 单纯二尖瓣狭窄不应出现()

①心尖区收缩期杂音 ②杂音占整收缩期 ③杂音向左腋下传导 ④触及舒张期震颤 ⑤二尖瓣开瓣音

2.8 门脉高压的体征有()

①腹水 ②脾大 ③食道胃底静脉曲张 ④黄疸 ⑤腹壁静脉血流方向脐上向下、脐下向上

2.9 脑膜刺激征可见于()

①脑膜炎 ②脑栓塞 ③蛛网膜下腔出血 ④癫痫 ⑤脑血栓

2.10 血小板减少见于()

①弥漫性血管内凝血 ②再生障碍性贫血 ③急性白血病 ④急性失血后 ⑤脾切除术后

2.11 以下实验室检查结果哪几项属正常()

①黄疸指数5U ②血清总胆红素1.71~17.1μmol/L(0.1~1mg/dl) ③血清一分钟胆红素0.03~0.2mg/dl ④硫酸锌浊度15U ⑤麝香草酚浊度10U

2.12 可引起血浆非蛋白氮增高的疾病有()

①肾功能减退 ②上消化道大出血 ③尿崩症 ④急性肾盂肾炎 ⑤肾前或肾后因素所引起的少尿或

无尿

2.13 哪些不是溃疡型胃癌的X线征象()

①龛影突于胃腔轮廓之外 ②龛影口部有指压迹和裂隙征 ③粘膜皱襞向龛影集中 ④龛影周围有半月征、环堤征 ⑤胃壁僵硬

2.14 心电图QRS波增宽可见于()

①左、右室扩大 ②左、右房扩大 ③房室传导阻滞 ④多源性室性早搏 ⑤心房颤动

2.15 房性早搏心电图特点有()

①窦性P波提早出现 ②房性P波提早出现 ③QRS波群正常 ④QRS波宽大、切迹 ⑤不完全性代偿间歇

2.16 伤寒与副伤寒与哪些疾病相鉴别()

①血行播散型肺结核 ②败血症 ③急性血吸虫病 ④恶性疟疾 ⑤布氏杆菌病

2.17 黄疸型病毒性肝炎应和哪些疾病相鉴别()

①胆囊炎 ②胆石症 ③钩体病 ④中毒性肝炎 ⑤肝癌

2.18 肺癌患者可出现()

①杵状指 ②霍纳综合症 ③男性乳房肥大 ④声音嘶哑 ⑤腹股沟淋巴结肿大

2.19 肺结核临床分型哪些是正确的()

①支气管淋巴结结核属于原发型肺结核 ②干酪性肺炎属于血行播散型肺结核 ③结核球属于浸润型肺结核 ④发现肺结核出现空洞即是慢性纤维空洞型肺结核 ⑤干酪性肺炎属于浸润型肺结核

2.20 慢支并发症有()

①阻塞性肺气肿 ②肺原性心脏病 ③支气管扩张 ④肺结核 ⑤肺癌

2.21 洋地黄中毒表现主要有()

①泌尿系症状 ②消化道症状 ③神经症状 ④黄视、绿视 ⑤心律失常

2.22 下列哪些支持急性心肌梗塞的诊断()

①谷草转氨酶(GOT)增高 ②血钾降低 ③血沉增快 ④心电图出现异常Q波 ⑤白细胞增高

2.23 有利于出血性急性胰腺炎诊断的征象是()

①休克 ②腹膜炎 ③腰、脐部皮下瘀斑 ④血钙<8mg/dl(2.10mmol/L) ⑤播散性血管内凝血

2.24 门脉肝硬化由于性激素失调可能引起()

①男性乳房发育 ②性欲减退 ③肝掌 ④蜘蛛痣 ⑤皮肤色素沉着

2.25 肾功能衰竭的正确治疗措施为()

①治疗原发病与诱因 ②多食豆类、米、面等素食 ③发生抽搐时给予安定静注 ④贫血严重致心衰应

输血使血红蛋白恢复正常 ⑤透析疗法

3 名词解释题(每小题2分,共4分)

3.1 隐性黄疸

3.2 颈静脉怒张

4 填空题(每空0.5分,共14分)

4.1 体格检查的基本方法有:____;____;____;____和____。

4.2 强迫体位常见的有:____;____;____和____。

4.3 听诊是诊断____、____疾病的重要方法。

4.4 主动脉瓣狭窄时在____区可能触到____期震颤(猫喘)。

4.5 左心室增大时心尖搏动向____移位,右心室增大时心尖搏动向____移位。

4.6 嗜酸粒细胞增多见于____、____、____3类疾病。

4.7 正常人血浆非蛋白氮含量为____,尿素氮含量为____。

4.8 急性黄疸型肝炎,按病程经过一般可分为3期,即____、____、____。

4.9 重度哮喘发作____,经一般治疗不能缓解者称哮喘持续状态。

4.10 原发性肺癌的病因与____、____、____、____有关。

5 问答题(每小题6分,共24分)

5.1 触诊发现肝大时,应如何进行描述?并以肝癌为例说明之。

5.2 主动脉瓣关闭不全时可出现哪些体征?

5.3 试述肺气肿的X线表现。

5.4 试述甲状腺机能亢进的典型临床表现。

6 病例分析(8分)

赵××,男性,58岁。数年高血压病史,平时症状不多。某日上午突然胸前区持续性剧痛,范围较广,痛苦呻吟,急症检查上肢血压100/70mmHg(13.3/9.3kPa),心界正常,心率110次/分,律齐。胸部透视未发现异常。心电图V_{1~5}导联S-T段明显抬高,可见异常Q波。血清谷草转氨酶(GOT)轻度升高。血象:白细胞7000/mm³(7.0×10⁹/L),中性65%。

据上述病例,回答下列问题:1.完整诊断;2.诊断依据。

山东省1994年上半年高等中医自学考试

《方剂学》试题答案及评分标准

1 填空题(每空1分,共20分)

1.汗、吐、下、和、吐、清、温、补 2.中焦虚寒证
3.血瘀或出血证 4.疏散外风和平熄内风 5.霍乱吐泻
6.调胃承气汤 7.花粉、桔梗 8.滋阴清热 9.滋阴疏肝
10.痧疹透发不出 11.胸痹 12.上实下虚 13.血淋或尿血
14.瘀血留结胞宫 15.上清头目 16.下气开痞
17.化湿行水 18.行气解郁 19.祛风止痛 20.理气燥湿

2 单项选择题(每题1分,共25分)

1.③ 2.① 3.④ 4.② 5.③ 6.② 7.②
8.④ 9.③ 10.① 11.② 12.① 13.① 14.④
15.② 16.③ 17.② 18.② 19.③ 20.④ 21.③
22.③ 23.② 24.③ 25.④

3 多项选择题(每题1分,共15分)

1.①②④ 2.①②③④ 3.①②④⑤ 4.①③⑤
5.①③④ 6.①②④⑤ 7.①②③④⑤ 8.①②③
④ 9.①④ 10.①②④⑤ 11.③⑤ 12.①②③④
⑤ 13.①②③⑤ 14.①②④ 15.③④

4 默写(方歌)题(每题1分,共10分)

1.妇人脏躁性反常 2.地黄山药及茺萸 3.辛苦丹温消虚痞 4.寒热并进补兼泻 5.杏仁甘草四般施

6.脾虚痞满结心下 7.汗出恶风兼身肿 8.肝阳上亢能奏功 9.五更肾泻最相宜 10.丹麦清热更护阴

5 问答题(每题6分,共30分)

1.答案要点:①方以独活为君,取其善祛下焦与筋骨间之风寒湿邪,伍以细辛发散阴经风搜剔筋骨风湿而止痛,防风、秦艽祛风胜湿舒筋,桂心温通血脉,以助君药驱散下半身风寒湿邪而痹痛。②桑寄生、牛膝、杜仲补益肝肾,强壮筋骨;归、芍、地、芍(四物汤)养活血血;人参、茯苓,补气健脾,扶助正气,甘草且能调和诸药。③综合全方,祛邪扶正,标本兼顾,使风寒湿邪得除,气血充足,肝肾强健,痹痛可愈。

2.答案要点:①安宫牛黄丸、紫雪、至宝丹三方合称“三宝”,是凉开方中的代表方剂,均有开窍之功。②三方中安宫牛黄丸长于清热解毒,紫雪长于镇痉,至宝丹长于化浊开窍。

3.答案要点:①妇人产后气血大虚,无力以推动其败血排出体外,或稍感外寒,则更加凝滞不行,故产后血虚感寒,恶露不行之证,临床较为常见。针对产后虚寒瘀阻的特点,治疗宜补、宜活血祛瘀之法。②生化汤中重用当归以补血活血,化瘀生新,为君药,配伍川芎、桃仁活血祛瘀,为臣;佐姜温经散寒;炙甘草调和诸药,