

## 华东区 1994 年下半年高等中医自学考试

## 《中医外科学》试题

(答案下期刊出)

## 1 单项选择题(在备选答案中选出 1 个正确的答案, 每小题 0.5 分, 共 25 分)

1.1 疔的含义是( )

A. 皮肤慢性浅表溃疡 B. 皮肤急性浅表溃疡 C. 皮肤溃疡的总称 D. 粘膜浅表溃疡

1.2 疮疡早期未能消散, 必致肉腐成脓, 促使其病理转化的主要机制是( )

A. 邪气亢盛 B. 正气不足 C. 气滞血凝 D. 经络阻塞

1.3 肿疡见数脉是( )

A. 热邪内蕴, 肉腐成脓 B. 邪气亢盛, 气血不足 C. 邪实正盛, 抗邪有力 D. 邪毒深闭, 一时难化

1.4 中医外科外治方法, 一般可分为( )

A. 敷药疗法, 手术疗法, 其它疗法 B. 药物疗法, 手术疗法, 其它疗法 C. 消散法, 提脓祛腐法, 生肌收口法 D. 药物疗法, 腐蚀疗法, 结扎疗法

1.5 挂线法的适应证, 下列哪项不符?( )

A. 窦道 B. 瘰管 C. 深部脓疡 D. 病灶位于血管附近, 不宜切开者

1.6 “治外必本诸内”这种思想是谁提出的?( )

A. 汪机 B. 王焘 C. 王肯堂 D. 窦梦麟

1.7 善恶顺逆的含义是指( )

A. 病情轻重的程度 B. 疾病演变的过程 C. 脏腑功能的盛衰 D. 判断疾病的预后

1.8 红丝疔、鹅掌风是以什么命名的?( )

A. 特征 B. 形态 C. 症状 D. 病势缓急

1.9 外科望精神, 下列除( )外, 均属无神。

A. 呼吸不匀 B. 形容消瘦 C. 表情淡漠 D. 烦躁不安

1.10 外科内治法中, 下列除哪项外, 较少单独使用?( )

A. 温通法 B. 和胃法 C. 利湿 D. 化痰法

1.11 下列哪项不属“心恶”的表现?( )

A. 神昏谵语 B. 惊悸时作 C. 心烦舌燥 D. 疮色紫黑

1.12 蛇眼疔的好发部位是( )

A. 上肢 B. 下肢 C. 手指末端 D. 甲沟旁

1.13 附骨疽的发病部位, 最多见于( )

A. 胫骨 B. 股骨 C. 肱骨 D. 桡骨

1.14 一青年男性, 右侧大腿部疼痛彻骨, 肿胀, 皮色不红, 压痛显著, 叩击近膝关节处, 疼痛显著, 伴寒战发热。应诊断为( )

A. 下疳疽 B. 股阳疽 C. 历节风 D. 附骨疽

1.15 下列哪种病最易引起小腿丹毒?( )

A. 足部挫伤 B. 脱疽 C. 足癣糜烂 D. 足部疔疮

1.16 流痰是发生于( )的化脓性疾患。

A. 四肢 B. 肌肉 C. 皮肉之间 D. 骨与关节

1.17 虚陷证的病因病理是( )

A. 阴虚不足, 火毒炽盛 B. 气血两亏, 正不胜邪 C. 湿热蕴积, 毒滞难化 D. 脾肾阳衰, 生化乏源

1.18 三陷证中, 哪个证型预后最差?( )

A. 邪盛热极 B. 毒入营血 C. 正虚邪盛 D. 阴阳两竭

1.19 附骨疽初起的治疗, 内服方为( )

A. 仙方活命饮合银花甘草汤 B. 黄连解毒汤合五神汤 C. 五味消毒饮 D. 止痛如神汤

1.20 疔病的内服方, 常用( )

A. 防风通圣散 B. 龙胆泻肝汤 C. 五味消毒饮 D. 黄连解毒汤

1.21 辨别蛇头疔成脓与否, 用什么方法最为可行?( )

A. 痛剧而呈搏动性者 B. 应指验脓 C. 穿刺验脓 D. 透光验脓

1.22 乳癖病名, 最早见于( )

A. 《中藏经》 B. 《诸病源候论》 C. 《刘涓子鬼遗方》 D. 《外科精义》

1.23 一患者乳房部焮红, 漫肿极甚, 疼痛难忍, 毛孔深陷, 恶寒发热, 3 天后皮肤溃烂, 变为焦黑, 腐烂溃破, 应首先考虑什么病?( )

A. 乳痈 B. 乳疽 C. 乳发 D. 非哺乳期乳痈

1.24 一哺乳期患者发现左乳房外上象限有一直径 4cm 大肿块, 疼痛 2 天, 应诊断为( )

A. 乳癖 B. 乳病 C. 乳岩 D. 乳痈

1.25 哺乳期所患的乳房内急性化脓性疾病, 称为( )

A. 外吹乳痈 B. 内吹乳痈 C. 乳疔 D. 乳发

1. 26 “乳房结核,初如梅李,数月不疗,渐大如鸡子,串延胸胁,破流稀脓白汁,而内实相通,外见阴虚等症。”《外科大成》这段描述的是什么病? ( )  
A. 乳癖 B. 乳岩 C. 乳疔 D. 乳瘤
1. 27 乳痈发病,下列哪项是错误的? ( )  
A. 产后饮食不节,阳明胃经蕴热 B. 乳汁淤积 C. 产后乳头破碎 D. 产后冲任失调
1. 28 瘰的病因病理可归纳为 ( )  
A. 肝郁气滞血瘀 B. 气滞血瘀痰凝 C. 肝血失调,肺气失宣 D. 气滞痰凝寒滞
1. 29 不属于五脏的肿瘤有 ( )  
A. 气瘤 B. 血瘤 C. 肉瘤 D. 脂瘤
1. 30 乳头内有溢血,应首先考虑什么病? ( )  
A. 乳癌 B. 乳癖 C. 乳岩 D. 乳疔
1. 31 酒皴鼻初期称为 ( )  
A. 红斑期 B. 瘙痒期 C. 瘀血期 D. 鼻赘期
1. 32 临床运用醋泡剂,常用于哪种皮肤病? ( )  
A. 温疮 B. 股癣 C. 顽癣 D. 脚湿气
1. 33 热疮是由 ( ) 外感所致  
A. 风热 B. 湿热 C. 暑热 D. 燥热
1. 34 下列哪一项不是发生药疹的特点? ( )  
A. 特异性体质 B. 与引起反应的药量有关 C. 对药物有易感性 D. 对抗过敏药物有效
1. 35 药物性皮炎的诊断要点,下列哪项是错误的? ( )  
A. 有用药史 B. 除固定性药疹外,皮疹多为对称或广泛分布 C. 有一定的潜伏期 D. 停止用药后,常有复发倾向
1. 36 混合痔的手术治疗一般采用 ( )  
A. 切除法 B. 结扎法 C. 注射法 D. 外痔剥离,内痔结扎
1. 37 I°直肠脱垂的形态是 ( )  
A. 颗粒状 B. 环状 C. 圆锥形 D. 长柱形
1. 38 下列关于肛裂便血的叙述,哪项是正确的? ( )  
A. 血不与大便相混 B. 血与粘液相混,伴有肿物脱出 C. 量多而无疼痛 D. 量少而肛门疼痛
1. 39 内痔的主要症状是 ( )  
A. 肛门疼痛 B. 大便出血 C. 肛周搔痒 D. 肛内流脓
1. 40 直肠息肉的病因是 ( )  
A. 痰湿蕴结 B. 瘀血内停 C. 湿热下注 D. 肺脾气虚,水湿停滞
1. 41 高位肛瘘是经过 ( ) 以上的瘘管  
A. 外括约肌浅部 B. 外括约肌深部 C. 肛提肌 D. 肛门直肠环
1. 42 直肠周围注射法治疗脱肛,一般情况下,一次注药量,总共可用(注射药物为 6~8% 明矾溶液) ( )  
A. 8~10ml B. 10~15ml C. 20~25ml D. 30~50ml
1. 43 患者排便后,肛内常有块物脱出,便血量少,须用手按揉,方能回纳,视诊见痔核如拇指大小,粘膜表面带灰白色,此为 ( )  
A. 二期内痔 B. 三期内痔 C. 静脉曲张性外痔 D. 结缔组织外痔
1. 44 肛窦炎的手术治疗,可用 ( )  
A. 结扎法 B. 枯痔钉插药法 C. 挂线法 D. 切开法
1. 45 破伤风的肌肉强直性痉挛,一般先从 ( ) 开始  
A. 头面 B. 颈项 C. 背部 D. 四肢
1. 46 毒蛇咬伤后,超过 ( ) 小时,则不宜缚扎  
A. 4 小时 B. 8 小时 C. 12 小时 D. 24 小时
1. 47 毒蛇咬伤中,神经毒导致病人死亡的主要原因是 ( )  
A. 中毒性休克 B. 循环衰竭 C. 周围性呼吸衰竭 D. 肾功能衰竭
1. 48 血栓性浅静脉炎的外敷药可选用 ( )  
A. 阳和解凝膏 B. 金黄散(水、蜜调) C. 黑退消 D. 红灵丹油膏
1. 49 脓疮好发于 ( ) 患者  
A. 有淋巴管堵塞 B. 有下肢静脉曲张 C. 有下肢动脉硬化性闭塞症 D. 有下肢肌肉萎缩
1. 50 冻疮的预防措施中,哪一项是错误的? ( )  
A. 加强耐寒锻炼 B. 手、足、耳、鼻等暴露部位,予以保温防寒 C. 受冻后,需立即烤火 D. 鞋、袜、衣着应保暖,不宜过紧
- 2 多项选择题(在备选答案中选出 2~5 个正确的答案,每小题 1 分,共 25 分)
- 2.1 致痒的原因 ( )  
A. 风邪湿热 B. 津少血枯 C. 虫淫血虚 D. 气滞血瘀 E. 气虚血热
- 2.2 疥的含义是指 ( )  
A. 有传染的皮肤病 B. 专指疥疮 C. 全身性剧痒的皮肤病 D. 过敏性皮肤病 E. 虫咬皮炎
- 2.3 肿疡见滑脉是 ( )  
A. 寒滞 B. 热盛 C. 湿阻 D. 痰壅 E. 酿脓
- 2.4 主诉内容因人而异,一般是指 ( )  
A. 疾病过程 B. 诊疗经过 C. 感觉异常 D. 功能障碍 E. 身体某部形态、位置的改变
- 2.5 抽掣痛多见于下列哪些疾病? ( )

- A. 阳证疮疡化脓时 B. 石瘰 C. 失荣 D. 乳岩 E. 疔疮走黄
- 2.6 周期性疼痛见于下列哪些疾病? ( )  
A. 脱疽 B. 蛇头疔 C. 乳腺增生病 D. 失荣 E. 肛裂
- 2.7 腐蚀药与平胥药的适应证是( )  
A. 肿疡成脓未溃 B. 痔疮、瘰癧、赘疣、胬肉 C. 疮疡溃后疮口太小或僵硬 D. 溃后胬肉突出或腐肉不脱 E. 皮肤岩、阴茎岩
- 2.8 下列哪些是髂窝流注的特征? ( )  
A. 患肢不能伸直和弯曲 B. 患肢能屈不能伸 C. 行走障碍 D. 步履呈跛行 E. 不影响活动
- 2.9 髂窝流注应与下列哪些病作鉴别? ( )  
A. 环跳疽 B. 历节风 C. 髋关节流痰 D. 甲疽 E. 鹤膝风
- 2.10 疮疡中此处未愈,他处又起的,常见于( )  
A. 多发性疔 B. 有头疽 C. 流注 D. 流痰 E. 颈痛
- 2.11 乳腺增生病临床分型,可有( )  
A. 肝郁胃热型 B. 肝郁痰凝型 C. 冲任失调型 D. 肝肾阴亏型 E. 肺肾阴虚型
- 2.12 乳房望诊应注意( )  
A. 两侧乳房是否对称 B. 患者取卧位为好 C. 患者双手在背后交叉 D. 乳房皮肤有否青筋暴露 E. 乳头是否陷缩
- 2.13 下列哪些法则适用于治疗癌症? ( )  
A. 气郁则理之 B. 血郁则行之 C. 肿则散之 D. 坚则消之 E. 虚则补之
- 2.14 颠倒散洗剂可用于( )  
A. 圆癣 B. 粉刺 C. 白屑风 D. 酒皰鼻 E. 牛皮癣
- 2.15 白疔关节型的临床表现有( )  
A. 先在红斑上出现小脓疱 B. 有白疔的皮疹 C. 全身皮肤潮红脱屑及出现浸润 D. 有关节炎的症状 E. 脓疱溃烂
- 2.16 热疮常发生于( )  
A. 发际 B. 眼睑、口唇四周 C. 四肢屈侧 D. 外阴 E. 手足
- 2.17 流痰的主要病因( )  
A. 风寒侵袭 B. 肾亏髓空 C. 痰浊凝聚 D. 热毒内蕴 E. 湿久化火
- 2.18 蛇串疮皮损的特点是( )  
A. 水疱三、五成群 B. 排列成带状 C. 沿某一周围神经分布 D. 好发于皮肤粘膜交界处 E. 结痂黑色
- 2.19 诊断牛皮癣(西医称神经性皮炎)的依据是( )  
A. 皮肤初为间歇性瘙痒 B. 继而出现多个密集的扁平丘疹 C. 久之皮肤肥厚,呈苔藓样变 D. 好发于颈

- 项等处 E. 头昏头痛
- 2.20 内痔脱出嵌顿于肛门而肿痛,多为( )  
A. 气虚 B. 血虚 C. 中气下陷 D. 湿热下迫 E. 气滞血瘀
- 2.21 肛管直肠癌的主要症状是( )  
A. 排便习惯改变,便意频数 B. 大便形状变细、变扁 C. 便血色鲜红或暗红 D. 排尿不畅,排尿时疼痛 E. 肛门部坠胀感
- 2.22 硬化剂注射疗法的适应证是( )  
A. 一、二、三期内痔 B. 内痔兼有贫血者 C. 混合痔的内痔部分 D. 低位无蒂直肠息肉 E. 直肠癌早期
- 2.23 褥疮的预防可选用( )  
A. 海绵垫衬垫 B. 生肌散 C. 三石散外扑 D. 红油膏薄贴 E. 红灵酒按摩
- 2.24 血栓性深静脉炎后期的内治法则宜( )  
A. 清热利湿 B. 活血软坚 C. 温阳利水 D. 活血化瘀 E. 补肾健脾
- 2.25 脱疽的治疗,一般应( )  
A. 戒烟 B. 休息 C. 下肢保暖 D. 防治足部损伤 E. 忌食辛辣

### 3 填空题(每空1分,共10分)

- 3.1 走黄之名,始见于《\_\_\_\_\_》;是由于\_\_\_\_\_内攻脏腑而引起的一种全身性危险性证候。
- 3.2 薛立斋说:筋骨呈露曰筋痿,赤脉交结曰血瘰,皮色不变曰肉瘰,随\_\_\_\_\_曰气瘰,\_\_\_\_\_不可移曰石瘰。
- 3.3 早在晋唐时期,祖国医学文献中就提出用\_\_\_\_\_药物和动物的\_\_\_\_\_口服治疗瘰癧。
- 3.4 肛瘘若只有\_\_\_\_\_口而无\_\_\_\_\_口,称外瘘。
- 3.5 烧伤重症,内治原则以\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_为主。

### 4 问答题(共40分)

- 4.1 疮疡各期的外治原则和方法如何?试举其常用方药。(8分)
- 4.2 瘰癧辨证有哪些要点?(8分)
- 4.3 乳痈如何辨治?(8分)
- 4.4 脓疱疮的湿热证和脾虚证各有哪些特点?治则和用方是什么?(8分)
- 4.5 内痔结扎疗法的禁忌证有哪些?(4分)
- 4.6 脱疽和肢体动脉硬化性闭塞症如何鉴别?(4分)

## 提供空心胶囊

型号: 0#(装药量 0.3 克~0.5 克); 1#(装药量 0.1 克~0.3 克); 2#(装药量 0.1 克以下)

价格: 135 元/万粒(含邮资)。

为保证质量,壹万粒以上办理邮购业务。需要者请通过邮局汇款至浙江越州制药有限公司 潘炎锋收,地址:浙江新昌,邮编:312560,电话:(0575)6060338。