

木香 6g, 山萸肉 15g, 大枣 15g。

气虚血瘀, 脑神失调(6例): 情感淡漠, 偶有易怒, 气短懒言, 时而妄闻, 体乏无力, 女性经黯衍期, 唇紫黯淡, 或舌有紫点, 脉沉细。治拟益气活血, 调养脑神之法。药用: 生黄芪 60g, 茯苓 60g, 党参 15g, 山药 30g, 枸杞子 20g, 红花 15g, 赤芍 30g, 怀牛膝 30g, 当归 15g, 百合 60g, 麦冬 30g 等。

以上各型患者均为每日服 1 剂, 早晚分服, 30~60 剂为一疗程。

2.2 治疗结果: 经阴性症状评定量表(SANS)评定, 治疗前为 50.70 ± 15.45 分, 治疗后为 30.95 ± 13.38 分, 治疗后较治疗前评分降低了 19.75 ± 9.37 分。症状全部消失, 自知力恢复, 评为痊愈 66 例(54.10%); 症状消失或减轻, 自

知力未恢复, 评为好转 55 例(45.08%); 症状无改善, 评为无效 1 例(0.82%)。

3 讨论

据本组病例观察, 在虚性证候中, 脾虚者 25 例, 其中偏执型 16 例(64%), 青春型 3 例(12%), 其他型 6 例(24%); 肾虚者 40 例中, 偏执型 14 例(35%), 青春型 1 例(2.5%), 其他型 25 例(62.5%)。故不难看出, 病程在 3 年以上的精神分裂症病人中, 脾虚者以偏执型居多, 肾虚者以其他型居多, 而青春型在虚证病例中则极为少见。在 25 例脾虚病人中, 痊愈 17 例(68%); 在 40 例肾虚病人中, 痊愈 14 例(35%)。故可看出, 脾虚肾虚虽同属虚证, 在临床治疗上, 补肾之虚较为困难。肾主一身之元气, 肾精亏虚则缠绵难愈, 预后不佳。

活血化瘀法治疗男性免疫性不育 14 例

袁茂云*

笔者近几年内, 采用辨证与辨病相结合的方法, 收治了 14 例血清抗精子抗体(ASb)阳性, 精液自凝的患者, 运用活血化瘀法治疗, 取得了较为理想的疗效, 特报导如下, 供同道参考。

1 临床资料

14 例患者均系门诊患者, 最大年龄为 34 岁, 最小为 25 岁, 平均年龄为 28.5 岁, 配偶同居, 妇检及有关检查均无异常, 婚后 1.5~3 年内不育者 12 例, 3 年以上者 2 例。精液检查, 有不同程度的自凝, 血清抗精子抗体均为阳性; 14 例患者中, 2 人否认手淫史, 12 人婚前都有程度不同的手淫史; 14 名患者中伴有前列腺炎者 11 例; 作血液流变学检查 14 例均高于正常值, 其中血小板粘附率升高明显。中医辨证属单纯瘀血型 7 例, 症见: 无明显自觉症状, 性生活正常, 仅见口唇紫暗, 舌暗红, 舌下静脉紫暗; 瘀血兼夹肾气(阳)虚者 4 例, 症见: 腰膝酸软, 早泄, 或举而不坚, 或性欲淡漠; 瘀血兼挟阴虚者 2 例, 症见: 形瘦, 五心烦热或阳事易举; 瘀血兼挟气虚者 1 例, 症见: 神倦乏力, 嗜卧, 不耐疲劳, 易汗。

2 治疗方法

方选桃红四物汤加味, 桃仁、当归、川芎、王不留行、路路通、仙茅各 10g, 赤白芍、牛膝、仙灵脾、熟地各 15g, 甲珠、红花各 6g。肾气(阳)虚者加用五子衍宗丸; 阴虚者去二仙, 加用生地 20g, 并加服二至丸, 知母 10g; 气虚者加用黄芪 50g, 黄精 15g。每日 1 剂, 30 天为 1 疗程, 1 疗程完毕复查精液及血清 ASb, 不效再服 1 疗程, 一般均服用 2 个疗程左右, 服药期间忌生冷油腻之品, 节房事。

3 疗效标准及结果

治疗 2 疗程后, 临床症状缓解, 抗精子抗体转阴性, 自凝消失, 配偶受孕, 评为显效者 4 例; 治疗后复查抗精子抗体转阴性, 精液检查自凝现象消失, 评为有效者 9 例, 服药 3 个疗程后复查血清、精液均无改变评为无效者 1 例。

4 体会

男性精子自凝, 血清抗精子抗体(ASb)阳性, 称为免疫性不育, 笔者根据所搜集资料发现多数患者在婚前有程度不同的手淫史, 以及现伴有前列腺炎病史, 从症候上发现有不同的瘀血表现, 尤以唇舌青紫、舌下静脉瘀滞为显著, 血液流变学异常, 整个疾病过程表现与瘀血密切相关, 故而治疗上从活血化瘀方面着手, 取得了较为理想的疗效。

* 江西医学院第一附属医院, 江西省南昌市 (330006)

收稿日期: 1991-06-17; 修回日期: 1991-10-18