

如刘某,男,60岁,农民,于1989年10月25日就诊。因反复鼻衄10余年,每于秋冬季节发作,出血呈间歇性,或渗出,或如泉涌状,经中西医反复治疗效不巩固。此次鼻衄月余,间歇性涌出,夜间发作较多,五官科检查:出血部位不明,经局部用药及注射抗炎止血药物均未控制,患者面色苍白,咽干口燥,渴不欲饮,便结溲短,脉细数,舌红少津,辨证属肺胃阴虚,虚火上扰致鼻衄,服上方8剂获愈,随访2年未复发。

2 百日咳并发衄血:百日咳痉咳期,由于肺气上逆致气血上行,常见鼻衄、眼衄、舌衄或面部浮肿瘀斑,此期单纯以紫草煎服,能获得满意效果。笔者用此方治疗小儿百日咳并发衄血37例,治愈24例,显效9例,好转4例。如治倪某,男,5岁,于1984年3月21日就诊。因阵咳2月余,咳嗽发作时面红耳赤,涕泪交流,口唇紫绀,1月前经儿科检查,拟诊:百日咳,给予西药间断治疗,症状未减,要求中医诊治。诊见:眼睑浮肿,结膜瘀斑,咳作时鼻血如涌,内眦亦渗血,脉细数,舌暗红、苔薄黄,指纹青紫,辨证属风热犯肺,肺热络伤,肺失肃降,气火上逆所致,给予紫草100g,文火煎煮2次,每次煎沸30分钟,两煎混合浓缩成300ml,再以冰糖100g加热溶化成糖浆,1日4次口服,每次15ml,连服5天后咳减血止,二诊再以原药量续服5天获愈。紫草有活血宣肺、泄热利肠作用,肺与大肠相表里,瘀热得泄,肺气得降,因而血止瘀消,咳嗽缓解。

3 血淋:此症尿色红赤,尿频急伴灼热作痛为主症,多见于尿路感染及泌尿系结石患者。紫草咸寒滑利,可清热散结凉血,止血而不塞,凉血而不壅,用于血淋症可使血尿及尿路刺激症状迅速减轻。笔者以紫草为主组方治疗血淋58例,其中输尿管结石继发感染32例,急性膀胱炎15例,前列腺炎10例,精囊炎1例。治愈37例,显效13例,好转6例,无效2例(老年性前列腺炎)。

如治王某,男,38岁,农民,于1991年10月29日就诊。因强力劳动后突然左侧腰腹部阵发性酸痛,继而出现尿出不畅伴血尿,溺时茎中

灼热作痛,舌尖红、苔薄黄,脉数有力。尿检:红细胞满视野,白细胞(+),脓细胞(+++)。B超提示:左侧肾盂积水伴左输尿管上端结石,辨证为湿热阻滞下焦,化火灼阴,热伤阴络,故尿血而痛,予清热泻火,通淋排石方:紫草30g,金钱草30g,王不留行子20g(焙熟研冲),生大黄12g(后下),甘草6g。浓煎2次早晚分服。服1剂后疼痛及血尿减轻,3剂后症状消失,服15剂后排出结石1枚,B超复查:积水及结石消失,尿检正常。

紫草外洗可除疣 内服可通调水道

甘肃中医学院附属医院(兰州730020)

刘 树 华

紫草,甘咸气寒,无毒,入心、肝经。其色紫,专入血分,故能行血;其气寒,可凉血解毒,故能治肿毒痈疽。历代医籍对其功效多有阐述,如:《别录》云:“通水道,疗肿胀满痛……”;《药鉴》曰:“其味苦,故能通窍利水”;又曰:“大都血家药也……但见血紫血热,及热毒深者,俱宜用之。”

临床习用于血热毒盛,痘疹欲出不畅,及斑疹血热毒盛而色不红活等证,常与凉血、活血、解毒、透疹的药物配伍。也可用做预防麻疹和流行性感使用。因其有滑肠泻下的作用,故脾弱便溏者慎用。

余临证用紫草水煎外洗治疗扁平疣,内服通调水道有一定的体会。

扁平疣,俗称扁瘁,是一种病毒性皮肤病。好发于青年人的颜面、手背、颈项等处。其状扁如芝麻大或粟粒大,浅褐色,界线明显,略有痒感。笔者用自拟“紫草消疣洗剂”治疗扁平疣32例,其中男性19例,女性13例,年龄在15~25岁之间。发病部位:面部17例,手背部9例,颜面及颈项、手部同时发病6例。病程最长者17个月,最短者20天。大多经过板蓝根注射液、病毒灵等药物治疗无效。“紫草消疣洗剂”由紫草30g,板蓝根40g,马齿苋50g,土茯苓40g,生苡仁40g,白芷12g组成。治疗方法:煎汤外洗,每日1剂,每次煎煮20分钟,两次共煎药水

300ml。洗前先将患处用温开水洗净,再将药液加温,趁温反复温洗患处,每洗20~30分钟,每天洗2~3次。每天洗第1次时可将手指搔破扁平疣的表皮,以微出血为度,然后反复温洗患处。每洗7剂为1疗程。使用上述方法外洗扁平疣32例,其中痊愈26例,部分脱落6例。

曾治王某,男,15岁,学生,1987年3月初诊。主诉:脸部散在发起扁平疣5个月,经注射维生素B₁₂、口服病毒灵等无效,余给予“紫草消疣洗剂”7剂,10日后复诊疣赘全部脱落而愈。

紫草通调水道适用于下焦湿热而致的热淋,其症状以尿急、尿频、尿痛和尿意不尽为主要临床表现,在治疗时可与其他利尿通淋之品配伍,常可提高治疗效果。

曾治李某,女,37岁,干部。主诉:尿急、尿频、尿痛已5日。伴有小便灼热量少,纳差乏力,便秘。月经正常,无白带。尿常规检查:白细胞+++ ,红细胞±,尿细菌培养阴性。诊断为泌尿系感染。前医曾予八正散加减3剂后症状无明显改善,遂邀余诊治。观其舌苔薄黄,脉象弦细小数,此乃热淋。仍予八正散加紫草治疗。处方:瞿麦15g,萹蓄15g,紫草20g,木通10g,车前子10g,栀子10g,滑石10g,甘草6g。取3剂,每日水煎服1剂,并嘱其停用任何药物治疗。3日后复诊,诉药后尿急尿痛尿频明显改善,小便灼热消失。尿常规检查:白细胞+,效不更方,再进3剂而收功。

紫草治疗淋病尿道狭窄

河北省抚宁县中医院(河北066300)

张润民

余在临床实践中,用紫草治疗淋病尿道狭窄,获得显著疗效,现简介如下。

淋病尿道狭窄,属中医淋证范畴,因其主要由性事混乱所致。该症是由于淋球菌粘附于尿道后,在粘膜细胞中生长繁殖,引起尿道炎症反应,造成粘膜红肿,分泌物和脓液增加,致使尿道变窄。其症状有不同程度的排尿困难,滴沥不尽,甚或尿时茎痛难忍,常令患者苦不堪言。本病大多由于急性期失治、误治所致,又发生于淋

病后期,西药效果往往不佳。笔者采用紫草20~30g,水煎,每日3次空腹服用,共治疗62例男性患者,有婚外性行为者43例,配偶感染者19例。年龄最小为23岁,最大为56岁。病程最短者半年,最长者5年。62例均经尿道分泌物涂片,在多核细胞内见到革兰氏阴性双球菌。前列腺及按摩液培养淋球菌阳性。全部病例均反复发作3次以上。62例经采用上法治疗,以症状、体征完全消失,尿道分泌物涂片、培养淋球菌3次阴性者评为痊愈,有50例;以症状、体征改善,尿道分泌物涂片或培养仍有淋球菌者评为好转,有12例。好转患者中有9例因出差中途停止治疗,有3例间断治疗。62例疗程最短者7天,最长者25天。

如治魏某,男,25岁,工人。1992年3月11日就诊。自诉半年前有婚外性行为,尿道口红肿流脓,排尿时灼痛。经某市医院泌尿科确诊为急性淋病。因出差在外未接受正规治疗,仅口服氟哌酸等西药,病情时好时坏。后因再次有不洁行为,经青霉素、氟哌酸等针药治疗,虽可缓解3~5天,但数日后又复发。刻诊:尿道口红肿,时溢粘稠脓液,排尿时点滴而出,茎痛如刀割。舌质红、苔黄腻,脉滑数。采用单味紫草30g,水煎后分3次空腹服。5剂后,尿道口红肿、茎痛减半。续服6剂后,尿道口无红肿、溢脓,茎痛消失,排尿畅快,舌脉正常。尿道分泌物3次涂片:未找到革兰氏阴性双球菌,淋球菌培养3次阴性。追访2年无复发。

• 征 文 •

第三届全国中医儿科临床与教学交流会定于1996年9月在辽宁省沈阳市举行,现将征文及有关事宜通知如下:

征文内容:1. 小儿肺炎的中医、中西医结合的临床与研究。2. 小儿病毒性心肌炎的临床与研究。3. 各种小儿常见病、疑难病的中医药预防、治疗与研究。4. 特殊疾病、特种疗法的观察与个案报告。5. 中医儿科临床理论教学(教学方法、教学改革、电化教学、教具研究)的经验与体会。6. 中医儿科临床护理、教学与研究。

征文要求:1. 来稿以论著、综述、临床及工作总结、经验体会、报告等形式均可。2. 来稿寄全文(1500~3000字)及400字以内摘要各一份,用稿纸抄写清楚(自留底稿)。来稿务必写清姓名、单位通讯地址、邮政编码、联系电话以便联系。3. 本次会议学术论文将由国家级杂志出版论文专刊,故请在来稿同时邮寄审稿费20元(请从邮局单独寄,不要在信件中央带)。4. 来稿及汇款请寄:辽宁中医学院附属医院儿科 胡翠华郭振武收。邮编:110032。5. 截稿日期:1996年6月30日

联系电话:(024)6909114 转2124(办公室);6237442(办公室);(024)6210730(宅)