

300ml。洗前先将患处用温开水洗净,再将药液加温,趁温反复温洗患处,每洗20~30分钟,每天洗2~3次。每天洗第1次时可将手指搔破扁平疣的表皮,以微出血为度,然后反复温洗患处。每洗7剂为1疗程。使用上述方法外洗扁平疣32例,其中痊愈26例,部分脱落6例。

曾治王某,男,15岁,学生,1987年3月初诊。主诉:脸部散在发起扁平疣5个月,经注射维生素B₁₂、口服病毒灵等无效,余给予“紫草消疣洗剂”7剂,10日后复诊疣赘全部脱落而愈。

紫草通调水道适用于下焦湿热而致的热淋,其症状以尿急、尿频、尿痛和尿意不尽为主要临床表现,在治疗时可与其他利尿通淋之品配伍,常可提高治疗效果。

曾治李某,女,37岁,干部。主诉:尿急、尿频、尿痛已5日。伴有小便灼热量少,纳差乏力,便秘。月经正常,无白带。尿常规检查:白细胞+++ ,红细胞±,尿细菌培养阴性。诊断为泌尿系感染。前医曾予八正散加减3剂后症状无明显改善,遂邀余诊治。观其舌苔薄黄,脉象弦细小数,此乃热淋。仍予八正散加紫草治疗。处方:瞿麦15g,萹蓄15g,紫草20g,木通10g,车前子10g,栀子10g,滑石10g,甘草6g。取3剂,每日水煎服1剂,并嘱其停用任何药物治疗。3日后复诊,诉药后尿急尿痛尿频明显改善,小便灼热消失。尿常规检查:白细胞+,效不更方,再进3剂而收功。

紫草治疗淋病尿道狭窄

河北省抚宁县中医院(河北066300)

张 润 氏

余在临床实践中,用紫草治疗淋病尿道狭窄,获得显著疗效,现简介如下。

淋病尿道狭窄,属中医淋证范畴,因其主要由性事混乱所致。该症是由于淋球菌粘附于尿道后,在粘膜细胞中生长繁殖,引起尿道炎症反应,造成粘膜红肿,分泌物和脓液增加,致使尿道变窄。其症状有不同程度的排尿困难,滴沥不尽,甚或尿时茎痛难忍,常令患者苦不堪言。本病大多由于急性期失治、误治所致,又发生于淋

病后期,西药效果往往不佳。笔者采用紫草20~30g,水煎,每日3次空腹服用,共治疗62例男性患者,有婚外性行为者43例,配偶感染者19例。年龄最小为23岁,最大为56岁。病程最短者半年,最长者5年。62例均经尿道分泌物涂片,在多核细胞内见到革兰氏阴性双球菌。前列腺及按摩液培养淋球菌阳性。全部病例均反复发作3次以上。62例经采用上法治疗,以症状、体征完全消失,尿道分泌物涂片、培养淋球菌3次阴性者评为痊愈,有50例;以症状、体征改善,尿道分泌物涂片或培养仍有淋球菌者评为好转,有12例。好转患者中有9例因出差中途停止治疗,有3例间断治疗。62例疗程最短者7天,最长者25天。

如治魏某,男,25岁,工人。1992年3月11日就诊。自诉半年前有婚外性行为,尿道口红肿流脓,排尿时灼痛。经某市医院泌尿科确诊为急性淋病。因出差在外未接受正规治疗,仅口服氟哌酸等西药,病情时好时坏。后因再次有不洁行为,经青霉素、氟哌酸等针药治疗,虽可缓解3~5天,但数日后又复发。刻诊:尿道口红肿,时溢粘稠脓液,排尿时点滴而出,茎痛如刀割。舌质红、苔黄腻,脉滑数。采用单味紫草30g,水煎后分3次空腹服。5剂后,尿道口红肿、茎痛减半。续服6剂后,尿道口无红肿、溢脓,茎痛消失,排尿畅快,舌脉正常。尿道分泌物3次涂片:未找到革兰氏阴性双球菌,淋球菌培养3次阴性。追访2年无复发。

• 征 文 •

第三届全国中医儿科临床与教学交流会定于1996年9月在辽宁省沈阳市举行,现将征文及有关事宜通知如下:

征文内容:1. 小儿肺炎的中医、中西医结合的临床与研究。2. 小儿病毒性心肌炎的临床与研究。3. 各种小儿常见病、疑难病的中医药预防、治疗与研究。4. 特殊疾病、特殊疗法的观察与个案报告。5. 中医儿科临床理论教学(教学方法、教学改革、电化教学、教具研究)的经验与体会。6. 中医儿科临床护理、教学与研究。

征文要求:1. 来稿以论著、综述、临床及工作总结、经验体会、报告等形式均可。2. 来稿寄全文(1500~3000字)及400字以内摘要各一份,用稿纸抄写清楚(自留底稿)。来稿务必写清姓名、单位通讯地址、邮政编码、联系电话以便联系。3. 本次会议学术论文将由国家级杂志出版论文专刊,故请在来稿同时邮寄审稿费20元(请从邮局单独寄,不要在信件中央带)。4. 来稿及汇款请寄:辽宁中医学院附属医院儿科 胡翠华郭振武收。邮编:110032。5. 截稿日期:1996年6月30日

联系电话:(024)6909114 转2124(办公室);6237442(办公室);(024)6210730(宅)