DOI:10.13288/j.11-2166/r.2007.10.024

丹参10g，炮穿山甲5g，皂角刺10g，每日1剂，水煎服。局部配合金黄膏外敷，每日1次。用药4天后，患者体温36.5℃，咽喉爽，咳痰止，泛恶停，腹痛减，里滞行，矢气频。上方稍作加减，续治1周，体征消失，复查血常规：白细胞计数4.8×10^9/L，中性粒细胞0.48，B超：右下腹未见明显包块。随访1年未再复发。

本例肠痈系由劳作汗出，脱衣感寒，腠理失固，外邪乘隙内侵肺道，郁而化热，邪热迫肺，肺气失宣，大肠与肺相表里，下扰大肠，大肠气滞，与气血积于肠中阑门，成瘀化热为痈。方中重用红藤，配以败酱草、枳实、制大黄泄浊荡积，通腑导下；辅以黄芩、芦根、瓜蒌散热化痰宣肺清上，使得浊祛热降，肠肺两清，痈疾可除。

红藤治疗前列腺炎

吉化集团公司总医院(132022)

张 忠 奎

红藤性味苦平，归大肠经，具有清热解毒、活血止痛功效，历来被用于治疗肠痈腹痛及跌打损伤、妇女经痛、风湿关节疼痛等。笔者10余年来用其治疗前列腺炎取得很好的疗效。现举例介绍如下。

赵某某，男，39岁，已婚。自诉平素性事频繁，嗜好烟酒。于1年前出现会阴部坠胀疼痛，且逐渐加重，伴尿频，性功能严重减退。曾多处求医，服用多种补肾壮阳药物均无效。现症：会阴部坠胀疼痛，腰骶部酸痛，甚则不能入睡，尿频，淋漓不爽，每于排尿后或大便用力时于尿道口有白浊流出，阳痿，腰膝酸软，倦怠乏力，心烦口干，尿黄赤，大便干，舌质暗红有瘀点，苔黄腻，脉弦滑。肛门指检：前列腺略增大，质较韧，中间沟存在，左右叶均有触痛，右叶有一1.5cm×1.0cm结节。前列腺液常规：卵磷脂小体30%，白细胞10～12个/HP，上皮细胞4～6个/HP。诊断：慢性前列腺炎；阳痿。考虑患者喜嗜烟酒，素体湿热内盛，且平素性事过频，致残精败液滞于精道，蕴而化热，湿热互结，日久气滞血瘀，经脉瘀阻，酿生本病。治以清热利湿，活血祛瘀。方药：红藤30g，王不留行30g，蒲公英20g，黄柏20g，车前子15g(包煎)，灯心草5g，穿山甲10g，皂角刺10g，玄参20g，牛膝20g，生甘草5g。每日1剂，水煎服。嘱其禁忌烟酒及辛辣刺激之品，避免久坐，多泡热水浴。上方连服21剂后，会阴部疼痛坠胀、尿频等症状消失，性功能明显恢复，但阴茎勃起不能持久，腰膝酸软，手足心热，舌红苔薄黄，脉弦细数。上方去穿山甲、皂角刺、灯心草，加生地黄、知母、牡丹皮各20g，山茱萸、山药、菟丝子、枸杞子、五味子各15g，续服20剂，症状消失，性功能恢复正常。肛门指检：前列腺大小正常，结节消失，无触痛。前列腺液检查正常。随访2年未复发。

红藤治疗尿路感染

吉林油田总医院(138006)

崔 俊 起

红藤味苦，性平。归肝、膀胱、大肠经。功效：清热解毒，祛瘀止痛；主治乳痈及风湿热痹等症。笔者在临床工作中，常用于治疗尿路感染，尤其慢性迁延难愈者，收到良好效果。举例如下。

患者李某，女，37岁。因尿频、尿急、尿中灼热涩痛10天，伴尿液混浊、尿道口不适及小腹隐痛而来诊。自诉在诊所已静脉滴注左氧氟沙星注射液5天，尿涩痛稍减轻。尿检：白细胞61个/μl，红细胞47个/μl；细菌数14311个/μl；上皮细胞26个/μl。症见：尿频数、尿急、尿涩痛灼热感，小腹隐痛及尿道口不适，乏力神疲，口干舌红、苔薄黄，脉滑数。证属淋证(湿热下注膀胱)；治以清热解毒，利湿通淋；处方：红藤50g，白茅根25g，白花蛇舌草20g，土茯苓20g，蒲公英25g，鱼腥草20g，马鞭草20g，鹿衔草15g，生甘草20g。每日1剂，水煎服，用药1周，症状基本恢复，尿常规复查，正常范围，再投3剂善后。

泌尿系感染属中医"淋证"范畴，治当清热解毒，利湿通淋。临床体会红藤除具有清热解毒作用外，尚有通淋之功，常配伍白茅根、白花蛇舌草等药治疗泌尿系感染，作用显著。据现代药理研究报道，该药对大肠杆菌、绿脓杆菌、卡他球菌、金黄色葡萄球菌及乙型链球菌均有抑制作用，并能提高机体耐缺氧能力。红藤是治疗淋证的良药。

红藤治疗慢性盆腔炎

山西省河津市中医医院(043300)

张 建 明

笔者于1998～2003年，以红藤为主治疗慢性盆腔炎38例，收到较好疗效。现举例如下。

侯某，女，27岁。主诉：婚后4年未孕，经常腹痛，时轻时重，腹部和腰骶部酸痛坠胀。带下淋漓，时黄时白，时带红色，味腥臭。常在性交后和经前加剧，同时经量增多。曾数次静脉滴注青霉素、庆大霉素及甲硝唑，可短暂见轻，不久又加重。现症：脉象滑数，舌质红，苔黄厚腻。右下腹可触一条索状物，触痛(+)。并可触及一鸽蛋大包块。B超显示：右侧输卵管增粗、积水，其下方可探及一4cm×3cm的炎性包块。此乃慢性盆腔炎，属湿热毒久蕴，痰瘀互结而致。药用：败酱草30g，忍冬藤15g，牡丹皮10g，皂角刺9g，冬瓜子30g，黄柏12g，土茯苓15g，甘草6g。药进14剂，腹部及腰骶部痛胀见轻，带量略减，腹部条索状物及包块依然。守上方加红藤30g，

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net