DOI:10.13288/j.11-2166/r.2008.02.021

· 专题笔谈 ·

红藤治疗胸痹心痛效佳

宁夏回族自治区青铜峡市中医院(751600)
邓 存 国

笔者临床中根据不同证型配伍,重用红藤治疗胸痹心痛,每获良效,现介绍如下。

刘某某,男,58 岁,2004 年 10 月 23 日初诊。患冠心病 2 年余,心前区憋闷疼痛时有发作,近 1 个月因劳累心情不畅病情加重,发作次数增多,每日 2～3 次,舌下含服消心痛可以缓解,后又服用中西药旬余疗效不显。症见:心前区不适,憋闷刺痛,心悸气短,神疲乏力,烦躁失眠,舌质紫暗、有散在瘀点,舌苔黄腻,脉涩而结。心电图:Ⅱ、Ⅲ、aVF、V_3、V_5 T 波倒置,Ⅱ、aVF、V_5 S-T 段水平压低 0.07mV,Q-T 时限偏长。中医辨证属气滞血瘀,心脉痹阻。治宜活血化瘀,理气通络。处方:红藤 40g,瓜蒌 15g,薤白 15g,丹参 15g,郁金 15g,枳壳 15g,红花 15g,降香 12g,五灵脂 12g。水煎,分 2 次温服,服药 3 剂后,心前区憋闷疼痛消失,余症减轻,效不更方,再进 15 剂,复查心电图各导联均恢复正常。继续按此方加减出入,又服 20 余剂后病情稳定,诸症悉除。随访半年,未见复发。

《素问·痹论》云:"心痹者,脉不通"。胸痹心痛病机为血脉瘀滞,心脉痹阻,不通则痛。《本草图经》谓:红藤"行血,治气块",具有活血散瘀,行气止痛之功效,据现代药理研究,红藤可扩张冠状动脉,增加冠脉流量,缩小心肌梗死范围,提高耐缺氧能力,且可抑制血小板聚集,防止血栓形成,故治疗本病效佳。

红藤治疗慢性糜烂性胃炎

湖北省鄂州市花湖卫生院(436054)
叶 碧 青

红藤临床主治肠痈腹痛,热毒疮疡,跌打损伤,经闭痛经,风湿痹痛等。笔者用于治疗慢性糜烂性胃炎,疗效满意,举例如下。

徐某某,男,31 岁。2005 年 1 月 3 日就诊。自述胃脘胀痛 1 年,伴反酸、嗳气,以饭后为甚。胃镜检查诊断为慢性糜烂性胃炎(Ⅲ级)。舌红、苔白,脉弦缓,掌心有骨蒸感。证属肝胃郁热湿阻。治当解毒为先,祛湿热并进,兼益气健脾,理气和中。处方:红藤 20g,水牛角 20g,牡丹皮 15g,半边莲 10g,黄连 8g,吴茱萸 2g,黄柏 10g,苍术 10g,乌贼骨 10g,枯矾 10g,薏苡仁 20g,冬瓜子 20g,茯苓 20g,怀山药 20g,人参 8g,白芍 15g,白及 15g,砂仁 6g,木香 6g。服用 4 剂诸症减轻,再进 15 剂后诸症消失。上药制为散剂继服 1 个月以巩固疗效。药尽胃镜复查无异常发现。

红藤治疗皮肤病

山东省泰安市协和医院(271000)
高 广 元
山东省泰安市建筑职工医院
马 勇

红藤用于清热解毒、消肿散结。笔者在主方基础上,加重红藤用量,治疗皮肤病多例,现作一介绍。

例 1:曹某某,女,65 岁。2003 年 10 月初诊。全身干燥而痒 30 余年,长年用药治疗,未能根除。冬春季加重,洗浴痒感增剧,心烦难眠。口干喜饮,全身皮损搔痕新旧交替,痒无定处,舌质暗红、微紫,望之无津,双脉细数。辨证:肝阴亏虚,血燥生风。处方:黑芝麻 15g,桑椹子 10g,生何首乌 20g,生地黄、熟地黄各 15g,丹参 30g,荆芥 9g,侧柏叶 9g,牡丹皮 9g,夜交藤 20g。水煎服。服 7 剂后稍有缓解。仍时有燥痒,原方增红藤 50g。二诊症状减轻,偶有小痒。守方服 2 周而愈。追访数年未复发。

例 2:范某某,男,35 岁。1987 年 5 月来诊。湿疹 5 年,久治或效或无效,此次发作较重。耳垂颧周及手背指间散布米粒大小疱疹,流少量液体与结痂交替,双侧对称,皮质变厚皲裂与褶痕交织,心烦口臭,舌鲜红、苔黄腻而厚,脉滑数。"诸痛痒疮,皆属于心",证属心胃湿热郁滞,清利湿热疏络止痒,宜当归拈痛汤。增苦参用量 15g,加红藤 50g。水煎服。共服 30 剂康复。

红藤验方三则

安徽省岳西县头陀镇卫生院(246640)
金 家 顺

红藤性味苦平,归大肠经。功能清热解毒,活血止痛。笔者用于痛经、肠痈及肠道寄生虫病,屡验屡效。

1 痛经

若七情抑郁,劳伤气血,房室不节等,导致冲任受

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net