

损,胞宫藏泻功能异常,经血不循常道蓄积体内而成瘀血,瘀血既为痛经之病理产物,又为痛经之病因病机,瘀是产生痛经的关键。另外,痛经患者除瘀血表现外,较多患者出现经期发热,口干便秘,舌质红等热象,而且大部分患者病程较长,瘀久化热,瘀热互阻,冲任失调,胞脉血滞而致瘀。故治以活血清热,化瘀通络,重用红藤 60g,配以败酱草 20g,生蒲黄 10g,生五灵脂、炒五灵脂各 10g 组方,每日 1 剂,连服 5 剂,未愈者下一次月经前 10 天再服 5 剂。

2 肠痈

阑尾炎可参考肠痈辨治。急性阑尾炎用红藤 60g,配伍地榆、当归、黄芩各 15g,金银花 20g,玄参 25g,麦冬 12g,薏苡仁 30g,水煎服,每日 1 剂,一般服 4~6 剂可愈。慢性阑尾炎用红藤 60g,配厚朴、桃仁、大黄、金银花各 20g,水煎分 3 次服,每日 1 剂,连服 5 剂。

3 肠道寄生虫病

肠道寄生虫病,症见绕脐腹痛,呕吐涎沫,不思饮食,或善饥多食,嗜食异物,耳、鼻、肛门瘙痒,久则出现面黄肌瘦,形瘦腹大,或浮肿乏力等。笔者用红藤浓煎液冲服红糖治疗。成人用红藤 60g 煎 2 次药液合并加红糖 60g 溶化,早晚各服一半。7~12 岁儿童红藤、红糖减半,3~6 岁儿童红藤 15~20g,红糖 20g 煎服法同上。用此法治疗 30 例,均收到较好的效果。

红藤治疗盆腔炎有佳效

吉林省通榆县中医院 (137200)

单保杰 姜金耀

红藤味苦、性平,功能清热解毒,活血止痛。我们以红藤为主,组成一藤二花三草汤治疗急、慢性盆腔炎取得满意疗效,举例介绍如下。

例 1 王某,女,36 岁。2003 年 7 月 2 日初诊。自述淋雨后发热 2 天,伴口干苦、头晕、倦怠、食少,继则少腹刺痛,黄白带下有味,尿黄并有灼热感,大便干。舌质红,苔厚腻微黄,脉弦数。体温 38.5℃,心肺、血压无异常,腹平软,肝脾未及,下腹部触痛,无反跳痛。血常规:白细胞 15.6×10⁹/L,分叶核 0.80,淋巴细胞 0.20。B 超示:子宫前位,内部回声欠均匀,双侧附件增厚,于子宫直肠窝见不规则液性暗区。妇科检查:子宫内膜增厚,宫颈轻度糜烂。后穹窿穿刺抽出炎性渗出液。诊断:急性盆腔炎,属湿热下注型,治以清热利湿,凉血解毒。处方:红藤 30g,金银花 20g,败酱草 20g,车前草 20g,金钱草 20g,大黄 15g,滑石 15g,栀子 10g,蒲公英 20g,川楝子 15g。每日 1 剂,水煎分 3 次饭后服。西药

抗生素常规治疗。1 周后体温正常,症状消失,微觉少腹疼痛,复查 B 超示渗出液吸收。停用抗生素,继服中药:红藤 30g,金银花 20g,败酱草 15g,车前草 15g,金钱草 15g,延胡索 15g,川楝子 15g,乌药 15g。每日 1 剂,7 剂善后。

例 2 谭某,女,46 岁。既往有慢性盆腔炎史。近日觉下腹部疼痛加重,拒按,腰痛伴沉重感,白带量多,纳差,便干、尿黄。舌红,苔黄腻,脉弦滑。妇科检查:阴道畅,内有少量褐色血液,宫颈糜烂。B 超:子宫体境界不清,双侧附件增厚,于子宫直肠窝内见不规则液性暗区。诊断:慢性盆腔炎,属肝郁湿热型。治以清热利湿,理气解毒。处方:红藤 30g,金银花 20g,败酱草 20g,车前草 15g,金钱草 15g,穿山甲 15g,延胡索 15g,赤芍 15g,丹参 20g,川楝子 15g。每日 1 剂,前后加减共服 20 剂,诸症消失,随访未复发。

重用红藤治疗盆腔包块

辽宁省鞍山市中医院妇科 (114004)

张颖

红藤性味苦、平,归大肠经。功能清热解毒,活血散瘀。笔者重用红藤治疗妇科盆腔包块 15 例,取得满意疗效,举例如下。

李某某,女,35 岁。2003 年 2 月 9 日初诊,右小腹疼痛 2 天。患者 1 月 30 日月经来潮,持续 4 天血止,因工作劳累潮湿,于 2 月 5 日开始出现阴道流血,量多有血块,未服药物血量逐渐减少,于 2 月 7 日出现右小腹绵绵作痛。纳尚可,尿、便正常,夜寐佳,体温 36.8℃,血压 100/60mmHg。舌质淡,苔白,边有齿痕,脉滑。妇科检查:外阴发育正常,阴道通畅,分泌物少量,白色,无臭味,宫颈光滑,子宫前位,大小正常,子宫右侧一包块质软,轻度压痛。B 超:子宫前位,大小正常,宫内见节育环,分布均匀,双附件,右附件区可见 6.7cm×7.1cm×5.6cm 无回声暗区,边界清,其内见 6.4cm×6.4cm×2.5cm 条网状高回声。左附件未见异常。B 超诊断:右附件占位性病变,以囊性为主。中医诊为癥瘕。证属经后血虚,湿浊蕴结于胞络所致。处方:红藤 30g,薏苡仁 20g,苍术 15g,黄柏 10g,夏枯草 20g,姜半夏 10g,牛膝 10g,4 剂,水煎服。2 月 13 日复诊,药后小腹疼痛减轻,阴道分泌物量多,色白。外院彩超检查,子宫右附件见 6.3cm×5.3cm 无回声为主,内伴密集细小的强光点反射及 1.7cm×1.6cm 回声略强囊性块影。效不更方,上方红藤改用 50g,余药加减化裁。共服药 16 剂,3 月 23 日 B 超示:子宫及双附件正常,病告痊愈。

[编辑:李巍]