

用补阳还五汤合当归四逆汤加味治疗:当归 15g,黄芪 60g,太子参 30g,赤芍 12g,川芎 10g,肉桂 10g,通草 10g,细辛 6g,桃仁 10g,地龙 20g,水蛭 10g,红花 10g,牛膝 12g,薏苡仁 30g,延胡索 20g,香附 15g,砂仁 10g,每日 1 剂,水煎服。另予血塞通注射液(昆明制药集团股份有限公司生产)0.8g 加入 250ml 5%葡萄糖注射液中,静脉滴注,另加 250ml 参芪扶正液静脉滴注,每日 1 次。12 月 28 日腹痛明显减轻,仅时有隐痛。腹部热敷后疼痛可完全缓解。凝血功能测定在正常范围之内。中药守上方每日 1 剂,静脉滴注药物同上。

2007 年 1 月 3 日中、上腹时有隐痛,纳食、二便正常,精神较前好转。于上述方药中每剂加入三七粉 6g 兑服。每日 1 剂。自 2007 年 2 月 28 日起,中药汤剂改为 2 日 1 剂,注射液改为每周 2 次静脉滴注。

2007 年 4 月 24 日昆明某医院 MRI 复查:肠系膜上动脉血栓较治疗前明显好转,肠系膜上动脉远端分支显示较清楚(侧枝循环已逐渐形成)。坚持上述治疗至 2007 年 6 月,腹痛消失,病情稳定。仅在腹部受寒、劳累时稍有隐痛,目前仍间断服用中药以巩固疗效。

2 按语

急性肠系膜上动脉血栓主要的病变基础是动脉硬化。血栓形成好发于动脉开口处,并常涉及整个肠系膜上动脉,因此,病变可能影响全部小肠和右半结肠,病势凶险。早期诊断困难,预后差,死亡率高。本例患者由于血栓形成阻塞肠系膜动脉约 50%,且栓子长达 10cm 以上,由于病变早期被误诊胰腺占位性病变而没有及时治疗,丧失了灌注溶栓或手术的机会。辨证应用中医药治疗,取得较好疗效,达到基本治愈的目的。

本病例应用补阳还五汤合当归四逆汤组方化裁治疗。补阳还五汤益气活血主治正气亏虚、脉络瘀阻;当归四逆汤温经散寒、养血通脉,主治阳气不足而又兼血虚,外受寒邪,寒入经络之腰、股、腿、足疼痛证。血栓为有形实邪,乃因阳气亏虚、阴寒凝滞而成。上述两方合用化裁,益气活血,通络化栓,更有活血化瘀的三七制剂、血塞通注射液及益气温中之参芪扶正液协同作用,促进血栓迅速溶解,使侧枝循环得以建立。

(收稿日期:2007-12-21)

[编辑:黄健]

茵栀黄注射液口服治疗婴儿肝炎综合征 44 例

范荣国 王安莲

(湖北省丹江口市第一医院,丹江口市沙陀营路 49 号,442700)

我院儿科采用茵栀黄注射液口服治疗婴儿肝炎综合征,取得较好效果。现报告如下。

1 临床资料

86 例婴儿肝炎综合征均为我院儿科 2002 年 5 月~2007 年 2 月住院及门诊患儿,诊断符合李绍白《肝脏病学》相关标准。随机分为 2 组:治疗组 44 例,其中男性 29 例,女性 15 例,平均年龄 2.3 个月;对照组 42 例,其中男性 25 例,女性 17 例,平均年龄 2.2 个月。两组患儿在年龄、性别、病程、治疗前经皮测胆红素值等临床资料方面差异无显著性意义($P>0.05$)。

2 治疗方法

两组病例均采用蓝光照射、白蛋白、维生素 K₁、苯巴比妥等常规治疗,治疗组加用茵栀黄注射液口服(河北神威药业有限公司生产),每次 3ml,每日 3 次,10 天为 1 个疗程,服用 1~2 个疗程。

3 疗效观察

3.1 疗效标准

治愈:黄疸消退,食欲改善,体重增加,肝脾大小正常,经皮测胆红素值 $<34.2\text{mmol/L}$;好转:黄疸减轻,肝脾回缩但尚未正常,经皮测胆红素值 $\geq 34.2\text{mmol/L}$ 但 $<85.5\text{mmol/L}$;无效:症状、体征和经皮测胆红素值均未达到好转标准。

3.2 治疗后两组患儿疗效情况

治疗组经皮测胆红素均值治疗前为 $(105.2\pm 31.0)\text{mmol/L}$,治疗后为 $(22.4\pm 24.13)\text{mmol/L}$;对照组治疗前为 $(104.8\pm 31.0)\text{mmol/L}$,治疗后为 $(48.3\pm 29.3)\text{mmol/L}$,两组治疗后比较差异有显著性意义($P<0.01$)。治疗组 44 例,治愈 36 例,有效 8 例,无效 1 例,总有效率为 97.7%;对照组 42 例,分别为 21 例、15 例、6 例、85.7%。治疗组疗效明显优于对照组($P<0.05$)。

4 讨论

婴儿肝炎综合征为儿科常见病症,病因复杂,且无特效治疗方法。中医将其归属于“黄疸”病范畴,为胎毒湿热阻遏,胆道不利所致,治疗以清热解毒、利胆退黄为主。茵栀黄注射液含有茵陈提取物、栀子提取物、黄芩苷、金银花提取物。茵陈味苦性微寒,善能清热利湿,利胆退黄,为治疗黄疸之要药,故为君药,栀子清三焦火邪,除肝胆湿热而退黄。黄芩性味苦寒,清热燥湿,泻火解毒,用以为臣,以加强君药清热利湿退黄之功。金银花甘寒,清热解毒,用以佐药,与君药、臣药合用以加强其清热之力。诸药合用,共奏清热解毒、利湿退黄之功。从临床疗效观察,茵栀黄注射液口服治疗婴儿肝炎综合征确有明显效果,且免去静脉滴注之苦,无明显不良反应。

(收稿日期:2007-11-02)

[编辑:黄健]

通讯作者:范荣国,angelf0419@163.com