

宜生用,其它则多炒制用。《本草纲目》曰:“散风痰,结核,瘰癧,头风,风虫齿痛,皮肤风疹,丹毒作痒,……一切金疮,疗肿风痔”。我们运用僵蚕加味,治疗各种息肉,疗效颇为满意。举例如下。

例 1:纪某某,女,46 岁。2006 年初,因经常阴道出血,在某医院妇科检查为宫颈息肉,经手术切除 5 个月,阴道继续出血,经检查为息肉复发,要求中医诊治。处方:炒僵蚕 30g,乌梅 20g,炮穿山甲 15g,水煎服,30 剂。1 个月后,息肉消失。患者要求服中药巩固,处方:炒白僵蚕 350g,乌梅 250g(酒醋制,炒)研细末,炼蜜为丸,每丸约重 9g,每次 1 丸,每日 3 次,随访半年后未见复发。

例 2:杜某某,女,42 岁。2006 年体检发现胆囊息肉 0.7cm × 0.7cm,肝胆区痛,胃纳差,后背痛,消瘦。因服中药汤剂不方便,故以丸药治之。处方:炒僵蚕 500g,乌梅(酒醋制,炒) 400g,锡类散 20 支,共研细末,炼蜜为丸,每丸重 9g,每次 1 丸,每日 3 次,1 料服完,B 超显示,息肉已缩小一半,又服 1 料,2007 年复查:息肉消失,随访无复发。

例 3:王某某,男 27 岁。患者经常腹泻,大便时常有红赤黏液,伴右下腹痛,无里急后重之感,2006 年,在某医院住院治疗,经直肠镜检查,发现“全结肠黏膜自肛门齿状线以上至盲部有米粒至花生米大小不等带蒂息肉,密集如葡萄状,呈撒豆样分布于多数息肉,其颜色相同,有些则充血黏膜覆盖,个别有出血。”诊为结肠息肉,因患者畏惧手术,要求中医治疗。患者每日腹泻 3~5 次,先干后稀,带鲜血黏液,腹胀。处方:僵蚕 10g,乌梅 15g,花椒 9g,黄连 9g,黄柏 6g,党参 12g,炮干姜 6g,制附子 10g(先煎),肉桂 6g,细辛 3g,吴茱萸 3g,白头翁 15g,水煎服,日服 2 次,15 剂。复诊述症状已有好转,处方:炒僵蚕 500g,乌梅(醋酒制,炒) 300g,炮山甲 50g,赤石脂 250g,锡类散 40 支,研末,炼蜜为丸,每丸重 9g,每次 1 丸,每日 3 次,1 料服完,症状大减,3 料服完诸症消失,2007 年 9 月复查示:“息肉消失,肠壁光滑。”随访无复发。

例 4:齐某某,女,19 岁。患者自觉咽喉有梗阻感,在某医院检查,经病理切片,诊为声带息肉,有黄豆大小。处方:炒僵蚕 500g,乌梅(醋酒制,炒) 300g,锡类散 20 支,研末炼蜜为丸,每丸重 9g,每次 1 丸,每日 3 次。嘱忌辛辣刺激性食物,1 料服完,病理复查示:“声带息肉消失”。

僵蚕临床应用举隅

马宪友

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net
(山东省鱼台县中医院内科,272300)

僵蚕有祛风止痉,化痰散结,解毒利咽等功效。除

此之外,笔者在临床应用中发现还有软化肿块,消疣等功效。举例如下。

1 软疣

马某某,男,53 岁。左大腿内侧有一突起物 1 年余,起初未在意,后因行走较长时间引起疼痛来诊。查体:左大腿内侧有一突起物约有蚕豆大小,顶部较硬,色较暗。双手掌背部有扁平疣。诊断为软疣。处方:紫草 15g,板蓝根 15g,马齿苋 30g,生薏苡仁 30g,丹参 15g,红花 10g,赤芍 10g,大青叶 15g,木贼 10g,香附 10g,穿山甲 10g,磁石 30g,生龙骨、生牡蛎各 20g。服药 1 个月余,手掌背部的扁平疣消失,大腿软疣无变化。改用经方麻杏苡甘汤加僵蚕。治疗后略有缩小,顶部开始变软,有片状物脱落。患者坚持服用中药 80 余天后,感觉局部阵发性刺痛,2 天后即脱落。创面周围局部发硬,服用消炎药及外用太乙神膏后恢复正常。

2 良性、恶性肿瘤

马某某,男,50 岁。自幼左腹股沟部生长一良性赘生物,高约 0.7cm,直径约 0.3cm,一直未予治疗,后因脚后跟每到冬天角化过度,于 2001 年 9 月 14 日服活血化瘀、凉血、清热解毒、攻下药物。服用中药后,脚后跟皮肤润泽光亮,方中加用僵蚕后,左腹股沟部肿物微痒,用手掐之有血痕样皮屑脱落,局部良性赘生物完全脱落。

郑某,男,65 岁。患周围型肺癌,在某肿瘤医院行切除术。3 年后于 2005 年 1 月复发,4 月份因化疗反应重,不能耐受而停止治疗。于 2005 年 6 月 3 日因咳嗽,吐黄痰,胸闷乏力憋喘来诊。查体:面部有毛细血管网,双肺可闻干、湿性啰音,舌嫩红苔,薄白腻,脉细弱涩。处方:党参 20g,桑白皮 15g,川贝母 5g,生黄芪 20g,白术 10g,白花蛇舌草 20g,半枝莲 20g,僵蚕 10g,丹参 20g,当归 20g,干姜 10g,生薏苡仁 20g,石菖蒲 10g,马鞭草 20g,白芥子 10g,紫苏子 10g,莱菔子 10g,地龙 10g,葶苈子 10g。同时外用加味阿魏化痞膏。加减服用百剂,患者体力大增,食量增加,面部毛细血管网明显减少,生活质量显著提高。9 月 2 日检查,癌块较前增大。又以上方加减配用胶囊服用 3 个月。12 月检查,癌块未再增大。

3 银屑病

马某,男,51 岁。2001 年发现左上肢肘部瘙痒,局部有约 2cm 大小苔藓状物。除鳞屑物后有浅表状出血,诊断为银屑病。用斑蝥合剂等治疗痛痒止,但不久复发,再用仍有效。服用清热泻火胶囊。处方:生地黄、赤芍、牡丹皮、水牛角、菊花、牵牛子、紫草、皂角刺、丹参、水红花子、附子、僵蚕,加减服用半年余,随访 7 年未复发。

[编辑:李巍]