

《伤寒杂病论》剂型相异同名方浅析

赵志恒¹, 张仁倩¹, 王剑歌¹, 徐家淳¹, 李 岩^{2*}

(1. 天津中医药大学研究生院, 天津市南开区鞍山西道 312 号, 300193; 2. 天津市公安医院)

摘要 《伤寒杂病论》中剂型不同的同名方共有七对, 乌头汤、乌头煎, 抵当汤、抵当丸, 四逆汤、四逆散, 猪苓汤、猪苓散, 排脓散、排脓汤, 瓜蒂汤、瓜蒂散, 半夏散、半夏汤。根据其剂型的不同, 从病情轻重、药物组成、功效主治、服药方法等方面探讨分析其差异, 对于区分不同剂型的同名异方有一定的指导意义。

关键词 伤寒论杂病; 剂型

《伤寒杂病论》中张仲景以相同名字命名方剂有两种情况, 一是以剂型不同命名, 另一种是以大、小分别命名, 上述两类方剂, 对大、小命名者论及甚多, 然方名相同而剂型不同的方剂少有论述, 如乌头汤、乌头煎, 抵当汤、抵当丸, 四逆汤、四逆散, 猪苓汤、猪苓散, 排脓散、排脓汤, 瓜蒂汤、瓜蒂散, 半夏散、半夏汤等。本文仅以剂型相异的同名方为例, 从其剂型、病情轻重、药物组成、功效主治、服药方法等方面加以分析探讨。

1 乌头汤、乌头煎

乌头汤与乌头煎的异同点见表 1。

二方同以乌头命名, 但二者大有不同之处。从剂型上看, 一为汤剂、一为煎剂。煎剂是将药物水煎煮去渣后, 再加热浓缩而形成的液体, 这种煎剂浓度高、加热时间比较长, 可在一定程度上降低药物的毒性; 而汤剂是将药材加水煎煮一定时间后, 滤去药渣所得的液体。乌头汤是先将乌头和白蜜同煎, 去乌头而取蜜煎液, 再与麻黄、芍药、黄芪、炙甘草水煎液煎煮而得, 其中水煎液与蜜煎液同煎比例为 1: 1, 乌头先与蜜同煮, 又与甘草等四味药同煮, 加强了减毒的作用; 而乌头煎是以一升的乌头水煎液与二升的白蜜, “煎令水气尽”, 就是要把所有的水气蒸发掉, 得药液二升, 相当于白蜜的剂量。

二方所治病证虽都与寒有关, 但乌头汤除治疗历节疼痛之外, 还能够治疗脚气疼痛, 不可屈伸,

体现的是异病同治。历节病和营卫气虚血弱有关, 故而乌头汤中加入麻黄散寒, 芍药配甘草缓急止痛, 且芍药补营气, 黄芪固卫气, 以达补养营卫之气和祛寒湿、缓急止痛之功。而乌头煎所治寒疝, 症见绕脐痛、白汗、手足厥冷、脉沉弦。阴寒内盛, 阳气就不能正常运行, 表现的是一派寒象, 非大辛大热之乌头不能除, 然考虑到白蜜可以解乌头毒, 就与白蜜同煎, 且写明“强人服七合, 弱人服五合。不差, 明日更服, 不可一日再服”。相较于乌头汤之“服七合, 不知, 尽服之”而言, 可知乌头煎毒性更大。然二方证中都是乌头与蜂蜜同用, 其功有二: 一者解乌头毒并增强乌头止痛效果、延长作用时间, 二者同用形成相须、相使、相杀之效。

2 抵当汤、抵当丸

抵当汤与抵当丸的异同点见表 2。

柯琴曰: “蛭, 昆虫之饮血者也, 而利于水。虻, 飞虫之吮血者也, 而利于陆。以水陆之善取血者, 用以攻膀胱蓄血, 使出乎前阴。佐桃仁之苦甘而推陈致新, 大黄之苦寒而荡涤邪热。名之曰抵当者, 直抵其当攻之处也”^[1]。抵当丸药物与抵当汤完全相同, 然药量比例、服用方法有所区别。抵当丸中水蛭、虻虫的剂量较抵当汤减少三分之一, 桃仁增加四分之一。且服药剂量也少于抵当汤, 一剂分为四丸, 每服一丸, 改汤为丸。因丸药吸收比较慢, 所以其攻下瘀血之力和缓, 药力绵长, 故服药后“啐时当下血”, 若血不下者可再服。

* 通讯作者: liyan66950@sina.com, (022) 23142732

然二方命名又与所治之证的轻重有关，病重且急者用汤，病轻势缓者用丸，成无己曰：“若热蓄津液不通，则小便不利，其热不蓄，津液行，小便自利者，乃为蓄血，当与桃仁承气汤、抵当汤下之。然此无身黄屎黑，又无喜忘发狂，是未致于甚，故不可余快峻之药也，可与抵当丸，不可下之也”^[4]。

3 四逆汤、四逆散

四逆汤与四逆散的异同点见表 3。

四逆，即四肢厥冷的简称。四逆散所治“四逆”，源于外邪传经入里，气机为之郁遏，不得疏泄导致阳气内郁，不能达于四肢，耳尖手足不温。阳郁气滞是四逆散证发病的关键。此种“四逆”与阳衰阴盛的四肢厥逆有本质区别^[5-7]。李士材有言：“此证虽云四逆，必不甚冷，或指头微温，或脉不沉微，乃阴中涵阳之证，唯气不宣通，是以逆冷”。而四逆汤解四肢厥冷，使阳气舒展而达四肢。

四逆散与四逆汤均治疗少阴病。《伤寒论》318 条谓四逆散主治“少阴病，四逆”等，而 323 条曰：“少阴病，脉沉者，急温之，宜四逆汤”。然历代医家对四逆散所治“少阴病”颇有歧

义^[8-12]。从所论可知，少阴四逆皆有阳虚不能敷布四末之证。而四逆散重在阳郁于里，不能达于四肢，其或咳或悸或小便不利，是气机不宣；或腹中痛或泄利下重，是气血郁滞，故用四逆散宣散气血之郁滞；四逆汤重在回阳救逆以治寒厥。

张仲景治四逆之证多用汤剂，而且用量较大，四逆汤中用附子一枚、干姜一两半，其主要作用无非是用汤方重剂温里回阳或清下里结热实。而四逆散在《伤寒论》中用量之轻少是极为突出的，本方为三，每服方寸匕，目的在于疏解升阳，其轻缓解散之义可见。综上所述，四逆散与四逆汤的异同主要体现在三个方面：方名同而用药异；用药异而证候同；证候同而病因异^[5-7]。

4 猪苓汤、猪苓散

猪苓汤与猪苓散的异同点见表 4。

猪苓散用猪苓、茯苓、白术和五苓散同，五苓散较之多用了桂枝、泽泻。有研究认为，五苓散乃五味猪苓散之错称，《金匱要略》呕吐篇中的三味猪苓散和《伤寒论》五味猪苓散（即五苓散）应是起源不同的方剂，猪苓散和五苓散是作为吐剂应用的^[13]。再者，把猪苓汤证和五苓散证结合起来

表 1 《伤寒杂病论》乌头汤与乌头煎的比较

方剂名称	组成药物	主治病证	煎服方法
乌头汤	川乌头（五枚，㕮咀，以蜜二升，煎取一升，即出乌头）、麻黄三两、芍药三两、黄芪三两、炙甘草三两	历节病，脚气疼痛，不可屈伸。	上五味，㕮咀四味，以水三升，煮取一升，去滓，内蜜煎中更煎之，服七合。不知，尽服之
乌头煎	乌头（大者五枚，熬，去皮，不㕮咀）、蜜二升	寒疝，绕脐痛，发则白汗出，手足厥冷，脉沉者	上以水三升，煮取一升，去滓，内蜜二升，煎令水气尽，取二升，强人服七合，弱人服五合。不差，明日更服，不可一日再服

表 2 《伤寒杂病论》抵当汤与抵当丸的比较

方剂名称	组成药物	主治病证	煎服方法
抵当汤	水蛭三十条，虻虫三十只，大黄三两，桃仁二十个	伤寒蓄血证：少腹硬满集结，小便利，身黄，发狂或如狂，脉微而沉（或脉沉结）	上四味，以水五升，煮取三升，去滓，温服一升，不下，更服
抵当丸	水蛭二十条，虻虫二十只，大黄三两，桃仁二十五个	同抵当汤证，但较轻，无发狂或如狂现象	上四味，捣分四丸，以水一升，煮一丸，取七合服之，晬时当下血，若不下者更服

表 3 《伤寒杂病论》四逆汤与四逆散的比较

方剂名称	组成药物	主治病证	煎服方法
四逆汤	炙甘草、干姜、生附子	少阴病，症见四肢厥逆，恶寒蜷卧，呕吐不渴，腹痛下利，神衰欲寐，舌苔白滑，脉微细；太阳病误汗亡阳	上三味，以水三升，煮取一升二合，去滓，分温再服。强人可大附子一枚，干姜三两
四逆散	炙甘草、枳实、柴胡、芍药	少阴病，四逆之证，或咳、或悸、或小便不利、或腹中痛、或泄利下重	上四味，各十分，捣筛，白饮和服方寸匕，日三服

看,它们都有“渴欲饮水”“小便不利”“脉浮发热”的症状,而“小便不利”为猪苓汤必有症状,张仲景去五苓散中偏温的桂枝、白术,而加甘淡而寒的滑石以清湿热利小便,加阿胶以淡渗利水而不至于伤阴。而猪苓散因病在膈上,故不用利下焦之水的泽泻,亦不用桂枝以温下焦膀胱之气化。

猪苓散与猪苓汤虽都以猪苓命名,其区别在于二者治疗的病证不同,猪苓散为吐后思水欲解者设,以利水补土为主;猪苓汤是养阴利水以治水热互结且热已伤阴。大抵吐药有以散服之则吐的作用,煎之则发表的药效,因此,猪苓散作为吐剂,与猪苓汤相比有汤、散之别。

5 排脓散、排脓汤

排脓散与排脓汤的异同点,见表 5。

排脓散和排脓汤分别是“妇人产后病脉证治第二十一”“肺痿肺痛咳嗽上气病脉证治第七”中的枳实芍药散加桔梗、鸡子黄;桔梗汤加生姜、大枣而成的。排脓散和排脓汤在原文中都没有明确主治,但据张仲景方剂命名的特点可知二方当有排脓

的作用。两方仅桔梗一味药同,其他则异,但都是以“排脓”命名,可见桔梗为排脓的要药。由于两方的配伍不同,所以治疗有异:排脓散为治痈脓将成未成,排脓汤为治疗欲成痈脓。

内痈乃体内化脓性疾病,不管脓从呕而出、从咳嗽而出,或者从大便而出,都可以用排脓散和排脓汤来治疗。二者之所以有散、汤之别,关键在于脓成未成。排脓散用桔梗排脓,配合枳实、芍药以理气活血,再加鸡子黄补虚;排脓汤方中用甘草解毒,桔梗排脓,再加生姜、大枣调和营卫,通过姜枣调和营卫、补气血,能够促使伤口愈合,有生肌作用。

6 瓜蒂汤、瓜蒂散

瓜蒂汤与瓜蒂散的异同点见表 6。

瓜蒂散方用瓜蒂、赤小豆、豆豉,即所谓的“酸苦涌泄”,其催吐作用体现了“其高者,因而越之”的治法。瓜蒂汤所治之证是以湿为主的暑湿,症见身热疼重;又湿伤阳气,“湿盛则阳微”,故见脉微,治此用瓜蒂汤把水湿排出体外,通过瓜

表 4 《伤寒杂病论》猪苓汤与猪苓散的比较

方剂名称	组成药物	主治病证	煎服方法
猪苓汤	猪苓、茯苓、阿胶、滑石、泽泻	水热互结之小便不利,发热,口渴欲饮,或心烦不寐,或兼有咳嗽,呕恶,下利。又治血淋,小便涩痛,点滴难出,小腹满痛者	上五味,以水四升,先煮四味,取二升,去滓,内胶烺消,温服七合,日三服
猪苓散	猪苓、茯苓、白术	呕吐而病在膈上,后思水者解,急与之。思水者猪苓散主之	上三味,杵为散,饮服方寸匕,日三服

表 5 《伤寒杂病论》排脓散与排脓汤的比较

方剂名称	组成药物	煎服方法
排脓散	桔梗二分、枳实十六枚、芍药六分	上三味,杵为散,取鸡子黄一枚,揉和令相得,饮和服之,日一服
排脓汤	桔梗三两、甘草二两、生姜一两、大枣十枚	上四味,以水三升,煮取一升,温服五合,日再服

表 6 《伤寒杂病论》瓜蒂汤与瓜蒂散的比较

方剂名称	组成药物	主治病证	煎服方法
瓜蒂汤	瓜蒂(二七个)	太阳中喝,身热疼重而脉微弱,此以夏月伤冷水,水行皮中所致,身面四肢浮肿。治诸黄	上剉,一水一升,煮取五合,去滓,顿服
瓜蒂散	瓜蒂(一枚,熬黄)、赤小豆(一分)	宿食在上脘,当吐之	上二味,杵为散,以香豉七合煮取汁,和散一钱匕,温服之。不吐者,少加之,以快吐为度而止

表 7 《伤寒杂病论》半夏散、半夏汤的比较

方剂名称	组成药物	主治病证	煎服方法
半夏散	半夏、桂枝、炙甘草	少阴病,咽中痛	上三味,等分,各别捣筛已,合治之,白饮和服方寸匕,日三服
半夏汤	半夏、桂枝、炙甘草	少阴病,咽中痛	若不能散服者,一水一升,煎七沸,内散两方寸匕,更煮三沸,下火,令小冷,少少咽之

蒂的涌吐之效使水气吐出来，更重要的是借吐使得阳气往上往外发越，产生发汗的作用，借汗出以解水湿之患。因“大抵吐药有以散服之则吐，煎之则发表”，可知一物瓜蒂汤是皮水发表之剂。二方虽以瓜蒂命名，但主治不同，功效各异，煎服方法也有区别。

7 半夏散、半夏汤

半夏散、半夏汤的异同点，见表 7。

方名半夏散、半夏汤，指其即可为散剂，也可做汤服。二者区别仅体现在煎法和服法上，因患者体质差异，有不能服散者，故而张仲景另立汤法。散剂用白饮和服，以助药力，汤剂少少含咽，使药持续作用于咽部。

8 小结

综上，认为张仲景剂型不同的同名方中有以下规律：一是以药物是否有毒命名，如乌头、半夏、瓜蒂、猪苓，再根据主治病证不同剂型各异；二是根据方药功效命名，如抵当、排脓、四逆，再根据病情轻重、病邪浅深选用剂型；三是以煎、汤命名者，其效速、其药力大，而病情急者或病浅者用散、病势缓者用丸。张仲景同名剂型不同的同名异

方体现了其在方剂命名上的严谨，用药配伍的有度，其主要根据病情轻重、药物组成、功效主治、服药方法等方面确定。可见张仲景随证变化，用药灵活，药味之差，功效殊异，在临床学习和用药实践中不可不知。

参考文献

- [1] 柯琴. 伤寒来苏集 [M]. 王晨, 张黎临, 赵小梅, 校注. 北京: 中国中医药出版社, 1998: 65.
- [2] 王玉兴. 伤寒论三家注 [M]. 北京: 中国中医药出版社, 2009: 116.
- [3] 李飞. 方剂学 [M]. 北京: 人民卫生出版社, 2002.
- [4] 周世印, 党炳瑞. 四逆散辨识 [J]. 河南中医, 1982, 2(6): 9-10.
- [5] 张北北. 浅谈四逆汤四逆散的同异 [J]. 中成药研究, 1983(4): 36.
- [6] 顾勤, 汪红. 探析《伤寒论》以“四逆”命名的治厥方证治特点及现代药理基础 [J]. 中医药学报, 2001, 29(1): 29-32.
- [7] 小高修司, 冈田研吉, 郭秀梅, 等. 五苓散考 [J]. 河南中医, 2011, 31(5): 445-447.

(收稿日期: 2015-01-05; 修回日期: 2015-04-11)

编辑: 黄 健

第六届国际中医妇科学术大会 暨世界中医药学会联合会中医妇科专业委员会成立 10 周年纪念大会 征 文 通 知

为促进国内外从事中医妇科领域学者进行学术交流，加强中医药国际传播，共同提高中医药防治妇科疾病水平。由世界中医药学会联合会妇科专业委员会主办的“第六届国际中医妇科学术大会暨世界中医药学会联合会妇科专业委员会成立 10 周年纪念大会”，以“女性生殖健康”为主题，拟定 2015 年 9 月在中国长沙举行，届时将举办“女性生殖健康高级研讨班”，并设“潘高寿杯”丹鳖胶囊有奖征文活动，评选优秀学术论文，颁发一、二、三等奖。同时邀请国内外著名妇科专家进行专题讲座及大会学术交流。现将有关事宜通知如下。

一、征文内容

1. 有效提高女性生殖健康的新技术、新方法及最新研究进展；2. 有效提高女性生殖健康的中医诊疗优势及特色疗法；3. 影响生殖健康的相关因素研究及卵巢早衰的中医药防治研究；4. 不孕症与辅助生殖技术研究及子宫肌瘤与内异症防治研究；5. 丹鳖胶囊组方研究、药理作用及临床应用；6. 丹鳖胶囊药效基础及安全性研究等。

二、征文要求

1. 论文要求未在公开杂志发表，主题鲜明，论据充分，内容详实，文责自负。2. 中英文论文均以 word 格式投稿，全文篇幅在 4000 字左右。3. 所有论文一律采用电子投稿 (fkfh189@163.com)。4. 投稿截止日期：2015 年 7 月 31 日。

三、会议负责人及联系方式

刘丹卓 13787132521, fkfh189@163.com